

2004

韓國의 優秀經驗方集



KIOM 한국한의학연구원



K10M0659

韓國의 優秀經驗方集

2004. 10

한국한의학연구원

서 문

2002년 보건복지부 한방정책관실은 한국한의학연구원에 대한한약협회와 대한한 의사협회 회원을 중심으로, 한약 투여 후 효과를 경험한 처방을 수집하도록 학술용역을 의뢰하였다. 이전에도 보건복지부는 이러한 사업을 3차례 실시하여 경험방집을 발간하였다.

본 용역 사업도 완료된 후『한약처방 조사 수록집』을 발간하여 910종 한약처방을 공개하였고, 2004년도에『한국의 우수경험방집』으로 다시 출판하였다.

역사적으로 지난 2000년 동안 중국 문명권에서 전통의학 치료 효과를 알 수 있는 길은 1인 위주의 경험에 근거한 ‘의안(醫案)’ 뿐이었다. 과학 문명이 발달한 오늘날에도 한의약계는 여전히 개인적 관찰에 의한 ‘경험’을 매우 중요시하고 있다. ‘경험’은 과학에서 중요한 관찰 수단 중 하나이지만, 객관성과 투명성이 낮아 한계가 있는 불안정한 관찰 방법이다. 따라서 본 조사에서도 한의약계의 모든 의안 또는 경험방이 그렇듯이 몇 명을 치료하였는지, 진단명이 명확한지, 투여 기간이 어느 정도 인지, 치료 결과는 객관적으로 확인되었는지 등에 대한 정보가 불확실하다. 그리고 치료 경험의 전 과정에 제 3자가 개입된 증거나 여지가 없는 상황이다.

따라서 여기에 수록된 처방에 대해서는 한의서와 논문을 참고하고, 본초·방제 이론을 검토하여 처방을 확정할 것을 권고한다.

본 조사 사업에 동참하여 주신 대한한약협회 및 대한한 의사회 회원들에게 감사의 말씀을 드리며, 조사된 한약처방이 질병 치료 시에 도움이 되길 바란다.

2023년 12월

연구책임자 신현규

※ 본 출판물은 보건복지부 학술용역 사업「한약처방의우수경험방수집및 활용방안연구」의 결과로, 보건복지부 한약65515-232호에 의해 저작권법 제54조 제1항에 의거하여 출판권은 한국한의학연구원에 권한 위임을 받았으므로, 보건복지부와 한국한의학연구원 허락없이 무단 복사를 금합니다.

목 차

제1장 감염성 질환	1
1. 전염병	1
回生丹	1
五苓散	1
加味平胃散	2
加味藿香正氣散	2
2. 폐결핵	3
加味六味湯	3
保化湯	3
補肺散	4
養肺湯	4
加味三交湯	5
加味小柴胡湯	5
滋陰降火湯加味方	6
銀花湯	7
加味六味湯	7
3. 임질 매독 기타	8
寶命丸	8
斑猫散	8
加味六味地黃湯	9
治淋方	9
八正散加味方	10
加減丹粉丸	10
淋疾 梅毒 其他 經驗方1	11
(1)加減香葛湯 (2) 神契香蘇散	11
제2장 정신 및 행동장애	13
1. 遺精 夢遺 不眠	13
加味養心湯	13
黃連清心飲	13

逍遙散	14
柴胡抑肝湯	14
遺精 夢遺 不眠 經驗方1	15
加味四物湯	15
加味溫膽湯	16
平安安神湯	16
加味歸脾湯	17
加味六脾湯	17
加味君子湯	18
歸溫湯	18
歸脾湯加味方	19
柴胡桂枝湯加味方	19
四物合歸脾湯	20
甘麥大棗湯	20
四六湯加味方	21
 2. 梅核氣 기타	 22
逍遙散加味方	22
加味逍遙散	22
加味二陳湯	23
加味滋陰健脾湯	23
鐵掃散	24
黃芩湯	24
梅核氣 其他 經驗方1	25
加味溫膽湯合六鬱湯	25
石隱補遺方	26
 제3장 신경계 질환	 27
 1. 手顫症	 27
治風湯	27
去星散	27
祛風散	28
補肝湯(一名 涼肝丸)	28
神經系疾患 手顫症 經驗方1	29
加味祛風散	29

2. 頭痛 眩暈	30
第1方 健脾二四湯 / 第2方 加味夏朮湯	30
頭痛 眩暈 經驗方1	31
加味逍遙散	32
二陳湯加味方	32
頭痛 眩暈 經驗方2	33
加味四物湯	33
加味歸茸湯	34
加味清上蠲痛散	34
清上蠲痛湯	35
加味清上蠲痛湯	35
香芎湯	36
加味清上蠲痛湯	36
清上蠲痛湯	37
3. 口眼喎斜 癰疾 痙攣	37
千金湯	37
理氣祛風散加味	38
加味四物湯	38
正喎湯	39
通治丸	39
清心溫膽湯	40
定癰丸	40
桂芍湯	41
回首散加減方	41
加味香蘇散	42
口眼喎斜 癰疾 痙攣 經驗方1	42
제4장 눈 및 눈부속기 질환	43
1. 안질환	43
桂丹何首湯	43
茯澤石膏湯	43
加味磁朱丸	44
越脾加朮湯	44

제5장 귀질환46

1. 귀질환46

連翹敗毒散46

加減荊防敗毒散46

加味地黃湯47

耳科疾患 經驗方147

小柴胡湯合香蘇散48

제6장 순환기계 질환49

1. 순환계질환49

滋陰降火湯加味方49

加味地黃湯49

正氣天香湯50

循環系疾患 經驗方151

十全大補湯加味方51

加味清心湯52

循環系疾患 經驗方252

2. 고혈압53

清風湯53

消風散53

葛根解肌湯54

六味地黃湯加味方54

清上蠲痛湯55

四六湯加減方55

加味導痰湯56

加味通聖散56

烏藥順氣散加味方57

加味稀葛湯57

高血壓 經驗方158

疎風湯58

烏藥順氣湯59

3. 中風	60
蒼橘湯	60
加味大羌活湯	60
治星湯	61
中風 經驗方1	61
加味大補湯	62
加味續斷湯	62
加味祛風湯	63
加味潤燥湯	63
地黃飲子加味方	64
大秦芎湯加味方	64
中風 經驗方2	65
疎風湯	65

제7장 호흡기계 질환 66

1. 衄血(鼻出血)	66
衄血(鼻出血) 經驗方1	66
加味六味地黃湯	66
加味地黃飲	67
止衄湯	67
加味四物湯	68
升麻芍藥湯	68
加味犀角湯	69
加味生黃湯	69
犀角地黃湯加味方	70
加味四物湯	70
莎芎散	71
當歸芍藥散	71
加減八物湯	72
清肺湯	72
衄血(鼻出血) 經驗方2	73
加味小建中湯	73
草白湯	74
瀉心湯	74

2. 鼻淵 鼻炎	75
加味金沸草散	75
防風通聖散加味方	75
黃芩洗肺湯	76
半夏白朮天麻湯	76
加味升葛湯	77
鼻淵 鼻炎 經驗方1	77
歸脾湯加味方	78
加味連翹敗毒散	78
防風通順散	79
四六湯加味方	79
加味麗通湯	80
加味桂芍湯(桂枝防風湯 加減方)	80
第一方 通竅湯/ 第二方 枸杞天麻湯	81
人蔘敗毒散加減方	81
麗澤通氣湯加減方	82
少陰人 十全大補湯 加減	82
加味二陳湯	83
通竅湯	84
葛根加附子地黃湯	84
通竅湯 加味	85
川芎茶調散加味方	85
白黃散	86
①加味荊芥蓮翹湯, ②加味防風通聖散, ③加味補中益氣湯	86
3. 咽喉疾患	87
清火湯	87
通關飲	88
加味敗毒散	88
清和飲	89
吹喉散	89
咽喉 經驗方1	90
加味甘桔湯	90
清上補下湯	91
加味芍藥湯	91
加味清冷散	92

4. 感冒	92
五積散加減方	92
加味香蘇散	93
九味羌活湯加味方(仁山은 靈神解毒湯이라 名)	93
加味升葛敗毒散	94
溫肺散	94
清肺湯	95
溫痰散	95
清痰湯	96
加減敗毒散	96
加減蔘蘇飲	97
四六湯	97
加味甘桔湯	97
加減香蘇散	98
葛根湯	99
敗毒散加味方	99
加味補肺湯	100
加味杏蘇湯	100
杏蘇散	101
十神湯加味方	101
5. 傷暑	102
暑門香葛湯	102
清暑益氣湯	102
二香散	103
傷暑 經驗方1	103
加味四六湯	104
清火補陰湯	104
6. 咳嗽 喘息	105
加味地黃湯	105
咳嗽 喘息 經驗方1	106
加味交加散	106
前胡地黃湯	107
杏蘇清氣湯	107
蔘蘇飲加減方	108

加味藿正散	108
少陰人 芎歸香蘇散合川芎桂枝湯	109
瓜貝散	109
加味雙敗湯	110
柴胡桂枝湯	111
加味清肺湯	111
補母止嗽湯	112
加味忍葛湯	112
咳嗽 喘息 經驗方2	113
加味地黃湯	113
柴胡芍藥湯	114
加味柴平湯	114
蘇子導痰降氣湯	115
王氏解毒湯	115
咳嗽 喘息 經驗方3	116
加味小青龍湯	116
金水六君煎加味方	117
透風鎮火清氣湯	117
咳喘神奇湯	118
加味金水六君煎	118
加味蓼蘇飲	119
加味定喘化痰湯	119
加味瀉白散	120
加味清肺湯	120
蓼蘇飲加味方	121
定喘湯	121
升陷湯	122
加味正氣湯	122
 7. 瘰癧(淋巴腺炎) 耳下腺炎	 123
蜈香丸	123
加味大補湯	123
散腫潰堅湯	124
立志散	124

8. 협통 늑막염	125
脇痛 肋膜炎 經驗方1	125
脇痛 肋膜炎 經驗方2	125
治肋湯	126
柴和飲	126
清和湯	127
黃芪湯	127
十全大補湯加味	128
加味補益湯	128
加味金仙飲	129
大銀花煎	129
收汗煎	130
加味雙和湯	130
八珍湯加味方	130
赤茯苓湯	131

제8장 소화기계 질환 132

1. 치주질환	132
回春涼膈散合升麻葛根湯	132
口齒 經驗方1	132
加味地黃湯	133
石膏湯	133
口齒 經驗方2	134
口齒 經驗方3	134
2. 위장질환	135
加味補益湯	135
補中益氣湯加味方	135
香砂六君子湯加味方	136
五苓散加味方	136
香八湯	137
補中益氣湯	137
二陳湯加減方	138
半夏白朮天麻湯	138
加味平胃散	139

小半夏湯	139
人參養榮湯	140
陶氏平胃散	140
保胃湯	141
呃逆 胃腸疾患 經驗方1	141
正氣丹	142
黃芪健中湯加味方	142
香砂六君子湯加味方	143
呃逆 胃腸疾患 經驗方2	143
十全大補湯加味方	144
呃逆 胃腸疾患 經驗方3	145
健脾丸	145
加味養胃湯	146
雙和湯 合 對金飲子 合 消滯丸方	146
加味平胃內消散	147
加味香砂六君煎	147
加味六君子湯	148
加味健胃湯	148
十二味寬中湯	149
呃逆 胃腸疾患 經驗方4	149
枯礬丸加味方	150
人蔘養胃湯	150
加味歸脾湯	151
補胃散	151
桂薑養胃湯	152
消化丸	153
建理湯加味方	154
戊己丸	154
香砂平胃散加味方	155
加味香砂平胃散	155
加味安中散(湯)	156
加味香砂平胃散	156
蔘朮健脾湯	157
加減增味二陳湯	157
加味茯苓湯	158
加味調胃散	159

內消散	159
용소단	159
加味平胃散	160
加味藿香正氣散	161
呃逆 胃腸疾患 經驗方5	161
呃逆 胃腸疾患 經驗方6	162
加味理中湯	163
丹蔘補血湯	163
二陳湯加味方	164
加味二陳湯	164
養胃湯	165
加味理中湯	166
安心湯	166
呃逆 胃腸疾患 經驗方7	167
心和散	167
治中湯	168
四物安胃湯	168
呃逆 胃腸疾患 經驗方8	169
和中湯	169
呃逆 胃腸疾患 經驗方9	170
加味正元散	170
人蔘養胃湯加味	171
① 加味棟陳湯, ② 桂芍養胃湯, ③ 加減蔘圓飲	172
3. 설사 이질 변비 기타	173
加味白朮湯	173
加味白朮散	173
加味異功散	174
加味健脾湯(蔘朮健脾湯 加減方)	174
三白湯 加減方	175
胃苓湯	175
人蔘朮陳湯	176
理中湯(附子理中湯)	176
黃芩芍藥湯	177
清暑二香散	177
加味四物湯	178

泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方1	178
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方2	179
加味雙和湯	179
加味白虎湯	180
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方3	180
加味潤腸湯	181
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方4	181
禹水湯	182
4. 腸癰(盲腸炎)	182
腸癰(盲腸炎) 經驗方1	182
加味玄蓼湯	183
腸癰(盲腸炎) 經驗方2	183
交腸散	184
腸癰(盲腸炎) 經驗方3	184
加味正氣散	185
生活湯	185
四物湯加味方	186
加味正氣散	186
腸癰(盲腸炎) 經驗方4	187
加味丹皮散	187
腸癰(盲腸炎) 經驗方5	188
加味理陰煎	188
千金湯	188
大黃牡丹皮湯	189
蟠蔥散加味方	190
金銀牡丹湯	190
腸癰(盲腸炎) 經驗方6	191
大黃牡丹皮湯	191
加減雙和湯	192
腸癰(盲腸炎) 經驗方7	192
芍藥黃連湯	193
蟠蔥散	193
正氣天香湯	194
消痔丸	194
加味秦艽蒼朮湯	195

加味清腸止血散	195
秦艽蒼朮湯加味方	196
蒼朮地榆湯	196
加味消毒飲	197
貓肉方	197
6. 비장 췌장질환	198
加味平肝消癥湯	198
絕癰丸	198
溫中下積散	199
脾臟 췌장疾患 經驗方1	199
南薛湯	200
加味生薑橘皮湯	200
加味治中湯	201
涼血飲	201
7. 간장 담낭질환	202
加味茵陳湯	202
加味八物湯	202
茵陳五苓散	203
加味五苓散	203
肝臟 膽囊疾患 經驗方1	203
退黃飲	204
消黃湯	204
柴胡瀉肝湯	205
加味清肝湯	205
加味小柴胡五苓湯	206
加味柴苓湯	206
肝臟 膽囊疾患 經驗方2	207
加味柴平湯	207
加味升麻葛根湯	208
肝臟 膽囊疾患 經驗方3	208
四苓對金飲子	209
清肝解鬱湯	209
加味清肝消氣湯	210
柴胡湯	210

平肝湯	211
加味生肝健脾湯	211
生肝健脾湯	212
加減小柴胡湯	212
加味大柴胡湯	213
加味清肝湯	213
清肝補肝湯	214
加味鹽田湯	215
加味大柴胡湯1	215
加味茵陳五苓散	216
加味柴胡養胃湯	216
加味雙金湯	217
敗醬散	217
茵陳胃苓湯	218
加減地黃湯	218
無間生肝湯	218
番瀉葉湯	219
加味大柴胡湯2	220
健脾軟肝湯	220
加味人養湯	221
加味茵陳化瘀湯	221
清肝湯	222
治肝湯	222
加味仙方活命飲1	223
加味仙方活命飲2	223
金銀花治肝湯	224
消積正元散	224
加味對金飲子	225
清肝健脾湯	225
香附肉桂丸	226
加味小柴胡湯	226
當歸退黃湯	226
小柴胡合內消散	227
加味生肝湯	228
治痘湯	228
加味消脹湯	229

肝臟 膽囊疾患 經驗方5	229
加味解勞散	230
清肝丸	230
加味清肝湯	231
茵陳湯	231
生肝健脾湯	232
柴胡疎肝散	232
生肝健脾湯	233
肝臟 膽囊疾患 經驗方6	233
加味茵陳湯	234
加味消煎湯	234
烏梅一味煎	235
加味良枳湯	235
大柴胡湯加減方	235
加味大柴胡湯	236
加味疎肝湯	236
加味正氣散	237
解毒湯	237
蛔膽湯	238
藿香正氣散加味方	238
治囊湯	239
加味大柴胡湯	239
加味涼膈散火湯	240
加減柴胡湯	240
加味補中益氣湯	241
大柴胡湯加味方	241
肝臟 膽囊疾患 經驗方7	242
藿香正氣散	242
小柴胡湯加味方	243

제9장 내분비 및 영양 및 대사 질환244

1. 내분비질환	244
加味歸脾湯	244
加味苓香湯	244
內分泌疾患 經驗方1	245

2. 비만증	245
加味調胃升清湯	245
①蒼朮白虎湯(治善食而肥)/②加味二陳湯(食不甘而反肥 氣短身重)	246
3. 당뇨병	246
加味四物湯	246
加味地黃湯	247
加味地黃湯	247
加味地黃湯	248
糖尿病 經驗方1	248
糖尿病 經驗方2	248
血糖定丸	249
加味地黃湯	250
加減六味地黃湯	250
加味地黃湯	251
加味地黃湯1	252
加味地黃湯2	253
民間仙方	253
加味六味湯	254
加味地黃湯3	254
千金文武湯	255
地黃苦蓼湯	255
葛根當歸湯	256
加味六味地黃丸	256
加味十二味地黃湯	257
加味清心蓮子飲	257
眞陰蓮子湯	258
加味八珍湯	258
雙補丸	259
人蔘茯苓散	259
糖尿丸	260
加味腎氣丸	260
治糖丸	260

제10장 비뇨생식계 질환262

1. 비뇨계 질환	262
加味蓼芩湯	262
加味補腎湯	262
加味蓼芩湯	263
泌尿系疾患 經驗方1	263
加味六味元	263
泌尿系疾患 經驗方2	264
加味蓼芩湯	264
加減地黃湯	265
分清飲	265
加味五苓散	266
加味厚朴湯	266
加味十六味流氣飲	267
泌尿系疾患 經驗方3	267
加味三和湯	267
大分清飲加味方	268
加味五苓散	268
黃芩豬苓湯	269
增味五苓散	269
加味地黃湯4	270
加味六味地黃湯1	270
加味八味元	271
無間胡荽湯	271
八正蟠葱散	272
加減五積散	272
加味蟠葱散	273
加味芍藥甘草湯	273
本草院二神散	274
加味地黃湯2	274
金石五苓散	275
增味導赤散	275
加味地黃湯3	276
滑石散	276

2. 유방질환	277
加味逍遙散	277
加味芷貝湯	277
加味化癥湯	278
四物湯加味方	278
乳房疾患 經驗方1	279
乳房疾患 經驗方2	279
加味蟠葱散	280
3. 月經 崩漏 帶下	280
加味通經湯	280
活血湯	281
加味四物湯	281
加減調經湯	282
加味調血湯	282
吳茱萸湯	283
加味通經湯	283
四物湯加味方	284
附子理中湯	284
五積散加味方	285
加味五積散	285
加味調經湯	286
加味益胃升陽湯	286
加味升陽湯	287
溫經湯	287
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方1	288
升舉大補湯	288
然惜紅煎	289
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方2	289
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方3	290
加減八味帶下方	290
加味四物湯	291
加味四物湯	291
四物湯加味方	292
加味五積散	292
加味四物湯	293
加味升陽益胃湯	293

益胃升陽湯	294
地榆四物湯	295
清宮湯	295
舉元煎	296
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方4	296
加味五積散	297
加味秘元煎	297
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方5	298
加味蟠葱散	298
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方6	299
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方7	300
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方8	300
補血歸經湯	301
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方9	301
加味瀉濕湯	302
加味除濕湯	302
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方10	303
當歸黃芪湯加味方	303
4. 불임증	304
蟠葱散	304
加味調經種玉湯	304
調經種玉湯	305
加減種玉湯	305
加味補血催孕湯	306
加味溢經湯	306
加味調經湯	307
加味四物湯	307
然調經種玉湯	308
大溫經湯	309
加味毓麟煎	309
加味種玉湯	310
五積散加減	310
加味調經種玉湯	311
不妊症 陽虛 精少 經驗方1	311
調經種玉湯加減方	312
加味附益八物湯	312

加味溫膽湯	313
加味補中益氣湯	313
調經種玉湯	314
四物湯加味方	314
不妊症 陽虛 精少 經驗方2	315
慎言育精湯	315
固本湯	316
大營煎加味	316
不妊症 陽虛 精少 經驗方3	317
引精止血湯加減方	317
不妊症 陽虛 精少 經驗方4	317
補肝湯	318
十全五子湯	318
八味地黃湯加味方	319
滋腎湯(雙和湯加味)	319
勃起不全湯	320
拱辰龜板丸	320
加味溫膽湯	321
加味逍遙散	321
加慈陰降湯	322
加味逍遙散	322
加味逍遙散	323

제11장 임신, 출산 및 산욕324

1. 임신 출산 산욕	324
保胎飲	324
泰山盤石散	324
然安胎飲	325
保胞養血飲	325
人蔘達生散	326
加味橘皮飲	326
藿香正氣散加味方	327
加味順肝湯	327
加味保生湯	328
通乳湯	328
加味四物湯	329

佛手散加味方	329
升堤歸芪湯	330
加味小調經湯	330
人蔘麥門冬湯	331
金蘆飲子	331
加味補血湯	332
妊娠 出產 產育 經驗方1	332
妊娠 出產 產育 經驗方2	333
人蔘鹿茸湯	333
調血湯	334
歸芪補血湯	334
產後補元湯	335
五積散加味方	335
加味四物湯	336
歸朮保產湯	336
玉露散	337
芎歸調血湯加味方	337
妊娠 出產 產育 經驗方3	338
海桐皮湯	338
建中湯加味方	339
加味起枕散	339
知母湯	340
膠朮安胎飲	340
佛手散	341
四物湯加味方	341
歸朮破癥湯加味方	342
蘇紅芎歸湯	342
養腎湯	343
除濕牛桂飲	343
香蘇散加味方	344
妊娠 出產 產育 經驗方4	344
加味澤蘭湯	345
加味起枕散	345
加味補虛湯	346
逐露飲	346
加味芎歸湯 1	347
加味芎歸湯 2	347

白朮異香散	348
加味生化湯	348
加味補虛湯	349
妊娠 出產 產育 經驗方5	349
平胃散加味方	350
加味四物湯	350
柴胡四物湯	351
四物湯加減方	351
加味四物湯	352
補肺通乳散	352
當歸芍藥散	353
加味四物調經湯	353
順血湯	354
加味通乳湯	355
加味養血湯	355
妊娠 出產 產育 經驗方7	356
加味轉陽湯	356
加味地黃湯	357
加減地黃湯	357

제12장 근골격계 질환358

1. 근골격계질환	358
加味八仙湯	358
行氣萬金湯	358
加味補中益氣湯	359
三氣飲加味方	359
加味完手湯	360
加味大補湯	360
益氣補血湯	361
筋骨格系疾患 經驗方1	361
疎風活血湯加味方	362
加味二陳湯	362
疎風活血湯	363
加味夏麻湯	363
①大關節腫痛：大羌活湯	364
②小關節種痛：靈仙除痛飲	364

③大小關節腫痛：疎風活血湯	364
④無炎症性大小關節痛：烏藥順氣散	364
筋骨格系疾患 經驗方2	364
麻黃赤芍湯(方藥合編 靈仙除痛飲)	364
仙遺糧湯加減方	365
加味大防風湯	366
疎經活血湯	366
筋骨格系疾患 經驗方3	367
加味歸鬚散	367
萬金湯	368
清肝丸	368
加味腎氣湯	369
筋骨格系疾患 經驗方4	370
當歸地黃湯	371
三氣飲加味方	371
如神湯	372
加味通經湯	372
調榮活絡湯	373
加味當歸湯	373
加味五加皮地黃湯	374
加味桂枝湯	374
加味立安散	375
大防風湯	375
六子甘草湯	376
四六湯加味方	376
杜續湯	377
加減三氣飲	378
十全大補湯	379
五積散加味方	379
筋骨格系疾患 經驗方5	380
加味檳蘇散	380
加味如神湯	381
加味疎風活血湯	381
獨活寄生湯	382
疎風活血湯加味方	383
加味雙和湯	383
筋骨格系疾患 經驗方6	384

加味如神湯	384
加味四物湯	385
加味大防風湯	385
疎經活血湯加味方	386
建中湯加味方	387
順氣湯	387
加味通順散	388
加減六味地黃湯	388
白芍木瓜湯	389
如神養營湯加味方	389
加味四物湯	390
加味三氣飲	390
加味五積散	391
加味舒經湯	392
加味開結舒經湯	392
加減逍遙散	393
葛根加附子地黃湯	393
導痰除濕湯	394
連翹湯	394
加味八珍湯	395
加減大補湯	396
加味四物湯	397
金液丹	397
解濕湯	398
十六味流氣飲加味方	398
① 筋骨格系疾患 經驗方8 ② 加味不換金正氣散	399
承長湯	399
二十二味飛步湯	400
加味通順散	401
僧庵白朮湯	401
加味八珍湯	402
杜冲湯	402

제13장 피부 및 피하질환403

1. 피부질환403

大柴胡湯	403
------	-----

升麻胃風湯	403
加味生血潤膚飲	404
生血潤膚飲	404
荊芥三白湯	405
加味消風湯	405
加減益氣湯	406
加味八物湯	406
加味連翹飲	407
加味消風散	407
洗皮散	408
加味犀角升麻湯	408
加味荊敗散(湯)	409
何金湯	409
加味敗毒散	410
浮萍湯	410
加味防風通聖散	411
皮膚科疾患 經驗方1	411
枳通飲	411
清血除濕補皮散	412
清風湯	413
胡麻散加味方	413
加味四物湯	414
加味升葛湯	414
溫清飲(四物湯 合 黃連解毒湯)	415
涼膈散火湯	415
加味當歸飲子(湯)	416
生血清涼湯	416
加味養胃湯	417
排紅四物湯	418
犀角消毒飲	418
加味地黃湯	418
皮膚科疾患 經驗方2	419
皮膚科疾患 經驗方3	419
十味敗毒散加味方	420
皮膚科疾患 經驗方4	420
皮膚科疾患 經驗方5	421

五封散	421
蒙首散	422
神化飲	422
加味四物湯	422
胡麻散	423
清熱瀉心湯	424
養胃飲	424
加味荊翹湯	425
제14장 중독, 처치에 의한 특정 질환	426
1. 火傷 湯火傷 諸解毒	426
大黃赤石脂散	426
消丹飲	426
神聖膏	427
加味解毒湯	427
消火膏	428
加味葛花解醒湯	428
葛花解醒湯	429
加味對金飲子	429
人蔘養胃湯加味方	430
火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方1	430
六和湯	431
加味對金飲子	431
火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方2	432
제15장 孕기에 기원한 특정 질환	433
1. 신생아	433
沆瀣丹	433
加味甲己湯	433
제16장 건강 상태 및 관리	435
1. 건강관리	435
健康管理 經驗方1	435

加味六味地黃湯	436
清心補養湯	436
加味聰明湯	437
加減雙補湯	437
健康管理 經驗方2	438
八物湯加味方	439
大補湯加味方	439
加味十全大補湯	440
加味大補湯	440
清腦聰明元	441
加味雙和湯	441
加味補中益氣湯 合 生脈散	442
陰陽雙補湯	443
四物加葛根解肌湯	443
十全大補湯	444
제17장 기타 질환	445
1. 기타 질환	445
加味歸脾湯	445
金銀花湯	446
加味五積散	446
加味四物湯	447
加味清熱瀉火湯	447
九味羌活湯 加減方	448
加味柴胡加龍骨牡蠣湯	448
柴胡桂枝湯	449
疎風神佑丸	450
古庵心腎湯	451
처방명 색인	452

제1장 감염성 질환

1. 전염병

回生丹

藁 良 石 甘 桂 川 胡 丁 藿 白 乾 草
撥 薑 雄 草 皮 椒 椒 香 香 朮 薑 烏
黃

各
2
錢

各
5
錢

童
便
浸
1.5
兩

●주치 및 효능

虎列刺(콜레라 - 泄瀉, 腹痛, 消化不良)

●복용 용법·용량

爲末 糊丸 梧子大 黃丹二錢爲衣.

대인 1회 4~5개, 소아 1회 1~2개 - 찬 물과 함께 복용하며, 단, 콜레라시에는 중량을 배로 함.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

五苓散

桂 豬 白 茯 澤
枝 苓 朮 苓 瀉

各
1
錢

各
1.5
錢

2.5
錢

●주치 및 효능

가성 콜레라, 토사곽란

●복용 용법·용량

성인 기준으로 하루 1첩 복용

● 주의 사항

식중독, 토사곽란, 가성콜레라 등 어떤 병이라도 五苓散症, 즉 脈浮, 口渴, 小便不利만 있으면 효과 볼 수 있고, 이때 脈浮가 조금 의심스러울 때 胃苓湯이나 藿苓湯 투약함이 좋다.

• **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味平胃散

大棗	生薑	藿香	厚朴	陳皮	蒼朮	罌粟殼
各1.5錢					3錢	3.8錢

● 주치 및 효능

콜레라(怪疾)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味藿香正氣散

大棗 生薑 甘草 桔梗 半夏 草果 陳皮 白朮 厚朴 白茯苓
大腹皮 白芷 柴胡 蘇葉 藿香

炙
薑
製

2 枚	3 片	各 5 分	各 1 錢	1.5 錢
--------	--------	-------------	-------------	----------

● 주치 및 효능

瘧疾

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

저녁에 미리 한 첩을 달여 두었다가 병이 오는 날 해 뜨기 전에 복용하고, 또 한 첩은 10시경에 복용하고 재탕은 1시에 복용. 해 뜰 다음에 복약하면 효능이 없음

加味六味湯

白茯苓	當歸	川芎	鹿茸	肉蓯蓉	枸杞子	山藥	山茱萸	熟地黃	肉桂	附子	五味子	生薑	大棗
4錢							各2錢				各1錢	3片	2個

結核으로 인한 吐血, 四肢搖擗, 皮膚蒼白, 冷感

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

保化湯

靈芝	沙蔘	黃芪	百部根	白芨	蘇子研	麥門冬	天門冬	貝母	當歸身	白朮	砂仁研	山查肉	神麴	五味子	款冬花	紫菀	甘草	薑三棗三
			酒浸乾		去心								蜜蒸					
					各1.5錢									各1.0錢			各0.5錢	

● 주치 및 효능

肺結核

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3제 분량 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

과중한 노역과 성관계는 피해야 함.

補肺散

黃 艾 桔 乾 南 半 甘 骨 牛 人 淫 紫 百 白 陳 蘇 旋
精 葉 梗 薑 星 夏 草 碎 膝 蔘 羊 苑 部 朮 皮 葉 覆
補 藿 根 花

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

肺結核- 肺冷으로 因한 喘息

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷物

養肺湯

丹 枳 薏 黃 竹 夏 甘 芍 白 馬 柴 山 前 香 蘿 枇 葛 桑
蔘 實 苡 芩 茹 枯 草 藥 薇 兜 胡 藥 胡 附 菖 杷 根 白
仁 草 鈴 子 子 葉 根 皮

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

肺結核- 肺熱로 因한 喘息

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味三交湯

薑 甘 黃 枇 貝 蘇 天 麥 人 白 牧 枸 元 遠 白 山 山 黃 當 酸 乾
 三 草 芩 杷 母 子 門 門 蔘 朮 丹 杞 肉 志 茯 茱 藥 歸 棗 地
 棗 葉 冬 冬 皮 子 苓 萸 莢 仁 黃
 二

炒

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

● 주치 및 효능

肺結核 咳嗽症

● 복용 용법 · 용량

1일 2첩, 재탕 3회 복용

2~6제 복용

● 주의 사항

요양이 필요함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味小柴胡湯

紅 蘇 白 玄 牧 桃 神 砂 白 川 當 山 白 土 人 香 黃 柴 金
 花 木 芥 胡 丹 仁 麴 仁 芍 芎 歸 查 朮 蔘 附 芩 胡 銀
 子 索 皮 泥 炒 研 藥 身 肉 夏 子 花
 酒
 炒

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

3
錢

棗 薑 甘 沒 乳
草 藥 香

3 3 各
枚 片 5
分

● 주치 및 효능

結核性 肋膜炎-脇痛 寒熱 肋間痛甚 咳嗽原因 鬱血 瘀血 過重勞役

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

20 ~ 40첩 복용

● 주의 사항

성관계를 피함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

滋陰降火湯加味方

甘 生 黃 知 五 瓜 馬 陳 天 白 側 桑 玄 桔 白 鹿 熟 川 當
草 乾 柏 母 味 萸 兜 皮 門 朮 柏 白 芍 茸 地 芎 歸
地 子 仁 鈴 冬 皮 藥 黃
黃

灸 鹽 鹽
水 水
炒 炒

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

肺結核

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

吐血則 側柏 2錢(혹 3錢) 加 桔梗 玄蔘

銀花湯

甘 草	白 芥 子	青 皮	車 前 子	白 芷	桔 梗	玄 蔘	白 芍 藥	當 歸	蒲 公 英	金 銀 花
5 分	各 1 錢		各 1.5 錢		各 2 錢		各 3 錢		各 4.7 錢	

● 주치 및 효능

結核性 (濕性) 肋膜炎

● 복용 용법·용량

1일 3회 식후 1시간 복용

● 주의 사항

필히 활동을 삼가(늑막부위에 충격을 삼가야 함)

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 담배.

加味六味湯

黃 柏 皮	知 母	貝 母	麥 門 冬	五 味 子	鹿 茸	枸 杞 子	杏 仁	山 茱 萸	白 茯 苓	桑 白 皮	澤 瀉	牧 丹 皮	白 芍 藥	熟 地 黃	當 歸
鹽 水 炒	鹽 水 炒														
各 5 分			各 1 錢							各 1.5 錢				各 2 錢	

● 주치 및 효능

肺結核 痰盛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

10첩 ~ 20첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

3. 임질 매독 기타

寶命丸

麝香	牛黃	三稜	胡桐淚	血竭	沒藥	乳香	月石	龍腦	寒水石	石雄黃	靈砂	白靈砂
各 2 分		各 3 分		各 5 分					各 7 分		1 錢	3 錢

●주치 및 효능

淋疾, 梅毒

●복용 용법·용량

· 제법 : 모든 약을 가루내어 생밀가루 2냥과 섞고 다시 밀가루 풀로 녹두대 丸藥으로 만들고, 漆朱를 바른다.

· 복용 : 1일 2회 식후에 7환씩 복용한다.

●주의 사항

과용을 하지 말아야 한다.

斑猫散

甘黃斑	
草柏猫	
	鹽 同 去
	水 糯 翅
	炒 米 足
	炒
各 1 錢	5 錢

●주치 및 효능

淋疾

●복용 용법·용량

산제로 하여 1일 1회 저녁 잠자기 전에 0.3~0.5g씩 복용
반드시 다량의 물을 마실 것

●주의 사항

완치될 때까지 기름진 음식이나 술은 절대 금함

加味六味地黃湯

海 金 砂	鹿 角 霜	澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯 苓	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
各 1.5 錢					各 2 錢		4 錢

● 주치 및 효능

淋疾

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

1제 이상 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

治淋方

胡 桃	龍 腦	沒 藥	烏 賊 骨	乳 香	鐘 乳 石	血 竭	白 殭 蠶	白 芷	白 朮	水 銀	蕎 麥 粉
2 個	1 錢	各 1.5 錢								2 錢	3 錢

● 주치 및 효능

淋疾 梅毒 및 頸腺疾患

● 복용 용법·용량

· 제법 : 水銀을 蕎麥으로 죽여 물을 좀 가한 뒤, 粉末한 약재를 혼합하여 梧子大로 환을 만들고 滑石을 입힌다. 단, 頸腺疾患에는 甘草粉으로 입힌다.

· 복용 : 1일 2회 매 6丸씩 따뜻한 물과 함께 복용하되, 下焦病은 빈속에, 上焦病은 식사 후에 복용함.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 醋, 미역, 새우, 도미, 기타 자극성 있는 飮食物

八正散加味方

甘 草	當 歸	木 通	梔 子	黃 芩	大 黃	車 前 子	黑 丑	丹 蔘	蒲 公 英	滑 石	金 銀 花
各 1.2 錢	各 2.5 錢			各 3 錢		各 3.8 錢			各 7.5 錢		

● 주치 및 효능

淋病

● 활투

腎氣虛寒型-溫腎化濁 加 肉桂, 附子, 熟地黃, 山茱萸, 山藥, 丹皮, 澤瀉

陰虛火旺型-滋陰降火 加 女貞實, 旱蓮草, 知母, 黃柏, 生地黃, 山茱萸, 白茯苓

下焦熱毒型-清熱解毒 加 黃柏, 石菖蒲, 白朮, 蓮子肉, 丹蔘

肝經濕熱型-清熱利濕 加 龍膽草, 黃芩, 梔子, 澤瀉, 柴胡, 生地黃

加減丹粉丸

麝 香	牛 黃	枯 白 礬	硫 黃	琥 珀	鍾 乳 粉	石 雄 黃	黃 丹	白 靈 砂
1 分	2 分	各 5 分			各 1 錢			2 錢

● 주치 및 효능

淋疾 梅毒 手足瘡

● 복용 용법·용량

· 제법 : 細末하여 大棗肉作丸 綠豆大

· 복용 : 1일 2회 아침, 저녁으로 3~4丸씩 복용함

● 활투

淋疾, 梅毒 加 青皮 1錢

瘰癧 加 獨活 1錢

口鼻 加 枳殼, 乳下 加 柴胡,

手足瘡 加 穿山甲 1錢

手瘡 加 桂皮 1錢

淋疾 梅毒 其他 經驗方1

松 乾

筍 葛

各
4
錢

● 주치 및 효능

小兒腦炎(일본뇌염)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용하고 땀을 냄

● 주의 사항

발병 2일 이내인 경우는 치료경과가 좋으며, 3일 이상 된 자는 나아도 手足麻痺가 조금 있음

(1)加減香葛湯 (2) 神契香蘇散

(1) 加減香葛湯

大	生	甘	赤	升	蘇	柴	防	荊	獨	羌	川	白	陳	蒼	乾	香
棗	薑	草	芍	麻	葉	胡	風	芥	活	活	芎	芷	皮	朮	葛	附
																子
																炒

2
個

3
片

5
分

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

(2) 神契香蘇散

葱	黃	木	羌	麥	芍	甘	蒼	蘇	香
白	芩	通	活	門	藥	草	朮	葉	附
				冬					子

5
本

各
1
錢

5
分

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

SARS(瘟疫)- 治風寒兩感四時瘟疫頭痛寒熱無汗肢節疼痛咳嗽等症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

제2장 정신 및 행동장애

1. 遺精 夢遺 不眠

加味養心湯

甘 黃 枳 人 酸 遠 茯 半 桂 白 黃 川 當 陳
草 連 實 蔘 棗 志 神 夏 枝 朮 芪 芎 歸 皮
仁

法
製

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

- 주치 및 효능
遺精, 多夢症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

黃連清心飲

五 石 甘 人 遠 酸 白 當 生 黃
味 連 草 蔘 志 棗 茯 歸 地 連
子 肉 仁 神 黃

各
1
錢

- 주치 및 효능
男子夢遺
(夢遺之原因 在於心之虛實而心君虛則相火妄作 故睡中異物怪氣迷魂作泄也 虛者肝氣虛也 當補肝清心)
- 복용 용법·용량
1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

逍遙散

生 薄 麥 甘 元 當 柴 白 白 白
 薑 荷 門 草 肉 歸 胡 茯 芍 朮
 冬 苓 藥

3 5 各
 片 分 1
 錢

● 주치 및 효능

心因性 不眠, 消化障礙

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

치료한 경험의 40%에서 호전을 보임.

柴胡抑肝湯

甘 蒼 川 梔 香 地 生 連 青 牧 赤 柴
 草 朮 芎 子 附 骨 地 翹 皮 丹 芍 胡
 子 皮 黃 皮 藥

各
 1
 錢

各
 1.5
 錢

2.5
 錢

● 주치 및 효능

婦人獨陰症

(寡婦僧尼未嫁之女, 不可不分寡婦鬱悶百端心火無時不起 故氣血鬱滯而或經滯不通 宜抑肝火開鬱行氣則 自榮而行之矣)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 커피

遺精 夢遺 不眠 經驗方1

大棗	生薑	黃柏	砂仁	小茴香	破故紙	乾地黃	川芎	半夏	瓜蒌仁	黃連	甘草	白茯苓	香附子
												童便炒	
2枚	3片	各1錢		各1.5錢								2錢	3錢

● 주치 및 효능

臟滿煩鬱 諸痰火 氣鬱氣滯

(婦人 血虛痰火挾盛升降無常, 氣升則臟滿煩鬱 氣降則面部寒冷, 足部烘熱等症)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

甘草	香附子	白朮	麥門冬	梔子	黃芪	人蔘	遠志	酸棗仁	熟地黃	乾地黃	白芍藥	川芎	當歸	枳實	白茯苓	陳皮	半夏
3分	各1錢																1.5錢

● 주치 및 효능

心身不安症

● 복용 용법·용량

1일 2회 식후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味溫膽湯

甘 草	桔 梗	麥 門 冬	柴 胡	白 茯 神	人 參	竹 茹	枳 實	半 夏	橘 皮	香 附 子
4 分	各 5 分			各 1 錢					1.5 錢	2.5 錢

● 주치 및 효능

心臟衰弱, 怔忡, 不眠, 不安, 消化不良

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3제 이상 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

不眠 加 當歸, 酸棗仁, 紫蘇

頭痛 加 蔓荊子, 細辛, 天麻

消化不良 加 砂仁, 山查, 白豆蔻

平安安神湯

甘 草	柏 子 仁	麥 門 冬	竹 葉	蘇 葉	厚 朴	木 香	砂 仁	枳 實	白 朮	半 夏	陳 皮	黃 芪	酸 棗 仁	當 歸	熟 地 黃	白 茯 苓	龍 眼 肉
													炒				

各
5
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

心因性 不眠症, 心悸亢進

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味歸脾湯

甘 木 香 白 白 黃 人 遠 酸 元 當 白 熟
草 香 附 茯 朮 芪 蔘 志 棗 肉 歸 芍 地
子 神 仁 炒
黃

3 5 各
分 分 1
錢

1.5 2
錢 錢

● 주치 및 효능

神經衰弱 (頭重, 耳鳴, 眩暈, 不眠多夢 記憶力減退, 易怒)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味六脾湯

大 生 甘 神 木 砂 麥 竹 元 酸 遠 白 半 陳 白 人 黃 當
棗 薑 草 曲 香 仁 門 茹 肉 棗 志 茯 夏 皮 朮 蔘 芪 歸
冬 炒
神

2 3 各
個 片 7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

● 주치 및 효능

心身過敏으로 인하여 不眠症과 消化不良

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

1제 ~ 3제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味君子湯

甘 草	乾 薑	半 夏	甘 草	牛 膽 南 星	人 蔘	白 茯 苓	陳 皮	白 朮	牡 蠣 粉	元 肉	酸 棗 仁	石 菖 蒲	草 豆 蔻	神 曲	山 查	香 附 子	薄 荷	竹 葉
	炙	炒 黑									炒					炒		

各
5
分

8
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

怔忡 (心肝腎虛 및 이에 따른 消化不良 및 胃酸過多 및 潰瘍)

● 복용용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

3제 이내 경과 좋아짐.

● 주의사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 刺戟性 飲食, 酸性 飲食, 脂肪質, 高澱粉質, 寒冷 飲食, 一切酒類

● 환투

胃無酸症 去 牡蠣粉 加 麥芽 1錢

月經後期, 經色黑暗, 量少 加 牡丹皮, 玄胡索 各 7分, 紅花 3分

月經先期 加 白芷 丹蔘 炒荊芥 各 7分, 蒼朮 5錢

白帶下 加 龍骨 5分

歸溫湯

大 棗	生 薑	甘 草	木 香	枳 實	遠 志	竹 茹	陳 皮	半 夏	白 茯 神	白 朮	黃 芪	酸 棗 仁	元 肉	當 歸
				炒						炒		炒		

2
介

3
片

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

神心虛 精神不安 怔忡 驚悸 高血壓 狹心症 胸悶

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 활동

心虛火上熱 加 麥門冬 1.5錢，梔子仁，黃連 各 7分

氣鬱 加 香附子童便炒 1.5錢，蘇葉 7分

消化不良 加 山查 1錢半，神麴 麥芽 各 1錢，砂仁 7分

歸脾湯加味方

甘草 砂仁 遠志 竹茹 白茯苓 半夏 枳殼 檳榔 木香 陳皮 酸棗仁 元肉 山查 麥芽 神曲 白朮 香附子

各1錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

心跳，不安，不眠，不安神經症狀

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 활투

頭痛 加 甘菊，藁本

心熱 加 當歸酒炒，梔子鹽水炒

氣虛 加 人蔘，黃芪 1錢

眩暈 加 天麻, 山茱萸

柴胡桂枝湯加味方

日 人 甘 砂 黃 加 大 生 半 芍 桂 柴
黃 蔘 草 仁 芩 木 棗 薑 夏 藥 枝 胡
蓮

5
分

5分
1錢

各1錢

各
1
~
1.5
錢

2.5
錢

●주치 및 효능

스트레스로 기인되는 견항통, 두통, 상열감, 눈 흐림, 불안, 초조

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

30 ~ 40일간 복용

●활투

소화상태에 따라 木香, 砂仁 加減.

便秘有無에 따라 桂枝湯의 芍藥, 生薑, 大棗의 양을 조절.

상열감의 유무, 심계항진 유사증의 유무에 따라 日黃連 加減

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

500명 이상의 상기 환자의 치료경험 있으며, 그 중 80%이상이 증상호전 및 치유되었음.

四物合歸脾湯

大	生	甘	雞	枸	龍	人	黃	木	貢	酸	白	山	白	熟	白	川	當
棗	薑	草	內	杞	眼	蔘	芪	香	砂	棗	茯	查	朮	地	芍	芎	歸
			金	子	肉				仁	仁	神			黃			
2	3	各			各									各			
個	片	5			1									1.5			
		分			錢									錢			

●주치 및 효능

心悸, 不安, 不眠, 健忘, 眩暈, 一切神經疾患

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●활투

口渴, 煩熱 加 竹茹

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

60 ~ 70%는 유효한 것으로 사료됨

甘麥大棗湯

甘	大	小
草	棗	麥
各		7.5
1.5		錢
錢		

● 주치 및 효능

臟躁症

● 복용 용법·용량

하루 1첩

● 주의 사항

신경이 예민하고 눈물이 풍부하고 자주 하품이나 기지개 등 누구나 이런 증세를 가진 사람이면 적용처방에 이 처방의 合方이 可함. (主로 酸棗仁湯, 溫膽湯, 柴胡加龍骨牡蠣湯 등등)

四六湯加味方

黃 連	葛 根	麥 門 冬	竹 茹	川 芎	陳 皮	澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯 苓	山 茱 萸	山 藥	當 歸	白 芍 藥	生 酸 棗 仁	熟 地 黃	玄 蔘
各 1 錢					各 1.5 錢			各 2 錢						各 4 錢	

● 주치 및 효능

陰虛火動. 만성피로, 眼球赤, 眼球疲勞感, 潮熱感, 口乾, 口苦, 健忘症, 心因性 질환(偏頭痛, 項強, 眩暈症 등)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식후 30분에 복용

보통의 만성피로 환자 2제정도.

● 주의 사항

오래 복용할 경우 설사가 발생할 수 있으므로 이에 대비해야 함

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菓

● 활투

盜汗 加黃芪 3錢

潮熱甚 增 麥門冬 或 加 知母, 黃柏, 梔子

中氣冷弱 加 蒼朮, 半夏, 乾薑

頭痛 加 白芷

2. 梅核氣 其他

逍遙散加味方

陳 皮	厚 朴	半 夏	蘇 葉	甘 草	柴 胡	茯 苓	當 歸	白 朮	白 芍 藥
5 分	各 1 錢				1.5 錢	2 錢	各 3 錢		5 錢

● 주치 및 효능

梅核氣 鬱症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味逍遙散

生 薑	甘 草	薄 荷	遠 志	黃 芩	麥 門 冬	當 歸	柴 胡	白 芍 藥	白 茯 神	白 朮	香 附 子
3 片	各 5 分			各 1 錢							3 錢

● 주치 및 효능

婦人 心神煩鬱 月經不調

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

加味二陳湯

白芍藥 五味子 桂皮 沙蔘 黃柏 苦楝皮 天花粉 蒼朮 前胡 黃芩 桔梗 枳實 川芎 乾薑 烏藥 甘草 赤茯苓 陳皮 半夏

5分

各1錢

蓬朮 三稜 蒲黃 玄胡索 山查肉 川楝子 大黃

各5分

●주치 및 효능

婦人 背與胸乳間痰氣流走

●복용 용법·용량

1일 2회 식후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味滋陰健脾湯

黃連 牡丹皮 山茱萸 人蔘 唐木香 枸杞子 砂仁 遠志 白芍藥 當歸 生乾地黄 麥門冬 甘草 白茯苓 香附子 山查肉 陳皮 天麻 白朮

各3~5分

各5分

7分

各8~9分

9分

各1錢

●주치 및 효능

노인성 어지러움(眩暈), 치매예방

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

鐵掃散

甘 草	肉 桂	山 查 肉	白 芍 藥	木 香	玄 胡 索	青 皮	厚 朴	蒼 朮	砂 仁	陳 皮	香 附 子 童 便 炒
各 7 分			各 1 錢						各 1.5 錢		2 錢

● 주치 및 효능

心腹絞痛, 氣鬱

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

黃芩湯

甘 草	砂 仁	蒼 朮	人 蔘	香 附 子	枳 殼	梔 子	當 歸	陳 皮	黃 連	半 夏	赤 茯 苓	白 朮	黃 芩
各 5 分										各 1 錢			1.5 錢

● 주치 및 효능

火病

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

梅核氣 其他 經驗方1

大 生 甘 遠 砂 木 白 陳 益 酸 石 麥 熟 白 當 白 白 人
 棗 薑 草 志 仁 香 豆 皮 智 棗 菖 門 地 芍 歸 朮 茯 蔘
 蒨 仁 仁 蒲 冬 黃 藥 神
 炒

2 3 各
 個 片 5
 分

各
 7
 分

各
 1
 錢

● 주치 및 효능

臟燥症, 婦人의 무리한 생활과 心身의 疲勞, 搔爬手術後 心因性으로 오는 不眠症, 健忘
 症과 腰痛症, 怔忡

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味溫膽湯合六鬱湯

石 遠 枳 旋 甘 竹 枳 麥 桔 柴 川 蒼 陳 半 香 酸 白 白
 菖 志 殼 覆 草 茹 實 門 梗 胡 芎 朮 皮 夏 附 棗 芍 朮
 蒲 花 冬
 各 各 各
 1 1.5 2.5
 錢 錢 錢

黃 蘇 烏 檳 木
 連 葉 藥 榔 香

各
 8
 分

● 주치 및 효능

정신적인 과로, 스트레스로 인한 火病, 광범위한 신경성 증상(不眠, 頭痛, 胸悶, 上熱,
 項強痛, 胸痛, 消化不良, 便秘, 梅核氣, 喘息)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

- 1) 頭痛, 項強, 後頭痛 : 羌活, 獨活, 木瓜, 荊芥, 防風, 白芷, 藁本 各1錢, 甘菊, 薄荷, 細辛, 蔓荊子 各 5分
- 2) 消化不良 : 山楂 2錢, 砂仁, 神麴, 麥芽, 蘿菔子 各1.5錢
- 3) 梅核氣 : 蘇子炒 1.5錢, 白芥子, 南星, 青皮, 厚朴 各1錢, 白豆蔻, 益智仁 各5分 (2제 이상 꼭 복용하여야 효과 있음)
- 4) 便秘 : 麻子仁 2錢, 乾地黄, 杏仁, 大黃, 當歸 各1錢
- 5) 面熱, 面疱 : 升麻, 葛根 各1錢, 犀角, 牛蒡子, 玄蔘 各8分, 金銀花, 蒼耳子 各2錢
- 6) 心臟部痛症 : 草果, 五靈脂, 沒藥, 玄胡 各5分

石隱補遺方

甘	紅	蘇	桃	遠	生	柴	白	白	當
草	花	木	仁	志	地	胡	茯	芍	歸
					黃		苓	藥	
								炒	

各
1
錢

● 주치 및 효능

婦人癲狂 歌唱

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

환자의 외출을 금지시키고 간호를 주의할 것

● 활투

有熱 加 朱砂.

제3장 신경계 질환

1. 手顫症

治風湯

黃 柏	竹 茹	蟬 退	升 麻	天 麻	甘 菊	薄 荷	薏 苡 仁	鬱 金	土 茯 苓	葛 根	白 茯 苓	蔓 荊 子	釣 鉤 藤	白 芍 藥
各 5 分							各 1 錢							2 錢

● 주치 및 효능

風熱로 인한 痙攣, 振顫, 手顫症, 眼瞼痙攣, 癇疾

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 1시간에 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

去星散

桔 梗	唐 木	乾 薑	南 星	半 夏	狗 脊	甘 草	大 棗	陳 皮	白 朮	厚 朴	大 腹 皮	白 芷	蘇 葉	防 風	藿 香
各 5 分					各 1 錢										2 錢

● 주치 및 효능

風寒으로 急發作, 動風急症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

찬 음식을 피하고 몸을 따뜻하게 함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷食

祛風散

甘 桂 乾 南 香 荊 馬 威 紫 百 蒼 厚 木 獨 羌 蚤 防 蒼
草 枝 薑 星 薺 芥 兜 靈 苑 部 朮 朴 瓜 活 活 沙 風 耳
鈴 仙 根 子

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

風冷症으로 癰疾, 手攣, 痙攣, 眼臉痙攣

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

찬 음식을 피하고 몸을 따뜻하게 함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷食

補肝湯(一名 凉肝丸)

防 羌 川 白 當 熟
風 活 芎 芍 歸 地
藥 黃

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

小兒夜驚症. 睡中에 놀라 집밖으로 달려 나가는 아이에도 유효

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

10-12세 기준이고 5-6세는 減半

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

神經系疾患 手顫症 經驗方1

紅 花	元 防 風	甘 草	白 僵 蠶	土 鱉 甲	升 麻	生 地 黃	元 柴 胡	山 查 肉	釣 鉤 藤	土 天 麻	桔 梗	枳 殼	白 芷	土 川 芎	木 香	獨 活	羌 活	白 芍 藥
													去 油					

3 分	各 7 分			各 1 錢													各 1.5 錢	2 錢
--------	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------

● 주치 및 효능

幼兒 痙攣 一名 腦膜炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 환투

泄瀉 加 減生地黃, 升麻 5分

加味祛風散

大 棗	生 薑	甘 草	白 芍	防 風	荊 芥	白 芷	川 芎	天 麻	半 夏	南 星	桔 梗	烏 藥	陳 皮	青 皮	枳 殼	獨 活	羌 活	葛 根

2 個	3 片	各 1 錢																2.5 錢
--------	--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

● 주치 및 효능

手顫症

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

2. 頭痛 眩暈

第1方 健脾二四湯 / 第2方 加味夏朮湯

第1方 健脾二四湯

白朮 人蔘 陳皮 半夏 白茯苓 生乾地黃 當歸 川芎 白芍藥 麥門冬 天麻 防風 荊芥 遠志 甘草 薄荷 生薑 大棗

薑汁拌

2 個	3 片	各 5 分	各 1 錢
--------	--------	-------------	-------------

1.5
錢

第2方 加味夏朮湯

生黃乾澤麥神蒼黃人陳白白半
薑柏薑麻瀉芽曲朮芪蔘皮茯苓夏

干拌

各 1.5 錢	各 1 錢	各 5 分	3 片
---------------	-------------	-------------	--------

2
錢

● 주치 및 효능

眩暈頭痛(虛弱 體質의 眩暈證)/痰飲頭眩(作眼昏，嘔逆欲倒胃積不下)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

1~2제 복용하면 효과 있음

● 주의 사항

음식주의 - 술, 담배, 커피, 찬 음식, 녹두음식 금함

● 활동

・第1方

- ① 氣虛者 倍人蔘，黃芪 各 1錢半
- ② 有火眩暈 沙蔘，黃芩，川黃連 各 5分
- ③ 痛眩 加白芷，藁本 各 7分，甘菊 5分

- ・第2方

- ※ 第2方은 胃下垂로 惡嘔作眩하거나 高血壓 또는 低血壓證으로 無氣力하며 眩暈欲倒하는데 應用되는 處方이다.

薑 黃 柴 蔓 細 薄 防 荊 赤 陳 乾 白 川 當 半
芩 胡 荊 辛 荷 風 芥 茯 皮 地 芍 芎 歸 夏
子 子 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓 苓

2
錢

- **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味逍遙散

甘 草	薄 荷	蔓 荊 子	細 辛	白 芷	川 芎	牧 丹 皮	梔 子	柴 胡	白 茯 苓	白 芍 藥	白 朮	當 歸
各 7 分		各 1 錢							各 1.5 錢			2 錢

- 주치 및 효능
一切 頭痛, 특히 婦人 頭痛
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

二陳湯加味方

薑 草	甘 本	藁 麻	升 麻	薄 荷	荊 芥	防 風	白 芷	川 芎	赤 茯 苓	橘 皮	半 夏
7 片	各 1 錢		各 1.5 錢								3 錢

- 주치 및 효능
右偏頭痛 及頭半寒痛者
- 복용 용법·용량
1일 3회 식후 30분 복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

頭痛 眩暈 經驗方2

唐 白 穿 生 川
木 僵 山 地 芎
香 蠶 甲 黃
各 2 錢 4 錢

- 주치 및 효능
偏頭痛(左右 不問)
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
5~7첩 복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味四物湯

薄 陳 半 白 防 荊 熟 白 川 當
荷 皮 夏 芷 風 芥 地 芍 芎 歸
黃 藥
6 各 各
分 1.2 2.5
錢 錢 錢

- 주치 및 효능
陰虛頭痛(左頭痛)
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味歸茸湯

五 味 子	甘 草	木 香	鹿 茸	陳 皮	烏 藥	香 附 子	砂 仁	麥 芽	神 曲	山 查	元 肉	麥 門 冬	白 茯 苓	白 朮	山 藥	黃 芪	當 歸
5 分	各 1 錢																各 2 錢

●주치 및 효능

慢性 頭痛(高血壓, 口眼喎斜, 半身不遂)

●복용 용법·용량

1첩으로 1일간 아침, 저녁 2회 나누어 복용함

●주의 사항

陰虛나 火盛한 사람은 使用을 禁함, 或 鹿茸대신에 鹿角 2錢

●활투

腰痛 加 杜仲, 續斷 各 1錢.

高血壓 減 黃芪 1錢, 加 梔子, 黃芩 各3~5分

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

수년된 두통(1年~10年以上)은 氣虛頭痛이 많은 비증을 차지한다고 보며 상기 처방은 장기화된 氣虛가 氣鬱을 일으켜 야기된 두통에 탁월한 효과가 있음. 특히 裏冷으로 인해 잠을 깊이 자지 못하는 환자에게 적합하다.

加味清上蠲痛散

甘 草	砂 仁	麥 芽	細 辛	甘 菊	蔓 荊 子	麥 門 冬	白 芷	山 查 肉	葛 根	黃 芪	當 歸	川 芎	防 風	獨 活	羌 活	蒼 朮	黃 芩
3 分	各 5 分								各 1 錢								1.5 錢

炒

去
油

●주치 및 효능

一切頭痛

●복용 용법·용량

1일 1첩으로 아침 저녁 식사 후에 초탕, 재탕 2회 복용

● 주의 사항

妊婦 下血中 腹痛, 下泄中에는 복약을 삼간다.

● 활투

高血壓, 浮腫 加 木通, 瞿麥 各 1錢 黃連 2分

不眠 加 酸棗仁炒, 龍眼肉 各 1錢, 遠志 8分

清上蠲痛湯

甘 草	細 辛	甘 菊	蔓 荊 子	麥 門 冬	當 歸	白 芷	川 芎	防 風	羌 活	獨 活	蒼 朮	黃 芩
各 5 分				各 1 錢								1.5 錢

● 주치 및 효능

前後偏正頭痛甚.

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

虛寒及血壓低한 자는 不可用

위의 처방은 본방이므로 각 약재의 중량을 5分씩 가하면 적당함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷飮食

加味清上蠲痛湯

甘 草	細 辛	天 麻	甘 菊	蔓 荊 子	藁 本	麥 門 冬	白 芷	防 風	川 芎	當 歸	獨 活	羌 活	蒼 朮	黃 芩
各 5 分			各 7 分			各 1 錢								1.5 錢

● 주치 및 효능

頭痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

10첩이면 효과 봄.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

香芎湯

薄 荷	甘 草	防 風	桂 枝	香 附 子	川 芎	石 膏
1 錢	各 2 錢	3 錢	各 3.5 錢	7 錢		

● 주치 및 효능

偏頭痛, 全頭痛, 複雜한 머리를 정리할 때도 쓴다(安靜)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

생과, 생마늘, 생고추, 생정구지, 생양파도 피함.

加味清上蠲痛湯

甘 草	細 辛	蔓 荊 子	柴 胡	甘 菊	白 茯 苓	半 夏	陳 皮	麥 門 冬	白 芷	當 歸	土 川 芎	防 風	獨 活	羌 活	蒼 朮	生 薑	黃 芩
						製				酒 洗	去 油				米 泔 浸		酒 炒
各 2 分		各 5 分			各 1 錢											1.2 錢	1.5 錢

● 주치 및 효능

頭痛, 偏頭痛, 習慣性頭痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식후 2시간 후 복용. 1회 服用量 100ml-110ml

● 주의 사항

老人 及 虛人 無實熱者 禁

土川芎, 半夏는 법제를 要하고 黃芩, 當歸, 蒼朮은 법제하지 않아도 효과있음.

清上蠲痛湯

薑 甘 紅 細 黃 獨 麥 蔓 防 羌 白 川 當
草 花 辛 芩 活 門 荊 風 活 芷 芎 歸
冬 子

酒
洗

酒
洗

3 5 各
片 分 1
錢

● 주치 및 효능

頭痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

3. 口眼喎斜 癱疾 瘓攣

千金湯

甘 升 金 竹 白 釣 白 澤 防 豨 浮 夏 葛 桑
草 麻 銀 茹 茯 鉤 芍 瀉 己 薺 萍 枯 根 白
花 藤 藥 草 皮

各
5
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

風熱로 半身不隨, 기타 麻痺 口眼喎斜

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

理氣祛風散加味

全 蝎	甘 草	白 附 子	防 風	荊 芥	白 芍 藥	白 芷	川 芎	天 麻	半 夏	南 星	桔 梗	烏 藥	陳 皮	青 皮	枳 殼	獨 活	白 僵 蠶	羌 活	釣 鉤 藤
																	各 1.5 錢		3 錢

- 주치 및 효능
口眼喎斜(顔面神經麻痺)
- 복용 용법·용량
1첩으로 하여 복용하고 얼굴에 땀이 나도록 할 것
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 - 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

甘 草	白 芷	黃 芪	天 麻	陳 皮	獨 活	羌 活	防 風	五 加 皮	荊 芥	白 芍 藥	川 芎	當 歸	熟 地 黃
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------

各
1
錢

- 주치 및 효능
口眼喎斜(左右)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

正喎湯

生 薑	黃 芩	甘 草	細 辛	羌 活	蒼 朮	白 朮	白 芍 藥	南 星	當 歸	白 茯 苓	防 風	荊 芥	枳 殼	半 夏	陳 皮	烏 藥	石 菖 蒲	白 何 首 烏
5 片	1 錢	各 5 分		各 1 錢													各 1.5 錢	

● 주치 및 효능

口眼喎斜

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

通治丸

紫 檀 香 各 1 兩	白 芷	赤 茯 苓	香 附 子	草 果	蒼 朮	薄 荷	荊 芥	藿 香	厚 朴	砂 仁	川 芎	羌 活	前 胡	防 風	白 芍 藥	神 麴 3 兩	白 豆 蔻 2 兩
甘 草	枳 殼	人 蔘	柴 胡	良 薑	山 查	葦 撥	胡 椒	桂 皮	片 腦	乾 薑	檳 榔	丁 香	陳 皮	蘇 葉	木 香	半 夏	
各 1.5 兩		各 1 兩															

● 주치 및 효능

無論男女 中風 寒暑 口眼喎斜, 小兒傷食傷寒用

● 복용 용법·용량

· 제조법 : 위 약을 作末하여 生薑汁一器, 설탕 한 근, 白蜜少許調合作丸梧子大 朱砂 3錢 爲衣溫水 吞下(大人은 二丸, 小兒는 半丸). 綠豆大作丸 大人 25丸式 以上, 小兒 10丸 以上. 오자대일 때 소아는 대인의 1/4량이고, 綠豆大일 때는 소아는 대인의 2/5량으로 환의 대소에 따라 용량비율 조절

• 복용법 : 諸病에는 生薑湯吞下, 瘧疾等에는 桃枝湯吞下, 挾滯泄痢膿血腹痛 脹滿에는 溫水吞下, 途中過暑眼黑頭痛 冷水吞下.

清心溫膽湯

生薑	甘草	人蔘	遠志	川芎	麥門冬	白芍藥	當歸	香附子	黃連	石菖蒲	白朮	竹茹	枳實	茯苓	半夏	陳皮
									薑炒							

3 片	3 分	各 5 分	7 分	各 1 錢
--------	--------	-------------	--------	-------------

- 주치 및 효능
痢疾
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

定癰丸

紫何車	牛黃	人蔘	眞砂	牛膽南星	眞琥珀	石菖蒲	白殭蠶	全蝎	橘皮	遠志	白茯苓	半夏	貝母	天麻	麥門冬	丹蔘
			細研水飛	九製者亦好	豆腐煎炒	石杵碎取粉	甘草水洗去嘴炒	去尾甘草水洗		去心甘草水洗	煮	煮	薑汁製炒	去心	去心	酒蒸
1具以上	1錢	各3錢		各5錢					各7錢		各1兩				各2兩	

●주치 및 효능

五癰

●복용 용법·용량

① 用竹瀝一小碗 薑汁一盃再用 甘草四兩熬膏和藥爲丸 每彈子大辰砂爲衣每服 二丸 薄荷 달인 물이나 대추 다린 물 黑豆 달인 물에 적당히 먹도록 할 것.

② 1일 3회 식사 후 1시간에 매 2환씩 복용

간질종류 五癰에 나뉘서 먹는 물을 결정하였지만 의사가 간질발작현장을 보지 못하였으니까 위에 적은대로 薄荷湯이나 大棗 달인 물이나 검은 콩을 다려 놓고 먹으라고 지시할 것

③ 초기 발작한 환자는 1~2제로 치료되고 慢性年久한 자는 2, 3제로 치유됨.

桂芍湯

竹茹	防風	木瓜	白僵蠶	釣鉤藤	甘草	麥門冬	天花粉	大棗	生薑	桂枝	葛根	白芍藥
各1錢						各1.5錢				各2錢		3錢

●주치 및 효능

왼쪽 안면 신경 경련(아래 눈꺼풀, 입술위쪽), 두통 약간, 피로감 多

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

37세(여) 환자에게 10일간 투여 제반증상이 소실됨

回首散加減方

生薑	蒼朮	桂枝	甘草	木瓜	獨活	白茯苓	酸棗仁	羌活	桔梗	枳殼	白僵蠶	白芷	川芎	陳皮	烏藥	蘇葉	白芍藥	葛根
3片	各2分													各3分		各5分		1錢

●주치 및 효능

顔面痙攣

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味香蘇散

甘 陳 木 白 羌 桂 麻 蒼 蘇 香
草 皮 瓜 芷 活 枝 黃 朮 葉 附
子

炙

5 各
分 1
錢

1.5 各
錢 2
錢

● 주치 및 효능

小兒麻痺

● 복용 용법·용량

1첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

口眼喎斜 癰疾 痙攣 經驗方1

鹿 牛 女 杜 白 澤 牧 山 山 熟
角 膝 貞 冲 茯 瀉 丹 茱 藥 地
實 苓 皮 萸 黃

先
煎

3 各
錢 1.5
錢

各
2
錢

4
錢

● 주치 및 효능

小兒 腦水腫症

● 복용 용법·용량

半제 가지고 1개월간 복용하게 함

● 치료경험

6개월 소아. 생후 6개월에 발생되었던 경우로, 頭上에 물이 차서 내원한 경우로, 半제 씹 2회 복용으로 완치됨

제4장 눈 및 눈부속기 질환

1. 안질환

桂丹何首湯

龍	甘	乾	半	茯	何	丹	桂
眼	草	薑	夏	苓	首	皮	枝
肉					烏		
10	2				各		
介	錢				3		
					錢		

● 주치 및 효능

雀目 無赤痛(眼疾 白內障)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

茯澤石膏湯

甘	石	半	梔	澤	茯
草	膏	夏	子	瀉	苓
2	各				
錢	3				
	錢				

● 주치 및 효능

濕熱蒸 目珠黃赤者

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 芫花

少陰人 加 附子 五分 ~ 一錢

少陽人 加 熟地黃 二錢 ~ 五錢

제5장 귀질환

1. 귀질환

連翹敗毒散

生 薑	防 風	荊 芥	薄 荷	蔓 荊 子	白 芷	黃 芩	玄 蔘	連 翹	甘 草	赤 茯 苓	川 芎	桔 梗	枳 殼	獨 活	羌 活	前 胡	柴 胡	沙 蔘	金 銀 花
3 片																			2 錢

● 주치 및 효능

中耳炎, 항상 濃汁이 流出, 감기 時에만 流出, 小兒 고막에 물 고인 것

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

急性 20첩으로 치유됨. 慢性 20첩 이상 數제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減荊防敗毒散

甘 草	川 芎	柴 胡	黃 柏	白 芷	玄 蔘	黃 芩	羌 活	天 花 粉	白 茯 苓	桔 梗	前 胡	防 風	荊 芥	澤 瀉	麥 門 冬	連 翹	薏 苡 仁	金 銀 花
															1.3 錢	各 2.2 錢		5 錢

薑	蔓 荊 子	薄 荷	半 夏	貝 母	枳 殼
3 片	5 分	8 分	各 1 錢		

● 주치 및 효능

急慢性 中耳炎, 外耳道炎

- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯

細 辛	蔓 荊 子	薄 荷	甘 菊	防 風	荊 芥	枸 杞 子	遠 志	石 菖 蒲	龜 板	五 味 子	當 歸 身	澤 瀉	白 茯 苓	牧 丹 皮	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
						甘 草 水 製			酒 炙								
各 8 分				各 1 錢								各 1.5 錢			各 2 錢		4 錢

- 주치 및 효능
腎虛, 氣虛로 인한 耳鳴症 及 耳聾症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
충분한 안정을 요함.
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈
- 활투
耳聾者 加 川芎, 白芍藥 各 1錢, 知母, 黃柏 8分 減 熟地黃 2錢

耳科疾患 經驗方1

藁 本	五 味 子	砂 仁	甘 草	白 芍 藥	木 通	連 翹	桑 白 皮	蔓 荊 子	白 芷	桔 梗	獨 活	防 風	荊 芥	羌 活	陳 皮	金 銀 花	黃 芪	白 茯 苓
各 5 分		各 8 分				各 1 錢											1.2 錢	1 錢 ~ 1.5 錢

- 주치 및 효능

耳聾(急慢性 中耳炎)

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

4주~6주 복용.

급성의 경우, 8첩 단위로 1일 5회까지 복용시킴.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

小柴胡湯合香蘇散

蘇	甘	陳	大	人	黃	香	生	半	柴
葉	草	皮	棗	蔘	苓	附	薑	夏	胡
						子			
2	5	7	各			各	1.2	1.8	
分	分	分	8			1	錢	錢	
			分			錢			

●주치 및 효능

어린이들의 氣閉로 인한 감기 뒤끝에 생긴 難聽

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

제6장 순환기계 질환

1. 순환계질환

滋陰降火湯加味方

大	生	貝	瓜	黃	杏	知	黃	甘	陳	白	麥	天	乾	熟	白	當
棗	薑	母	薤	連	仁	母	柏	草	皮	朮	門	門	地	地	芍	歸
			仁								冬	冬	黃	黃	藥	
									炙							

2
個

3
片

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

심장성 천식(cardiac asthma)

● 복용 용법·용량

1제 이상

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味地黃湯

枳	五	澤	白	牧	貝	砂	山	白	桔	天	麥	蘇	山	山	熟
殼	味	瀉	茯	丹	母	仁	查	朮	梗	門	門	子	茱	藥	地
	子		苓	皮		研	肉			冬	冬		萸		黃
											去	炒			
											心				

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

棗 薑 黃 知 紫 款 附
 柏 母 苑 冬 子
 花

鹽 鹽
 炒 炒

3 3 各
 枚 片 5
 分

● 주치 및 효능

천식(기관지성 심장성 폐확장증)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

20~40첩 복용

● 주의 사항

과중한 노역과 성관계를 피함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

正氣天香湯

甘 乾 蘇 陳 烏 香
 草 薑 葉 皮 藥 附
 子

各 各 各
 5 1 3
 分 錢 錢

● 주치 및 효능

흉비통

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

循環系疾患 經驗方1

石 菖 蒲	白 朮	遠 志	酸 棗 仁	五 味 子	麥 門 冬	人 參	三 七 根	五 靈 脂	枸 杞 子	白 何 首 烏	巴 戟 天	天 麻 冲	杜 仲 根	葛 根 苓	白 茯 苓	山 藥	丹 參	牡 蠣	黃 芪	天 花 粉
各 1.2 錢	各 2.5 錢						各 3.8 錢									各 7.5 錢				2.5 錢

● 주치 및 효능

심장병, 당뇨

● 복용 용법·용량

심장판막증, 고혈압, 당뇨 등에 처방하되 少量으로 장복을 요망

●活套

식욕이 없을 때 加 烏梅, 鷄內金 加 2.5錢

脾氣虛弱으로 인한 便溏 加 白朮 2.5錢, 薏苡仁 7.5錢

腎陰虛 加 知母, 黃柏 2.5錢

肺氣虛 加 黃芪 12錢 ~ 15錢

肺陰虛로 인한 渴飲 加 天花粉 7.5錢

十全大補湯加味方

大 棗	生 薑	甘 草	肉 桂	茯 苓	川 芎	白 芍 藥	當 歸	白 朮	黃 芪	熟 地 黃	紅 參
各 1 錢								各 1.5 錢		各 2 錢	

● 주치 및 효능

과로로 피곤할 때 심장부위 조이는 듯 아프고 불쾌할 때 또는 꼭꼭 찢르듯 아플 때(심장기능 무력증)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味清心湯

薄 甘 竹 人 柴 白 梔 黃 麥 酸 遠 白 當 生 白
 荷 草 茹 蔘 胡 朮 子 連 門 棗 志 茯 歸 乾 芍
 冬 仁 神 黃 藥
 炒

各
5
分

3
~
5
分

各
8
分
~
1
錢

●주치 및 효능

심장질환(협심증)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

●활투

胃弱者 加 山査肉, 香附子, 砂仁, 唐木香 各 5分

循環系疾患 經驗方2

燈 甘 黃 木 白 玄 生 酸 麥
 心 草 連 通 茯 蔘 地 棗 門
 苓 黃 仁 冬
 5 各 各 各
 分 1 1.5 2
 錢 錢 錢 錢

●주치 및 효능

心臟瓣膜症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

2. 고혈압

淸風湯

甘 草	升 麻	甘 菊	梔 子	黃 芩	酸 棗 仁	蟬 退	豨 薟	茵 陳	夏 枯 草	玄 蔘	釣 鉤 藤	蔓 荊 子	芍 藥	葛 根
各 5 分					各 1 錢								各 2 錢	

●주치 및 효능

風熱로 인한 高血壓

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

消風散

甘 草	桔 梗	唐 木 香	厚 朴	白 芷	白 殭 蠶	防 風	羌 活	枳 殼	杜 冲	山 查 肉	荊 芥	酸 棗 仁	蒼 朮
各 5 分				各 1 錢								各 2 錢	

●주치 및 효능

風冷으로 인한 高血壓

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

保溫, 忌寒風

·복용 중 피해야할 음식 : 冷飮食, 氷菓, 冷水,

葛根解肌湯

白 大 桔 酸 杏 黃 升 葛
芷 黃 梗 棗 仁 芩 麻 根
仁

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

陽毒, 面赤, 咽喉痛, 項强, 頭痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

몸이 찬 사람은 피한다.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

성인병, 항강, 두통, 뒷목 뻣뻣한 증세에 좋은 효과를 보아 왔으며, 中風 예방에도 활용하고 있음.

六味地黃湯加味方

牛 車 澤 牧 白 山 山 熟
膝 前 瀉 丹 茯 茺 藥 地
子 皮 苓 莢 黃

1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

4
錢

● 주치 및 효능

高血壓, 動脈硬化, 上熱下寒, 心煩, 上氣(頭後)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

清上蠲痛湯

薑	甘	細	甘	蔓	麥	白	當	川	防	獨	羌	蒼	黃
	草	辛	菊	荊	門	芷	歸	芎	風	活	活	朮	芩
3 片	各 3 分		各 5 分	子	冬								1.5 錢

- 주치 및 효능
高血壓 頭痛者
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
老人虛弱者 氣血不足虛弱者 禁用
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四六湯加減方

甘	桂	黃	川	當	牧	澤	白	山	熟	山	五	枸	白	麥
草	皮	芪	芎	歸	丹	瀉	茯	藥	地	茱	味	杞	芍	門
					皮		苓		黃	萸	子	子	藥	冬
各 1 錢					各 1.5 錢			各 2 錢					2.5 錢	3 錢

- 주치 및 효능
高血壓
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味導痰湯

生黃黃枳竹香南甘半鷄赤陳
薑連苓殼葉附星草夏內茯皮
炒炒炒炒炮

5 各 各 1.3 各
片 8 1 錢 1.5
分 錢 錢

- 주치 및 효능
高血壓
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
食不化에는 不用

加味通聖散

白黃天防荊桔烏甘五山玄川當獨甘香石滑
芷苓麻風芥梗藥菊加查蓼芎歸活草附膏石
花皮肉子

各
1
錢

棗薑梔薄荷蔓連
子荷荊翹
子

3 3 各
枚 片 5
分

- 주치 및 효능
高血壓
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
봄가을 환절기에 20첩씩 복용

● 주의 사항

눈의 疲勞가 오지 않도록 함.

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활동

고혈압 초기 실증 加 桑枝 1.5錢, 稀薷酒蒸9次, 蒼朮米泔浸 各等分

烏藥順氣散加味方

薑二 甘草 防風 南星 砂仁 木香 威靈仙 乾薑 白殭蠶 枳殼 桔梗 白芷 川芎 白朮 厚朴 烏藥 陳皮 麻黃 當歸

5
分

各1錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

高血壓(中風으로 인한 高血壓도 可)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味豨葛湯

生 甘 蔓 升 牛 桔 白 香 半 蘇 羌 防 川 豨 葛
薑 草 荊 麻 膝 梗 芷 附 夏 葉 活 風 芎 薺 根
子 子

董製

炒 酒
蒸

3片 各5分

各1錢

2
錢

● 주치 및 효능

高血壓 및 中風豫防, 高血壓性頭痛眩暈 諸症

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

高血壓 經驗方1

大 雲 蒼

蜈 母 朮

蚣

百 3 7
尾 兩 兩

● 주치 및 효능

高血壓

● 복용 용법·용량

蒼朮-米泔浸去油乾, 雲母-鹽水煮乾, 大蜈蚣-薑汁浸乾

上藥細末糊丸 梧子大 自量服

● 주의 사항

疎風湯

甘 細 紅 桃 桂 木 牛 荊 防 羌 香 熟 白 川 當 石 烏 陳 鈞
草 辛 花 仁 枝 瓜 膝 芥 風 活 附 地 芍 芎 歸 菖 藥 皮 鉤
子 黃 藥 蒲 藤

黃
精
法

各
5
分

各
1
錢

各
1.2
錢

1.8
錢

● 주치 및 효능

高血壓 中風(左半身不遂症) 動脈神經 異狀

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

증상에 따라 2~3제, 혹 1~2개월 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

● 활투

大便不通秘症 加 肉蓯蓉, 桃仁

烏藥順氣湯

桂枝	薏苡仁	破故紙	杜冲	鹿角上	木瓜	牛膝	白芷	防風	羌活	川芎	當歸	桑寄生	石菖蒲	烏藥	陳皮	釣鉤藤
----	-----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	-----

黃精法修治

各
1
錢

各
1.2
錢

1.8
錢

大棗	生薑	甘草	紅花	附子	木香
----	----	----	----	----	----

炮

2 個	3 片	各 5 分
--------	--------	-------------

● 주치 및 효능

高血壓 中風(右半身不遂症) 靜脈神經異狀

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

便秘不通者 熟地黃 3錢, 桃仁 1錢

3. 中風

蒼橘湯

葛	甘	羌	黃	威	赤	赤	橘	蒼
根	草	活	柏	靈	芍	茯	皮	朮
				仙	藥	苓		
2	各			各			1.5	2
錢	5			1			錢	錢
	分			錢				

● 주치 및 효능

中風, 특히 酒濕中風, 痲痺. 평소 飲酒者의 痲痺, 後遺증

● 복용 용법·용량

음주자의 中風(酒濕) 발생시 1일 5~6회 복용하시고 수술이후의 者에도 효과 큼.

● 주의 사항

1~3일 복용시까지는 發汗을 시키지 말 것

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大羌活湯

破	續	杜	加	甘	乾	澤	當	秦	牛	白	防	羌	木	獨	蒼
故	斷	冲	防	草	薑	瀉	歸	朮	膝	朮	己	活	瓜	活	朮
紙			風												
炒															

各
1
錢

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

各
1.2
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

中風 後遺증, 특히 過飲酒者의 痲痺

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

虛弱者는 복용시킴에 신중히 함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

治星湯

安 息 香	黃 連	梔 子	菊 花	甘 草	決 明 子	升 麻	白 頭 翁	忍 冬	車 前 子	白 茯	前 胡	釣 鉤 藤
各 5 分				各 1 錢					各 2 錢			

●주치 및 효능

風熱로 急發作, 人事不省, 動風된 것

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

中風 經驗方1

金 銀 花	白 殭 蠶	甘 草	草 烏	川 烏	何 首 烏	細 辛	白 芷	麻 黃	荊 芥	防 風	羌 活	川 芎	當 歸	天 麻	石 斛	全 蝎	桂 枝	牛 膝	蒼 朮
-------------	-------------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

煨
去
毛
根
去
腹
土

各
1.7
兩

2 兩 4 兩 6 兩

牛 黃	麝 香	苦 楝 根	片 腦	芒 硝	大 黃	附 子	官 桂	烏 藥	石 菖 蒲	白 蒺 藜	紅 花	大 風 子	蟬 退	穿 山 甲	枳 殼	草 果	靈 砂	朱 砂	石 雄 黃
--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------

各
1
錢

各
5
錢

各
1
兩

各
1.2
兩

各
1.3
兩

●주치 및 효능

中風 手足麻痺, 下肢動脈硬化症

●복용 용법·용량

1일 3회, 1회 3~5푼(분말복용)

● 주의 사항

腎기능이나 肝기능이 약한 자는 삼가기 바람

加味大補湯

陳 牛 半 防 威 木 桂 獨 羌 肉 黃 熟 白 川 當 甘 白 白 人
皮 膝 夏 風 靈 瓜 枝 活 活 桂 芪 地 芍 芎 歸 草 茯 朮 蔘
仙 黃 藥 苓

各
1
錢

● 주치 및 효능

四肢不仁(中風症)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味續斷湯

大 元 酸 細 石 遠 川 當 木 杜 白 獨 羌 桂 烏 蒼 巴 五 牛 續 威
棗 肉 棗 辛 菖 志 芎 歸 瓜 冲 芷 活 活 枝 藥 朮 戟 加 膝 斷 靈
仁 蒲 皮 仙
炒

2 各
個 1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

中風 全身不隨

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

加味續斷湯 加 長魚湯(민물 것) 한 그릇씩 1일 3회 겸복함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 치험예

전신(四肢)을 못 쓰는 환자가 2년간이나 병상 생활을 했는데 上記 處方 3제를 복용하고 완치하였음

加味祛風湯

生 薑	川 烏	甘 草	白 芷	桔 梗	防 風	土 川 芎	羌 活	黃 連	黃 芩	烏 藥	半 夏	蒼 朮	赤 芍 藥	陳 皮	當 歸	白 茯 苓	澤 瀉	白 朮
						去 油					薑 製							
3 片	各 5 分			各 7 分		各 1 錢						各 1.5 錢						2 錢

● 주치 및 효능

모든 中風, 右側 半身不仁

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

형편 따라 全蝎 5分 첨가할 수 있음. 川烏는 환자의 혈압에 따라 증감함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味潤燥湯

大 棗	生 薑	甘 草	桂 枝	黃 芩	黃 連	生 地 黃	蒼 朮	牛 膝	秦 朮	續 斷	陳 皮	杜 冲	羌 活	防 風	烏 藥	南 星 土	川 芎	當 歸	白 芍 藥
2 個	3 片	各 5 分				各 1 錢						各 1.5 錢							2 錢

● 주치 및 효능

中風 左半身不隨 多用

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈, 담배

● 활투

冷者 加 川烏炒黑 7分,

地黃飲子加味方

大	生	薄	黃	石	官	附	麥	白	五	遠	石	肉	山	巴	熟	釣	烏
棗	薑	荷	連	菖	桂	子	門	茯	味	志	斛	蓯	茱	戟	地	鉤	藥
				蒲			冬	苓	子			蓉	萸		黃	藤	
2	3	各					各									各	
個	片	5					1									2	
		分					錢									錢	

● 주치 및 효능

中風後遺症으로 인한 半身不遂, 言語鈍化. 뇌경색

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

大秦朮湯加味方

蘇	甘	細	五	藿	麻	升	荊	當	川	赤	熟	天	羌	秦	生
葉	草	辛	靈	香	黃	麻	芥	歸	芎	芍	地	麻	活	朮	地
			脂				穗			藥	黃				黃
各					各						各		各		
5					1						2		3		
分					錢						錢		錢		

● 주치 및 효능

半身不遂 精神如故 別無重者 多効方

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

6첩 분량 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

中風 經驗方2

肉桂	甘草	破故紙	乾薑	山查	白何首烏	當歸	半夏	貝母	瓜蒌仁	黃芩	大腹皮	車前子	柴胡	桑白皮	人蔘	白茯苓	陳皮	香附子
各1錢								各1.5錢								各2錢		3錢
胡桃	大棗	生薑	五味子	杏仁	日黃連	熟地黃	枳實	麥門冬	砂仁	黃芪	川芎	白豆蔻	毛黃連	厚朴	桔梗			
1個	2個	3片	各5分			6分	7分	各8分					各1錢					

● 주치 및 효능

中風

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈, 冷食

疎風湯

甘草	香附子	白芷	烏藥	川芎	當歸	防風	羌活	枳殼	赤茯苓	陳皮	南星	半夏
各8分								各1錢				2錢

● 주치 및 효능

中風

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

제7장 호흡기계 질환

1. 衄血(鼻出血)

衄血(鼻出血) 經驗方1

甘 草	犀 角 代 牛 角	桔 梗	柴 胡 土	白 芍 藥	川 芎	梔 子	黃 芩	黃 連	乾 地 黃	側 柏 葉	旱 蓮 草
									1.5 錢	2 錢	3 錢

● 주치 및 효능

鼻出血

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

20첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味六味地黃湯

鹿 角	甘 草	澤 瀉	牧 丹 皮	川 芎 苓	白 茯 苓	山 藥	山 茱 萸	黃 柏	知 母	當 歸	白 芍 藥	白 芩	香 附 子	熟 地 黃
													2 錢	4 錢

薑 三 棗 二	白 茅 根	貝 母	五 味 子	麥 門 冬	枸 杞 子	元 肉 蓼	人

各
1
錢

● 주치 및 효능

衄血(嗽時, 洗面時, 疲勞時), 熱出血症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味地黃飲

甘 草	白 芩	茜 根	當 歸 頭	香 附 子	白 茯 苓	澤 瀉	牧 丹 皮	犀 角 代 牛 角	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃	白 茅 根	鹿 角
--------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-----------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

5 各
分 1
錢

2 各
錢 3
錢

● 주치 및 효능

衄血

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

절대적인 안정을 취함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

● 활투

熱 加 黃連 5~7分

止衄湯

玄 蔘	麥 門 冬	天 門 冬	熟 地 黃	生 地 黃
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

各
1
兩

● 주치 및 효능

衄血

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

●활투

高熱 加 黃芩 茜根 各 3錢

加味四物湯

白 茅 根	防 風	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎 歸	當 歸 芪
各 1 錢		各 2.5 錢			5 錢

●주치 및 효능

衄血(취침중 세면중 과로할 때에 출혈)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

急性 則 10첩, 慢性 則 20첩 以上

●주의 사항

忌 : 過勞, 禁酒, 洗面時에 코를 풀지 말 것

升麻芍藥湯

黃 芪	柴 胡	乾 地 黃	阿 膠	牛 膝	蘇 葉	川 芎	當 歸	大 薊	側 柏	白 芍	升 麻
		黃 珠								藥	
各 2 分			各 1 錢					各 3 錢		各 3.5 錢	

●주치 및 효능

衄血, 吐血

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味犀角湯

甘 草	牧 丹 皮	犀 角 鎊	黃 連	黃 芩	梔 子	陳 皮	側 柏 葉	地 榆	阿 膠 珠	白 茅 根	麥 門 冬	赤 茯 苓	白 芍 藥	當 歸	黃 芪	生 乾 地 黃 灸
--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	-----------------------

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

5
錢

●주치 및 효능

衄血

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1~2시간에 복용.

6첩복용

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味生黃湯

茜 根	黃 柏	黃 連	黃 芩	犀 角 鎊	白 茅 根	赤 芍 藥	生 地 黃
--------	--------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------

各
2
錢

各
3
錢

●주치 및 효능

鼻出血

●복용 용법·용량

1일 3회 식후 1시간에 복용

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

犀角地黄湯加味方

梔 子	甘 草	薄 荷	香 附 子	當 歸	牧 丹 皮	犀 角	赤 芍 藥	黃 芩	川 芎	生 地 黃
各 1 錢			各 1.5 錢						2 錢	3 錢

● 주치 및 효능

鼻出血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味四物湯

糯米	黃 柏 皮	柴 胡	升 麻	白 茯 苓	川 芎	當 歸	白 芍 藥	熟 地 黃	地 榆	黃 芪	葛 根	側 柏 葉
1 撮	各 1 錢				各 1.2 錢				各 2 錢		各 3 錢	

● 주치 및 효능

鼻衄症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

10첩 사용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

莎芎散

黃 當 黃 牧 三 大 側 犀 川 赤 生 香
芩 歸 芪 丹 七 薊 柏 角 芎 芍 地 附
根 葉 代 升 藥 黃 子
炒
黑

各
1
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

衄血

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사후 30분에 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

當歸芍藥散

川 當 澤 白 白 白
芎 歸 瀉 茯 芍 朮
苓 藥

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

衄血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

少陽人(熱性)은 生地黃 3錢, 牡丹皮, 黃芩, 黃連 各 1錢 加함이 더욱 좋음
이 처방은 본래 血虛症에 쓰는 약이나 衄血治療에 효과가 큼.

加減八物湯

茜根 白茅根 熟地黃 人蔘 白芍藥 當歸 川芎 白朮 白茯苓 砂仁 甘草 麥門冬 龍骨 黃芩 枸杞子 生薑 大棗

酒炒

2
個

3
片

各1錢

各
1.5
~
2
錢

各5錢

● 주치 및 효능

衄血 (鼻部毛細血管이 弱하여 過勞나 壓迫時 發生하는 경우)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

清肺湯

大棗 阿膠 龍眼肉 甘草 柴胡 桑白皮 白朮 麥門冬 香附子 黃芩 白茅根 白芍藥 川芎 當歸 蓮根 生地黃

1
個

5
分

各1錢

各2錢

● 주치 및 효능

小兒衄血，衄血症，

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

衄血(鼻出血) 經驗方2

黃連	黃芩	澤瀉	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃	白茅根
各1錢		各1.5錢			各2錢		各4錢	

● 주치 및 효능

衄血頻數

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味小建中湯

大棗	生薑	黃連	甘草	桂枝	白芍藥
					炒

各1錢

2錢 3錢

● 주치 및 효능

허약체질의 衄血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

草白湯

甘 薄 砂 川 王 側 地 阿 白 決
草 荷 仁 芎 不 柏 榆 膠 芩 明
研 留 葉 珠 子
行

微
炒

各
5
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

衄血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

6첩으로 유효

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

瀉心湯

黃 黃 大
芩 連 黃

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

吐血, 咯血, 衄血, 鼻炎(小兒鼻炎 出血時 神效), 結膜出血時 神效,
腦出血, 高血壓

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

2. 鼻淵 鼻炎

加味金沸草散

烏梅	生薑	大棗	連翹	甘草	細辛	半夏	赤茯苓	麻黃	前胡	金沸草	黃芩	荊芥穗
1 個	3 片	2 個	各 5 分			7 分	各 1 錢		各 1.5 錢		各 2 錢	

●주치 및 효능

小兒 및 靑少年 鼻淵濁涕, 鼻塞, 靑少年蓄膿症, 咳嗽

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

防風通聖散加味方

梔子	白朮	荊芥	連翹	薄荷	麻黃	大黃	赤芍藥	當歸	川芎	防風	桔梗	黃芩	石膏	甘草	辛夷花	滑石
各 5 分			各 1 錢											各 2 錢		

●주치 및 효능

急慢性 鼻炎, 인후염과 제반 아토피성 피부질환

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

피부질환이나 감기에 걸렸을 경우에는 비린내 나는 생선을 금함.

黃芩洗肺湯

赤 白 甘 杏 半 天 五 薄 荊 麥 桑 赤 桔 梔 黃
 茯 芷 草 仁 夏 門 味 荷 芥 門 白 芍 梗 子 芩
 苓 茶 冬 子 冬 皮 藥

酒
炒

各
1
錢

3
錢

● 주치 및 효능

蓄膿症, 鼻炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~3제 정도 복용

半夏白朮天麻湯

生 黃 乾 澤 人 黃 神 天 茯 蒼 白 麥 陳 半 辛
 薑 柏 薑 瀉 蔘 芪 麴 麻 苓 朮 朮 芽 皮 夏 夷
 花

酒
洗

5
片

2
分

5
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

● 주치 및 효능

鼻塞症(鼻炎, 알러지성 鼻炎)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

1~2월간 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

胃腸이 弱한 者로서 車量, 食不化 등을 목표로 한다.

風熱性的 鼻塞症(코방귀)은 不用.

虛症이 甚하면 補中益氣湯을 合方한다.

生 柴 黃 甘 薄 桑 杏 桔 麥 升 川 桂 白 葛
薑 胡 芩 草 荷 白 仁 梗 門 麻 椒 枝 芍 根
 皮 冬 藥

炒

2.8 錢

- ※川椒는 반드시 法製하여 煎湯함

細 羌 白 梔 枳 桔 黃 柴 白 川 當 防 連 荊 黃 蒼 辛 甘
辛 活 芷 子 殼 梗 芩 胡 芍 芎 歸 風 翹 芥 芪 朮 夷 草
藥 藥 花

2
錢

- **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 鷄肉, 豬肉, 酒, 갈치, 고등어 음식

歸脾湯加味方

甘草 木香 白茯苓 白朮 金銀花 薄荷 荊芥 五味子 麥門冬 細辛 黃芪 遠志 酸棗仁炒 龍眼肉 當歸 防風 辛夷花

各5分

各1錢

1
錢

1.5
錢

2
錢

● 주치 및 효능

鼻炎 치료 특효(알레르기성, 蓄膿症, 記憶力減退), 鼻炎으로 인한 喘息 豫防

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의사항

• **꼭 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味連翹敗毒散

[illegible]

生薑	薄荷	五味子	貝母	桑白皮	山查
3片	各5分			各1錢	

● 주치 및 효능

蓄膿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

약 복용 후 腸鳴泄瀉하면 1일 2회 줄여서 복용

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

防風通順散

細 辛	黃 連	薄 荷	荊 芥	麻 黃	白 芷	梔 子	連 翹	桔 梗	防 風	赤 茯 苓	川 芎	當 歸	甘 草	黃 芩	石 膏	蒼 耳 子	滑 石
		酒 炒	酒 炒			炒										酒 炒	

各
7
分

各
1
錢

各
1.2
錢

各
1.7
錢

● 주치 및 효능

鼻淵, 蓄膿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四六湯加味方

薑 三 棗 二	防 風	荊 芥	蒼 耳 子	梔 子	細 辛	薄 荷	甘 草	白 芷	黃 芪	白 芍 藥	川 芎	當 歸	茯 苓	澤 瀉	牧 丹	山 茱 萸	山 藥	熟 苳
	各 5 分					各 7 分			各 1 錢							各 1.5 錢		2.5 錢

● 주치 및 효능

알레르기성 비염

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 환투

胃虛 加 蒼朮·陳皮·神麴·砂仁

加味麗通湯

葱	大	生	梔	元	白	細	川	麻	甘	辛	蔓	桂	麥	葛	升	元	獨	羌	蒼	黃
白	棗	薑	子	柴	芷	辛	椒	黃	草	夷	荊	枝	門	根	麻	防	活	活	朮	芪
1 莖	2 個	3 片	各 5 分		各 7 分				各 1 錢		花 子		冬		各 1.5 錢					2 錢

● 주치 및 효능

蓄膿症

● 복용 용법·용량

1일 3회 식후 1시간에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

● 환투

消化不良 加 山查, 蘿菈子 各 1錢, 神麴 5分

加味桂芍湯(桂枝防風湯 加減方)

甘	乾	辛	桔	桑	葛	砂	陳	藿	川	防	桂	白	黃
草	薑	夷	梗	白	根	仁	皮	香	芎	風	枝	芍	芪
				皮								藥	
灸	炒			炒								炒	
	黑												
各 7 分		各 8 分				各 1 錢				1.2 錢		各 1.5 錢	

● 주치 및 효능

慢性 鼻炎 및 蓄膿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 따뜻하게 복용.

청소년 2제, 성인 5제가량 복용,

● 주의 사항

禁 冷飮食, 肉食

第一方 通竅湯/ 第二方 枸杞天麻湯

第一方 通竅湯

薄 荷	細 辛	辛 夷	川 椒	麻 黃	川 芎	甘 草	葛 根	升 麻	藁 本	羌 活	防 風	蒼 耳 子	黃 芪	白 芷
各 5 分	各 1 錢			1.5 錢	各 2 錢							各 3.5 錢		

第二方 枸杞天麻湯

細 辛	鱉 甲	天 花 粉	川 芎	桔 梗	石 菖 蒲	辛 夷	陳 皮	貝 母	樺 皮	合 歡 皮	甘 菊	天 麻	遠 志	白 茯 苓	枸 杞 子	瓜 蒞 仁
5 分	各 1 錢												1.5 錢	2 錢	各 4 錢	

●주치 및 효능

副鼻洞炎(蓄膿症), 알레르기성 鼻炎(코막힘)

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

3~6제 복용으로 유효

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 담배, 커피, 찬 음식

人蔘敗毒散加減方

生 薑	薄 荷	甘 草	赤 茯 苓	川 芎	桔 梗	枳 殼	獨 活	羌 活	前 胡	柴 胡
3 片	5 分	各 1 錢								

●주치 및 효능

알러지성 鼻炎(아침, 저녁 저기온때 재채기와 맑은 콧물증)

●복용 용법·용량

1일 3첩 식후 복용함.

2~3제 복용

● 주의 사항

본방에서 인삼을 거하였음(沙蔘을 4g 넣을 수도 있고 안 넣어도 됨).

黃芩 1錢을 가하고 성인은 본방 배하고 소아는 원방대로(黃芩)을 가하여 사용함

麗澤通氣湯加減方

葱 大 生 白 川 麻 甘 葛 升 防 獨 羌 蒼 黃
白 棗 薑 芷 椒 黃 草 根 麻 風 活 活 朮 芪

炙

3 2 3 各 5 各 1
莖 個 片 3 分 7 錢
分

● 주치 및 효능

蓄膿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~3제 복용함

● 주의 사항

성인은 상기 처방의 3배를 하고 소아는 상기 처방의 2배를 함. 황기는 성인의 경우, 6배하여 사용하고, 소아는 4배하여 사용함.

少陰人 十全大補湯 加減

青 蒼 細 加 官 甘 陳 川 當 白 白 黃 白 人
皮 朮 辛 半 桂 草 皮 芎 歸 芍 朮 芪 何 蔘
夏 藥 首 烏

炙

各
1
錢

● 주치 및 효능

少陰人 虛勞, 咳嗽, 鼻淵, 鼻痔. 失音

● 복용 용법·용량

하루 3번 복용하고, 식사와 무관함. 식사하지 않고 먹어도 됨

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

消化 弱 加 草果, 砂仁, 藿香, 草豆蔻를 加味

胃弱, 冷 去 白芍藥 或 白芍藥炒

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

1~2개월이면 거의 좋아지고 코주변에 針을 자침함(7일/2회). 환자수 10명 치료율 90% 이상

加味二陳湯

甘 細 白 黃 防 荊 赤 陳 半
草 辛 芷 芩 風 芥 茯 皮 夏
苓

各
5
分

各
1
錢

2
錢

● 주치 및 효능

鼻淵, 蓄膿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

葛根 2錢, 升麻 1錢을 加하는 것도 좋음

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

通竅湯

辛夷花	薄荷	細辛	川椒	麻黃	川芎	葛根	升麻	甘草	蒼耳子	藁本	羌活	防風	蒼朮	黃芪	白芷
3分	3分	4分	各5分		7分	各1錢							1.7錢	各2錢	

- 주치 및 효능
鼻炎
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
200명 이상경험있으며, 70%에서 유효한 경과를 보았음.

葛根加附子地黃湯

附子	大棗	甘草	生薑	芍藥	桂枝	麻黃	地黃	葛根
5分	各1錢						3錢	

- 주치 및 효능
알러지성 鼻炎
- 복용 용법·용량
1일 3회 식사 후 30분에 복용
- 주의 사항
상기 처방을 한 첩으로 하여 3일 분 정도 주어서 차도를 살피고 만성 인 경우 (대개는 만성) 일주일 분 정도 주어서 반응을 살핀다.
麻黃이나 附子の 용량이 惡寒, 骨節痛, 脈의 상태에 따라 많은 변화 요구
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
風寒이나 風熱이나를 상세히 변증하여 風寒인 경우에 食慾이나 消化力이 있는 경우는 100명을 잡았을 때 80%이상의 치료율

通竅湯 加味

薄	細	辛	蜀	麻	蒼	甘	藁	獨	防	葛	升	蒼	白	黃
荷	辛	夷	椒	黃	耳	草	本	活	風	根	麻	朮	芷	芪
			花		子									
各					各							各		
1					1.5							3		
錢					錢							錢		

● 주치 및 효능

알러지성 鼻炎/ 渗出性 中耳炎, 鼻塞, 안구주위 소양감, 頭痛(환절기 혹은 아침에 심해지는 경우)-寒, 虛증에 屬

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
2~3제.

● 주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 유제품(아이스크림, 치즈 등), 동물성 지방, 찬 음식, 찬 음료수 등

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

매우 효율적. 80% 이상

川芎茶調散加味方

梔	貝	黃	甘	桔	辛	細	白	荊	川
子	母	芩	草	梗	夷	辛	芷	芥	芎
					花				
炒	去	酒		炒				酒	
黑	心	炒						拌	
2	各								
兩	1								
	兩								

● 주치 및 효능

蓄膿症, 鼻炎, 鼻痔

● 복용 용법·용량

위의 약을 배합하여 세말하여 매회 7.5g씩 식후에 松蘿차나 박하탕에 섞어서 1日 3服한다. 蓄膿症患者에게는 대부분이 鼻炎 또는 鼻痔(肥厚性鼻炎)을 겸한 자가 많은데 慢性鼻炎도 本藥으로 치료가 된다. 慢性鼻痔(肥厚性鼻炎患者)는 별도로 외치약 투여.

* 外治藥處方

瓜礬散

- 瓜蒂 4錢, 甘遂 1錢, 枯白礬(螺殼灰-소라껍질. 다슬기로 代用하여도 무방하다.) 草烏尖 (끝을 잘라서) 各 5分. 細辛, 石雄黃 1錢共爲細末하여 참기름에 반죽을 하여 콩알 만하게 만들어 매일 밤 취침시에 코 안에 넣고 군살위에 약이 닿도록 하면 그 군살(코치질)

을 잊어버리고 잠을 잔다.

- 이튿날 군살이 녹아 떨어진다.

- 양쪽에 鼻痔가 다 생겼으면 격일로 넣는다.

白黃散

雄 瓜 細 雄 白
犬 蒂 辛 黃 礬
膽
汁

● 주치 및 효능

肥厚性 鼻炎

● 복용 용법·용량

첩藥은 防風通聖散 加三稜海藻와 麗澤通氣湯을 번갈아 가면서 投藥, 白黃散은 作末作丸하여 얇은 명주천에 싸서 올챙이 모양으로 만들어 코 속에 넣고 탈지면으로 막아둠.

①加味荊芥蓮翹湯, ②加味防風通聖散, ③加味補中益氣湯

① 甘 連 枳 蘖 黃 梔 薄 防 白 乾 白 川 當 柴 荊
草 翹 殼 本 芩 子 荷 風 芷 地 芍 芎 歸 胡 芥
黃 藥

炒

各
1
錢

② 梔 白 白 防 桔 黃 石 甘 黃 荊 連 薄 麻 大 乾 赤 當 川 滑
 子 朮 芷 風 梗 芩 膏 草 連 芥 翹 荷 黃 黃 地 芍 歸 芎 石
 黃 藥

炒

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

1.5
錢

③ 川 麻 升 柴 陳 當 連 梔 白 防 荊 麥 甘 白 白 人 黃
 椒 黃 麻 胡 皮 歸 翹 子 芷 風 芥 門 草 茯 朮 參 芪
 冬 苓

炒

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

알려지성 비염

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

3. 咽喉疾患

清火湯

竹 黃 滑 升 薄 甘 桔 黃 黃 犀 連 防 荊 玄
 葉 柏 石 麻 荷 草 梗 連 芩 角 翹 風 芥 蔘
 鎊

7
葉

各
1
錢

● 주치 및 효능

咽喉腫痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

重者나 오래된 사람 五六첩이나 十첩까지도 무방함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷食, 생회, 콩치, 고등어

通關飲

或 乾 薄 荊 防 赤 白 人 甘 桔
附 薑 荷 芥 風 茯 朮 蓼 草 梗
子 苓

炙

3 各
分 5
分

各
1
錢

1.5 2
錢 錢

● 주치 및 효능

喉痺腫痛 不能言語

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 천천히 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味敗毒散

甘 防 荊 玄 桂 枳 白 葛 半 柴 厚 竹 蒼 桔 牛 黃 麻 白 川 當
草 風 芥 蓼 枝 殼 芷 根 夏 胡 朴 茹 朮 梗 蒡 苓 黃 芍 芎 歸
子 藥

各
1
錢

● 주치 및 효능

咽喉炎, 咽喉腫痛

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清和飲

防	荊	黃	知	天	黃	白	川	當	熟	甘	玄	桔
風	芥	柏	母	花	芩	芍	芎	歸	地	草	蔘	梗
				粉		藥			黃			
各				各							4	5
1				3							錢	錢
錢				錢								

●주치 및 효능

咽喉腫痛 扁桃腺炎(乳蛾喉痺)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 복용.

20첩 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

吹喉散

牛	朱	龍	月	枯	石	寒	馬
黃	砂	腦	石	白	雄	水	牙
				礬	黃	石	硝
					水		
					飛		
各							
3							
分							
	各						
	1						
	錢						
		各					
		2					
		錢					

●주치 및 효능

咽喉閉塞懸雍下垂腫痛及單乳蛾雙乳蛾

●복용 용법·용량

上藥八種細末竹管吹入喉中 1회 1~2분, 1일 2~3회

●주의 사항

용량엄수. 소아감량

咽喉 經驗方1

黃芩	大黃	知母	白芍	連翹	麻黃	石膏	白朮	當歸	薄荷	荊芥	金銀花	桔梗
3分	各5分		各8分									2錢

- 주치 및 효능
扁桃腺炎, 咽喉腫痛
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
高熱時 加 豆豉 5分

加味甘桔湯

白朮	薄荷	黃連	梔子	連翹	防風	荊芥	黃芩	桔梗	甘草	玄參	生地	天花粉	山豆根
各1錢								各2錢					

- 주치 및 효능
咽喉腫痛, 食涎難下(水穀不入)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 천천히 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

清上補下湯

甘 草	黃 連	黃 芩	瓜 薢 仁	半 夏	杏 仁	五 味 子	枳 實	澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯 苓	貝 母	天 門 冬	麥 門 冬	桔 梗	桑 白 皮	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
各 5 分								各 7.5 分			各 1 錢							2 錢

● 주치 및 효능

氣管支炎 및 喘息, 특히 乾咳嗽 기침

● 복용 용법·용량

1일 2-3회, 식사 1시간 후에 복용

● 주의 사항

소아기침에도 탁월한 효과가 있다.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味芍藥湯

甘 草	黃 連	半 夏	陳 皮	赤 茯 苓	草 烏	木 香	防 風	麻 黃	沙 蔞	細 辛	桂 枝	枳 殼	桔 梗	葛 根	玄 胡 索	川 芎	白 芍 藥
各 1 錢																	

● 주치 및 효능

肋間神經痛(脇痰) - 기침을 하면 주로 좌측에 특히 發하는 경우

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味清冷散

白 薄 甘 天 知 黃 乾 當 黃 枳 防 黃 連 梔 桔
 芷 荷 草 花 母 柏 地 歸 連 殼 風 芩 翹 子 梗
 粉
 炒

各
5
分

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

扁桃腺炎(慢性)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

4. 感冒

五積散加減方

陳 麻 白 白 乾 當 枳 桔 厚 甘 桂 半 白 川 蒼
 皮 黃 茯 芍 薑 歸 殼 梗 朴 草 皮 夏 芷 芎 朮
 苓 藥
 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各
 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 分 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

感傷風寒 頭身痛 四肢厥冷 胸腹作痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味香蘇散

薑 三 葱 二	砂 仁	五 味 子	桑 白 皮	茯 苓	桔 梗	玄 蔘	蘇 子	麥 門 冬	枳 殼	甘 草	葛 根	黃 芩	前 胡	柴 胡	蘇 葉	蒼 朮	沙 蔘	香 附 子	山 查 肉
	各 8 分			各 1 錢															2 錢

●주치 및 효능

一切感氣, 寒熱, 咳嗽

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

妊婦 또는 下血中, 下泄中일 때는 복용을 금함

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

九味羌活湯加味方(仁山은 靈神解毒湯이라 名)

葱 白	大 棗	生 薑	甘 草	細 辛	生 地	黃 芩	白 芷	川 芎	蒼 朮	防 風	羌 活	黃 芪
2 莖	2 個	3 片	各 1 錢		各 2 錢							3 錢

●주치 및 효능

傷寒日久 乍寒乍熱 咳嗽. 六經證에 該當되지 않고 微微하게 發熱乍痛乍止하며 諸藥이 不效할 때

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味升葛敗毒散

麻 陳 半 款 桑 瓜 升 獨 羌 防 荊 白 川 枳 桔 柴 前 蒼 葛
黃 皮 夏 冬 白 蕪 麻 活 活 風 芥 芷 芎 殼 梗 胡 胡 朮 根
花 皮 仁

法
製

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

生 薄 甘 白 神 麥 黃
薑 荷 草 茯 麴 芽 芩
苓

3 7 各
片 分 1
錢

● 주치 및 효능

四時感氣, 咳嗽, 寒熱往來, 惡寒, 口渴, 喘息, 消化不良, 毒感, 四肢骨節痛, 頭痛, 流行性毒感

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

不眠患者는 麻黃을 빼고 蘇葉을 代替함, 鷄, 비늘없는 고기(無鱗魚) 禁함

溫肺散

南 半 訶 乾 唐 蘇 艾 甘 大 桔 黃 百 桂 獨 厚 陳 紫 杜 旋
星 夏 子 薑 木 葉 葉 草 棗 梗 精 部 枝 活 朴 皮 苑 冲 覆
香

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

肺冷으로 인한 感氣, 咳嗽, 몸살, 기침

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

찬 음식을忌하고 몸을 따뜻하게 할 것

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷食

清肺湯

薄 升 黃 竹 葛 甘 桑 馬 枳 蘿 山 柴 前 合 白 車 枇 茵
荷 麻 芩 茹 根 草 白 兜 殼 菖 藥 胡 胡 歡 茯 前 杷 陳
皮 鈴 子 皮 苓 子 葉

各
5
分

各
1
錢

●주치 및 효능

肺熱로 인한 感氣 몸살 기침 해소

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

溫痰散

唐 乾 南 半 甘 澤 山 桔 草 川 白 厚 桂 青 陳 蘇 旋
木 薑 星 夏 草 蘭 查 梗 果 芎 檀 朴 皮 皮 葉 覆
香 香 花

各
5
分

各
1
錢

●주치 및 효능

肺冷으로 인한 痰盛

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

忌冷物(氷菓類, 찬 음료수, 생 것, 날 것, 쫄 것). 몸 따뜻하게 할 것

清痰湯

竹茹	黃芩	甘草	瓜蒌仁	馬兜鈴	柴胡	沙參	前胡	車前子	蘿菔子	枇杷葉	桑白皮	白芍藥
各5分		各1錢									各2錢	

● 주치 및 효능

肺熱로 인한 盛痰 가래

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減敗毒散

薑三片	薄荷	甘草	防風	荊芥	赤茯苓	川芎	桔梗	枳殼	獨活	羌活	前胡	柴胡	沙參	蘇葉	陳皮	葛根	蒼朮	香附子
	5分	各1錢												1.5錢	各2錢			

● 주치 및 효능

風寒感傷 發熱 頭痛 肢體痛 鼻塞 聲重

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減蔘蘇飲

棗	薑	甘	枳	桔	陳	馬	款	白	蘿	蘇	桑	麥	赤	葛	半	前	蘇	沙
		草	殼	梗	皮	兜	冬	芥	菹	子	白	門	茯	根	夏	胡	葉	蔘
						鈴	花	子	子		皮	冬	苓					
2	3	各				各												
個	片	1				1.5												
		錢				錢												

● 주치 및 효능

風寒感傷 頭痛 發熱 咳嗽 痰多

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 담배

四六湯

甘	五	貝	紫	半	陳	桑	杏	沙	桔	白	牧	澤	白	當	麥	山	山	熟
草	味	母	苑	夏	皮	白	仁	蔘	梗	茯	丹	瀉	芍	歸	門	茱	藥	地
	子					皮				苓	皮		藥		冬	萸		黃
各			各										各					2.5
7			1										1.5					錢
分			錢										錢					

● 주치 및 효능

咳嗽(陰虛)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菹

加味甘桔湯

貢	藿	甘	蘇	五	款	杏	天	陳	白	桔	前	白	元	貝	桑
砂	香	草	子	味	冬	仁	門	皮	茯	梗	胡	朮	肉	母	白
仁				子	花		冬		苓						皮
各															
1										各					
錢										2					
										錢					

● 주치 및 효능

氣管支炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減香蘇散

葱 生 甘 陳 蒼 蘇 香
白 薑 草 皮 朮 葉 附
子

炙

2	3	5	1	1.5	各
個	片	分	錢	錢	2
					錢

● 주치 및 효능

感冒風寒 頭痛 身疼 惡寒發熱

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

頭痛 加 川芎, 細辛, 白芷 各 1錢

咳 加 杏仁, 桑白皮 各 1錢

脚膝拘攣 加 木香, 檳榔 各 五分, 羌活, 木瓜 各 1錢

口乾 加 葛根 1錢

葛根湯

杏 薄 甘 升 白 獨 桔 香 黃 羌 麻 葛
仁 荷 草 麻 芷 活 梗 附 芩 活 黃 根
子

各
1
錢

- 주치 및 효능
流行性 感氣
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
咳嗽甚 加 半夏, 貝母 1錢

敗毒散加味方

生 甘 獨 羌 人 連 防 荊 薄 柴 前 枳 白 川 款 紫 桔 五
薑 草 活 活 蔘 翹 風 芥 荷 胡 胡 殼 茯 芎 冬 苑 梗 味
子

1
片

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

各
12
錢

- 주치 및 효능
咳嗽, 慢性乾咳嗽
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
虛弱者 : 紫苑, 款冬花 各 8分

加味補肺湯

大 棗	生 薑	甘 草	柏 子 仁	蘇 子	桑 白 皮	枸 杞 子	杏 仁	五 味 子	貝 母	桂 皮	半 夏	桔 梗	陳 皮	人 蔘	麥 門 冬	白 朮
2 個	3 片	各 7 分				各 1 錢									各 2 錢	

● 주치 및 효능

久咳嗽

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

1제~3제 連服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味杏蘇湯

生 薑	黃 芩	柴 胡	甘 草	五 味 子	白 朮	貝 母	半 夏	金 銀 花	桔 梗	麥 門 冬	梔 子	陳 皮	桑 白 皮	蘇 葉	杏 仁
5 片	各 5 分			各 1 錢											

● 주치 및 효능

感風寒咳, 久咳嗽

● 복용 용법·용량

매식 후 30분에 1일 3회 복용

● 주의 사항

음식주의 : 담배, 술, 커피, 찬 음식, 녹두음식 금함

杏蘇散

砂 黃 知 桑 麥 五 杏
仁 柏 母 白 門 味 仁
皮 冬 子

各
7
分

各
1
錢

- 주치 및 효능
心熱嗽, 氣管支炎, 全身疲勞氣虛咳嗽
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
10첩 服用
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
痰盛時 加 貝母 蘇子 各 1錢

十神湯加味方

薑 防 桂 加 甘 白 乾 川 陳 麻 赤 升 蘇 香
三 風 枝 味 草 芷 葛 芎 皮 黃 芍 麻 葉 附
葱
二
子

各
1
錢

- 주치 및 효능
일반 모든 感氣
- 복용 용법·용량
1회 1첩 복용. 즉시 取汗 30분(복용직후 바람 쐬면 無效)
- 주의 사항
방약합편 본방대로 사용하면 麻黃이 있어서 或者는 부작용이 날 수 있지만, 桂枝, 防風을 加하면 안전하게 사용할 수 있음
- 활투
咳嗽 加 杏仁 桑白皮 各 1錢
咽痛 加 荊芥 桔梗 各 1錢

5. 傷暑

暑門香葛湯

葱 白	生 薑	甘 草	升 麻	白 芍 藥	白 扁 豆	厚 朴	葛 根	香 薷
					去 皮		薑 汁 炒	
2 莖	3 片	各 1 錢		各 1.5 錢		2 錢	3 錢	

● 주치 및 효능

暑月感冒 (溽暑陰風이 薰蒸襲人으로 初症狀이 恰似 傷寒하여 頭痛, 肢節痛, 惡寒發熱의 等症)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

2첩 이상은 금함. 老虛人은 금함.

● 활투

心臟 煩熱 加 黃連 7.5分

清暑益氣湯

五 味 子	甘 草	乾 葛	麥 門 冬	青 皮	當 歸	黃 柏	澤 瀉	神 曲	陳 皮	白 朮	人 蔘	升 麻	黃 芪	蒼 朮
			去 心			酒 炒		炒 研					蜜 炒	
9 粒	各 3 分						各 5 分					各 1 錢	1.5 錢	

● 주치 및 효능

老人이나 虛人의 暑感症(發散의 劑를 不敢用)

●복용 용법·용량

2첩 連用可

二香散

葱 白	生 薑	木 果	甘 草	白 扁 豆	厚 朴	蒼 朮	陳 皮	紫 蘇	香 薷	香 附 子
				去 皮	薑 汁 炒					童 便 炒
2 莖	3 片	2 片	各 5 分			各 1 錢			各 2 錢	

●주치 및 효능

壯實人感冒暑風の 稍久에 身熱頭身痛不泄瀉 或 泄瀉嘔吐驚風の 等症

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2첩 連用

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

驚風症 加 黃連 7分, 天麻, 白殭蠶, 全蝎 各 5分

傷暑 經驗方1

龍 腦	胡 桃	青 礬 石	蘇 葉	甘 草	半 夏	蘿 菔 子	白 芥 子	遠 志	麥 門 冬	桔 梗	紫 苑	百 部 根	貝 母	麻 黃	瓜 蒌 仁	蘇 子	桑 白 皮	杏 仁	白 芩	五 味 子
各 1 兩		3 兩		各 2 斤																

●주치 및 효능

咳嗽, 祛痰, 神經痛, 喘息

●복용 용법·용량

上藥爲末作丸, 梧子大. 大人은 20~30정 복용, 小人은 10정 복용
(마두령을 2근씩 가미했으나 발암제로 사용금함). 기침 심할 때 더운물에 복용함.

●주의 사항

임신부는禁한다.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

白芷, 川芎, 升麻, 柴胡, 犀角, 黃柏, 黃芩을 症狀에 따라 氣管支나 肺炎時에 加한다.

加味四六湯

破故紙	瓜蒌仁	萊菔子	杏仁	麥門冬	五味子	貝母	桔梗	陳皮	半夏	白芍藥	土川芎	當歸	澤瀉	牡丹皮	牧白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃
各1錢									各1.3錢									2錢

●주치 및 효능

慢性 氣管支炎

●복용 용법·용량

1일 3첩씩 식후 2시간 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈, 담배

淸火補陰湯

甘草粉	天花粉	知母	黃柏	川芎	當歸	蒼朮	香附子	熟地黃	白芍藥	玄蔘
各1錢								2.5錢	4錢	

●주치 및 효능

虛火上升 咽痛生瘡 肺熱

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

6. 咳嗽 喘息

加味地黃湯

薑 三 棗 二	甘 草	款 冬 花	貝 母	桑 白 皮	蘇 子	桔 梗	澤 瀉	牧 丹 皮	五 味 子	杏 仁	白 朮	白 茯苓	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃	麥 門 冬	天 門 冬	沙 蔘
	蜜 灸	蜜 灸																蜜 灸
	各 1 錢								各 1.5 錢						各 2 錢			

● 주치 및 효능

咳嗽, 喘息(氣管支性)

● 복용 용법·용량

1일 3회 食間服.

※ 病의 輕重에 따라 治療日이 달라질 수 있음.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

● 활투

消化不良 加 陳皮, 貢砂仁, 山查 各 1錢.

泄瀉 去 熟地黃 加 元肉 2錢

氣虛 加 黃芪蜜灸 2錢

喘甚 加 紫何車 1~2錢

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

1985년도에 개원하여 지금까지 상기 처방으로 해수, 천식환자를 치료해 왔는데, 치료율은 거의 80% 이상이었음.

咳嗽 喘息 經驗方1

生 黃 甘 瓜 貝 枳 桔 白 陳 半
 薑 苓 草 萸 母 殼 梗 茯 皮 夏
 仁 苓

酒
 炒

3 3 5 各
 片 分 分 1
 錢

2
 錢

● 주치 및 효능

痰嗽, 痰盛

● 복용 용법·용량

1첩 1회, 1일 3회 식후 30분에 복용

2~3일 복용

● 주의 사항

氣虛가 심하면 안 좋은 듯함

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

해당 환자의 50~60명의 치료 경험 중, 60~70%의 1회율을 보이고 있음.

加味交加散

葱 生 桑 杏 甘 白 川 桔 枳 桂 麻 獨 芡 厚 陳 蒼
 白 薑 白 仁 草 茯 芎 梗 殼 枝 黃 活 實 朴 皮 朮
 皮 苓

5분 7분 各
 1
 錢

● 주치 및 효능

각종 증상의 感氣

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

각종 감기 증상에 무난히 사용, 치료효과 아주 뛰어나

- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
陰虛人이 아니면 70~80% 이상 호전됨.

麥蘇飲加減方

甘 萊 蘇 五 杏 麥 桑 白 葛 枳 桔 前 蘇
草 腹 子 味 仁 門 白 茯 根 殼 梗 胡 葉
子 子 冬 皮 苓
5 各
分 1
錢

- 주치 및 효능
感氣로 인한 기침, 氣管支炎 或 喘息
- 복용 용법·용량
2점으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
發熱時 加 地骨皮, 茯苓 各 1錢

加味藿正散

大 生 甘 桔 大 白 厚 陳 白 半 白 桂 柴 木 防 紫 藿
棗 薑 草 梗 腹 茯 朴 皮 朮 夏 芷 枝 胡 瓜 風 蘇 香
皮 苓
2 3 各
個 片 8
分
各
1
錢

- 주치 및 효능
外感 發熱 惡寒
- 복용 용법·용량
식사후 30분에 복용. 단 高熱時 3시간 혹 4시간 간격으로 복용지도
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
咽喉痛 加玄麥 1錢, 牛蒡子 1.5錢, 咳 加前胡 1錢, 麥門冬 1錢
消化障礙 加 蒼朮 1錢

少陰人 芎歸香蘇散合川芎桂枝湯

細 枳 當 甘 川 蘇 山 陳 香 蒼 白 桂
辛 殼 歸 草 芎 葉 查 皮 附 朮 芍 枝
子 藥

灸

2
分

7
分

各
1
錢

各
1.2
錢

各
2
錢

3
錢

●주치 및 효능

少陰人 感氣 發熱, 惡寒, 頭痛, 身痛, 咳嗽

●복용 용법·용량

1일 1회 식후 30분에 복용

●주의 사항

음식 꼭꼭 씹어서 少食하고 병과류 못 먹게 함

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

少陰人으로 확진된 다수 환자의 感氣, 비염, 축농증에 多用. 처방횟수는 100건 이상 치료율은 80% 정도

瓜貝散

杏 瓜 貝
仁 薤 母
仁

各
2.5
錢

3
錢

●주치 및 효능

急慢性 咳嗽而 痰多

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

소아 30kg미만은 성인 분량의 2/3, 20kg미만은 1/2

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

乾咳時 加 二門五味,

痰盛時 倍服用

久嗽時 加 百部根 2.5錢

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

10여년간 소아의 기침, 담성 가래에 사용하여 왔음

결핵성이나 폐렴이 아닌 경우 증상 완화에 뛰어남

加味雙敗湯

大	生	薄	甘	赤	枳	桔	獨	羌	前	柴	桂	黃	熟	川	當	白
棗	薑	荷	草	茯	殼	梗	活	活	胡	胡	枝	芪	地	芎	歸	芍
				苓									黃			藥
2	3	5	7	各												2
個	片	分	分	1												錢
				錢												

●주치 및 효능

流行性毒感, 慢性感氣

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

12세 이하는 1일 2회, 6세 이하는 半포씩 1일 2회

●주의 사항

가능한 한 肉食, 밀가루음식 피하고 야채 및 자연식 권유

●활투

發熱頭痛 加 葛根 2錢, 黃芩 1.5錢, 陳皮 1錢 木果 1錢

消化障礙 加 白朮, 山查 各 1.5錢, 陳皮, 木果 1錢

咳嗽 加 陳皮, 木果, 麥門冬, 五味子 各 1錢

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

약 5,600명 정도의 치료경험이 있으며, 약 80%에서 유효한 결과를 보임.

柴胡桂枝湯

甘 大 生 桂 白 人 黃 半 柴
草 棗 薑 枝 芍 蔘 苓 夏 胡
藥

5 各
分 1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

流行性 毒感

● 복용 용법·용량

1일 1첩만 해도 충분함.

● 주의 사항

· 식사금기 : 과일, 육식, 생선, 김, 미역, 다시마 등 일체의 해조류

● 참고

· 柴胡桂枝湯證 : 肢節煩痛 往來寒熱(기침, 인후통, 콧물, 재채기 등 입맛이 떨어지고 추우며 전신이 쭉시는데 살까지 아프다고 호소한다.) 만약에 이 증세에다가 기침할 때 가슴이나 배가 땡기고 걸리는 증세가 겹칠 때는 柴陷湯(柴胡桂枝湯 合 小陷胸湯)

加味清肺湯

薑 甘 乾 黃 陳 桔 天 麥 白 貝 白 紫 桑 五 杏 白 當 熟 枇
三 草 薑 柏 皮 梗 門 門 朮 母 茯 苑 白 味 仁 芍 歸 地 杷
棗 冬 冬 苓 苓 皮 子 藥 黃 葉
三

各
5
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

氣管支, 肺炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

● 활투

喘息 鼻炎 加 麻黃 1錢

補母止嗽湯

肉桂	甘草	半夏	人參	蘇子	紫菀	桔梗	麥門冬	白茯苓	白朮
5分	各1錢					2錢	各3錢		

- 주치 및 효능
咳嗽(기관지염)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味忍葛湯

生薑	枳殼	白豆蔻	砂仁	五味子	杏仁	龍眼肉	甘草	山查肉	黃芩	沙蔘	前胡	柴胡	陳皮	葛根	蒼朮	赤茯苓	桔梗	忍冬
各5分					8分	各1錢												各1.2錢

- 주치 및 효능
小兒感氣, 咳嗽
- 복용 용법·용량
1첩으로
1) 1~3세는 3일간 복용
2) 4~7세는 2일간 복용
3) 8~11세는 1일 4~5회 복용
4) 12~15세는 1일 2~3회 식후복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

咳嗽 喘息 經驗方2

甘 五 半 杏 貝 知 桑 金
草 味 夏 仁 母 母 白 銀
子 皮 花

各
2
錢

● 주치 및 효능

小兒咳嗽, 咽喉痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

3첩 ~ 5첩 사용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯

地 杏 麥 五 鹿 桑 澤 牧 山 山 熟
骨 仁 門 味 茸 白 瀉 丹 藥 茱 地
皮 冬 子 皮 皮 莢 黃

各
5
分

各
1
錢

2.5
錢

● 주치 및 효능

小兒百日咳

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

1일 1첩씩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

柴胡芍藥湯

甘 石 竹 枳 神 山 桂 黃 葛 白 柴
草 膏 茹 殼 麴 查 枝 芩 根 芍 胡

5
分

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

小兒感氣(流行性 感氣)

● 복용 용법·용량

1일 3회 微溫服 따뜻한 물을 넣 것.

● 주의 사항

매 복용 후 杏仁油 2g 목에 축일 정도. 필히 山柴胡를 사용.

加味柴平湯

厚 桂 甘 赤 陳 半 黃 石 知 蒼 柴
朴 枝 草 芍 皮 夏 芩 膏 母 朮 胡
藥

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

小兒感氣, 熱感氣

● 복용 용법·용량

2일 4첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

咳嗽 加 麥門冬, 桑白皮, 杏仁, 貝母,

食滯 加 山查, 神麴, 麥芽, 枳實, 砂仁

蘇子導痰降氣湯

甘草	桑白皮	枳實	黃芩	赤茯苓	厚朴	前胡	陳皮	酸棗仁	五味子	黃芪	南星	當歸	半夏	蘇子	熟地黃
								炒			炮			微炒研	
各7分							各1錢		各1.5錢			各3錢			5~7錢

● 주치 및 효능

痰喘上氣症(숨찬 병)

● 복용 용법·용량

1일 2첩(재탕)까지 3회 복용. 식후 1시간 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 蘿菔, 鷄, 猪, 酒, 麵

王氏解毒湯

甘草	牛蒡子	黃芩	陳皮	枳殼	連翹	黃連	白朮	防風	荊芥	麥門冬	桔梗	葛根	川芎	白芍藥	當歸
各1錢										各1.3錢					

● 주치 및 효능

紅疫 消斑後 痰咳喘

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

2-3첩에 효과 보임... 大人基準 1일 2첩이고 小兒는 適宜 減量

咳嗽 喘息 經驗方3

[illegible]

棗	薑	鹿茸	紫何車	車前子	枸杞子	覆盆子	菟絲子	五味子
40個	60片	各2兩						

- 처방의 출전
傳受方
- 주치 및 효능
咳嗽, 喘息
- 복용 용법·용량
分作20帖 水煎, 1일 3회 식사 후 30분에 복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
心臟性喘息 淫羊藿 蘇子 各 4兩

加味小青龍湯

紫菀
甘草
貝母
五味子
桂枝
乾薑
細辛
麥門冬
陳皮
沙蔘
鹿茸
桔梗
防風
桑白皮
杏仁
半夏
白芍藥

灸

各
1.5
錢

●주치 및 효능

小兒百日咳 氣管支炎 喘息

●복용 용법·용량

1일 1첩으로 2회 나누어 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

金水六君煎加味方

薑 麥 五 蘇 白 甘 陳 半 白 當 熟
門 味 子 芷 草 皮 夏 茯 歸 地
冬 子 苓 黃

製

5 各
片 1
錢

1.5 各
錢 2
錢

3.5
錢

●주치 및 효능

咳嗽, 喘息

●복용 용법·용량

2첩으로(제탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

透風鎮火清氣湯

竹 燈 防 柴 半 南 紫 甘 杏 麻 青 陳 桑 赤 百 山 山
葉 心 風 胡 夏 星 苑 草 仁 黃 皮 皮 白 茯 部 梔 藥
皮 苓 根 子

3 3 3 各
條 條 分 6
分

1 各
錢 1.5
錢

2 各
錢 3
錢

●주치 및 효능

咳嗽 喘息 哮喘 煩鬱

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 치료경험

위의 처방으로 20여년간 상기환자에게 사용하고 양호한 경과를 보이고 있음.

咳喘神奇湯

大 生 甘 白 陳 熟 貝 五 半 防 蒼 麥 當 黃 桑 杏 蘇 麻
 棗 薑 草 茯 皮 地 母 味 夏 風 朮 門 歸 芪 白 仁 子 黃
 苓 黃 冬 皮

炒 湯
 研 泡

2 3 各
 個 片 1
 錢

各
 1.5
 錢

2 3
 錢 錢

● 주치 및 효능

冬月 咳嗽痰喘, 感氣後遺症, 기침에도 좋음

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

불면증 있는 者, 多汗者는 주의

加味金水六君煎

生 破 蘇 半 貝 枳 桔 五 杏 甘 桑 貢 白 麥 白 黃 當 陳 山 山 熟
 薑 故 子 夏 母 殼 梗 味 仁 草 白 砂 茯 門 朮 芪 歸 皮 茱 藥 地
 紙 子 皮 苓 黃

1 各
 錢 5
 分

各
 7
 分

各
 1
 錢

各
 2
 錢

3
 錢

● 주치 및 효능

肺腎虛寒 痰盛 咳嗽 喘息

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

만성 해수천식에 효과가 있고, 감기 후에 기침이 잘 낫지 않을 때 사용하면 효과가 좋다.

加味蔘蘇飲

黃 芩	貝 母	桑 白 皮	生 乾 地 黃	白 芍 藥	當 歸	甘 草	赤 茯 苓	枳 殼	桔 梗	陳 皮	乾 葛	半 夏	杏 仁	麥 門 冬	五 味 子	前 胡	蘇 葉	人 蔘
各 5 分			各 0.7 ~ 1 錢			各 8 分					各 1 錢							

● 주치 및 효능

氣管支炎, 氣管支喘息(당뇨병환자의 기관지천식)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 환부

糖尿 加 山藥, 山茱萸 各 7分, 牡丹皮 5分, 知母, 黃柏 3分, 熟地黃 2~4錢

胃虛 加 山查肉 1錢, 厚朴, 白朮, 砂仁 各 5分

加味定喘化痰湯

大 棗	生 薑	甘 草	陳 皮	白 朮	牛 蒡 子	玄 蔘	杏 仁	五 味 子	天 門 冬	半 夏	桑 白 皮	連 翹	金 銀 花	枇 杷 葉	榆 根 白 皮	蒼 耳 子	南 星	貝 母	白 芩
各 7 分		各 1.2 錢				各 2 錢									各 3 錢			各 3.7 錢	

● 주치 및 효능

咳嗽 痰喘 급만성 기관지 천식 비후염

● 복용 용법·용량

1일 2-3회 食間 또는 空心服

● 주의 사항

상기 탕약 복용중 아래 처방을 爲粉又丸하여 병용하면 有效方

白芨 知母 榆根 白皮 薏苡仁 各 3錢 白朮 麥芽 甘草 各 1錢

(가루약- 1회 약1錢 식간 복용. 환약- 1일 2~3회, 1회 30~40개 식후 즉시 복용)

加味瀉白散

甘 草	蘇 子	山 梔 子	薄 荷	麥 門 冬	黃 芩	桑 白 皮	地 骨 皮
		微 炒 研				蜜 炙	
各 1 錢						各 2 錢	

● 주치 및 효능

小兒 喘息

● 복용 용법·용량

右作 1첩 水煎 量兒食後 20分 1日2服

● 활투

風寒者 加 麻黃, 蘇葉,

虛久者 腎氣湯 補肺湯,

有痰 合 二陳湯 或 加 導痰湯

加味清肺湯

甘 草	青 皮	半 夏	當 歸	蘿 菈 子	麥 門 冬	枳 殼	桔 梗	香 附 子	杏 仁	桑 白 皮	五 味 子	山 查	神 麴	陳 皮	熟 地 黃	白 茯 苓
5 分	各 1 錢													各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

慢性氣管支炎

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

麥蘇飲加味方

甘 草	枳 殼	桔 梗	陳 皮	赤 茯 苓	麻 黃	杏 仁	麥 門 冬	桑 白 皮	貝 母	白 芥 子	蘇 子	蘿 蔔 子	乾 葛	半 夏	前 胡	蘇 葉	沙 蔞
各 5 分				各 1 錢													

●주치 및 효능

氣管支喘息

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

定喘湯

白 果	甘 草	款 冬 花	蘇 子	桑 白 皮	半 夏	黃 芩	杏 仁	麻 黃
21 個	各 1 錢						1.5 錢	3 錢

●주치 및 효능

喘息

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

升陷湯

桔 柴 生
梗 胡 黃
 胡 芪

各 1.5 錢	1.5 兩
---------------	----------

● 주치 및 효능

呼吸短氣症-胸中大氣陷 短氣不足以息 或勞力呼吸 有似乎喘 或作寒熱往來者 皆亦效

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2첩 全愈

● 주의 사항

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활동

氣虛 加 人蔘 數錢，山茱萸 各1錢

小腹下墜 加 升麻 2錢

熱加知母數錢，草龍膽各2錢

加味正氣湯

枳 桔 葛 麻 獨 羌 白 川 黃 柴 藿 土 陳 厚 香 蒼
殼 梗 根 黃 活 活 芷 芎 芩 胡 香 半 皮 朴 附 朮
夏 子

各1錢

1.5
錢

棗 葱 薑 甘
草

3 3 3 5
個 本 片 分

● 주치 및 효능

流行性 毒感-頭身痛,發熱

● 복용 용법·용량

清水煎 3大碗 煎至 半大碗 不拘時服 取汗 6晝 完快

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

兼咳嗽 加 桑白皮, 杏仁, 麥門冬, 五味子, 貝母 各 1錢

7. 癰癤(淋巴腺炎) 耳下腺炎

蜈香丸

銀 蜈
杏 蚣

去 大
殼 火
皮 乾
粉
末

100 100
個 尾

● 주치 및 효능

結核性 淋巴腺炎(連珠瘡) 및 結核性 敗血症, 老人性 循環障礙

● 복용 용법·용량

上二個品藥 搗餅作丸 小黑豆大粒 以作 一劑分

大人 1일 5회 복용 1회 拾粒 清水下 服用

2~3劑 完治

加味大補湯

大	生	遠	肉	熟	白	川	貝	當	甘	白	白	白	蒲	香	黃	夏
棗	薑	志	桂	地	芍	芎	母	歸	草	茯	朮	蔘	公	附	芪	枯
				黃	藥					苓			英	子		草
2	3	各		各								各			各	
枚	片	5		1								1.5			2	
		分		錢								錢			錢	

● 주치 및 효능

淋巴腺腫炎(結核)=頸部淋巴腺結核(陰性)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

60~100첩 복용

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

발열두통 호소할 경우에는 肉桂를 감함.

散腫潰堅湯

升 柴 蓬 三 黃 甘 葛 連 昆 天 黃 知 桔 草 當 白 黃
 麻 胡 朮 稜 連 草 根 翹 布 花 柏 母 梗 龍 歸 芍 芩
 粉
 炙

3 各
 分 5
 分

各
 1
 錢

1.5
 錢

● 주치 및 효능

瘰癧

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

立志散

川 生 白 斑 黃 甘 滑 當 川 赤 連
 烏 土 丑 猫 芩 草 石 歸 芎 芍 翹
 尖 蜂 頭
 房 末
 7 2.5 各 各
 個 錢 3 5
 錢 錢

● 주치 및 효능

瘰癧 頸部淋巴腺結核

● 복용 용법·용량

斑猫-糯米粉炒去頭翅足, 生土蜂-房 蜜水洗飯上蒸晒乾
爲末 每一錢씩 木通湯濃煎水 調下

● 주의 사항

斑猫의 유독으로 인해 부작용이 생기면(尿澁 또는 血尿), 益元散 或 五苓散 燈心湯 調下

8. 협통 늑막염

脇痛 肋膜炎 經驗方1

敗 醬	穿 山 甲	皂 角 子	陳 皮	枳 殼	香 附 子	薄 荷	柴 胡	甘 草	天 花 粉	蒲 公 英	當 歸 尾	白 芍 藥	金 銀 花
3 分	各 5 分				各 1 錢			各 1.2 錢		3 錢	各 5 錢		

● 주치 및 효능

肋膜炎 左(슴성)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

脇痛 肋膜炎 經驗方2

覆 盆 子	蘿 蔔 子	防 風	荊 芥	車 前 子	枸 杞 子	地 骨 皮	玄 麥
各 1 錢						1.5 錢	

● 주치 및 효능

肋膜炎 左右乾性

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

治肋湯

[illegible]

● 주치 및 효능

乾性肋膜炎，肋間神經痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

안정을 요하며 과격한 운동도 삼갈 것

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

柴和飲

柴胡	桑白皮	地骨皮	人蔘	半夏	黃芩	桔梗	枳殼	前胡	知母	甘草	薑	棗
									酒炒			

2 個	3 片	各 5 分	各 7 分	各 1 錢	各 1.5 錢	2 錢
--------	--------	-------------	-------------	-------------	---------------	--------

● 주치 및 효능

寒熱往來 胸痛 咳嗽(濕性肋膜炎)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清和湯

棗 薑 甘 前 知 桔 白 人 黃 半 地 桑 天 玄 柴
 草 胡 母 梗 茯 蔘 苓 夏 骨 白 門 蔘 胡
 苓

酒
炒

2 3 各 各 各 各
 枚 片 5 7 1 2
 分 錢

● 주치 및 효능

乾性肋膜炎. 咳嗽가 甚하고 寒熱往來胸痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

黃芪湯

棗 薑 甘 知 白 半 桔 黃 人 地 桑 赤 玄 天 柴 穿 金
 草 母 茯 夏 梗 芪 蔘 骨 白 芍 蔘 門 胡 山 銀
 苓 苓 花

酒
炒

2 3 各 各 各 各 各 各
 枚 片 5 7 1 1.5 2
 分 錢

● 주치 및 효능

咳嗽胸痛이 甚하고 寒熱往來(化膿性肋膜炎)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

十全大補湯加味

玄 天 浦 金 黃 肉 甘 人 白 白 熟 白 川 當
 蔘 花 公 銀 芪 桂 草 蔘 茯 朮 地 芍 芎 歸
 粉 英 花 黃 藥

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

乾性肋膜炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

症狀따라 2제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味補益湯

升 柴 甘 連 蘇 人 五 麥 青 當 砂 白 山 黃 金
 麻 胡 草 翹 子 蔘 味 門 皮 歸 仁 朮 藥 芪 銀
 子 冬 花

各
5
分

各
1
錢

2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

肋膜炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

有熱者 人蔘 대신 沙蔘사용

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味金仙飲

桃 仁	枳 實	香 附 子	前 胡	穿 山 甲	桔 梗	皂 角 刺	天 花 粉	梔 子	柴 胡	當 歸	黃 芪	玄 蔘	蒲 公 英	金 銀 花
各 1 錢							各 1.5 錢			各 2 錢			各 5 錢	

● 주치 및 효능

肋膜炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大銀花煎

甘 草	蘇 葉	砂 仁	陳 皮	白 芍 藥	乾 地 黃	川 烏	桔 梗	黃 芩	白 朮	天 花 粉	當 歸	蒲 公 英	金 銀 花
4 分	8 分	各 1 錢							2 錢	3 錢	5 錢	1 兩	2 兩

● 주치 및 효능

肋膜炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

收汗煎

大 棗	烏 梅	黃 連	五 味 子	香 附 子	白 茯 苓	生 地 黃	甘 草	牡 蠣 粉	黃 芩	柴 胡	土 防 風	桂 枝	白 芍 藥	當 歸	白 朮	黃 芪
2 個	1 個	5 分				各 1 錢										2 錢

● 주치 및 효능

自汗症, 手足掌汗症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味雙和湯

棗	薑	甘 草	桂 皮	川 芎	熟 地 黃	當 歸	黃 芪	牡 蠣 粉	龍 骨	白 芍 藥
2 枚	3 片	各 1.5 錢			各 2 錢			各 3 錢		3 錢

● 주치 및 효능

盜汗

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

八珍湯加味方

甘 草	白 芍 藥	白 朮	人 蔘	熟 地 黃	川 芎	當 歸	川 烏	白 附 子	白 茯 苓	半 夏
各 1.5 錢							各 1.7 錢		各 2 錢	

● 주치 및 효능

手足多汗

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

赤茯苓湯

薑 白 川 人 橘 赤 半
朮 朮 蓼 皮 茯苓
苓

5
片

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

頭汗

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

제8장 소화기계 질환

1. 치주질환

回春凉膈散合升麻葛根湯

生 薑	甘 草	芍 藥	枳 殼	生 地	當 歸	薄 荷	黃 連	桔 梗	梔 子	黃 芩	升 麻	連 翹	葛 根
3 片	各 8 分									各 1 錢			2 錢

- 주치 및 효능
口舌生瘡(혀, 입술염증)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
2~3제
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
50명 정도의 치료경험이 있으며, 90%에서 좋은 경과를 보임.

口齒 經驗方1

甘 草	黃 芪	桂 皮	白 芍	川 芎	當 歸	熟 地	玄 蔘
			藥			黃	
各 1 錢			各 2 錢			5 錢	

- 주치 및 효능
風齒(모든 齒痛)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

20명정도 경험이 있으며, 3~5일 내로 90%정도는 진통이 됨.

加味地黃湯

附 肉 巴 肉 杜 白 澤 牧 山 山 白 熟
子 桂 戟 從 冲 茯 瀉 丹 茱 藥 蜜 地
容 苓 皮 萸 黃
九 蒸

各
5
分

各
1.5
錢

各
2
錢

4
錢

●주치 및 효능

齒痛(齒搖惡冷痛)

중년이후 腎虛及 房事過多로 오는 齒痛. 壯年齒痛에는 不問 投藥해도 效果 有. 中年이 후에 이가 시리고 흔들릴 때 常用하면 貴重한 이빨이 보존되며 확실한 효과

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

石膏湯

川 檳 薄 芒 細 升 白 防 荊 石
椒 榔 荷 硝 辛 麻 芷 風 芥 膏

各
1
錢

2
錢

●주치 및 효능

齒痛

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

食後 溫服하되 입 안에서 한참씩 물고 있다가 서서히 복용할 것.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

口齒 經驗方2

細 日 白
辛 防 礬
風

各 2
1 錢 錢

● 주치 및 효능

風齒 蟲齒

● 복용 용법·용량

위 처방을 水煎去 渣 其液含漱, 약 10분간 수회반복

口齒 經驗方3

蒼	石	朱	黃	麝	蟾	血	枯	胡	輕
耳	雄	砂	丹	香	蜆	竭	白	桐	粉
子	黃						礬	淚	
	各			少	各		各		5
	3			許	2		1		分
	分				分		錢		

● 주치 및 효능

蟲齒痛

● 복용 용법·용량

蒼耳子 燒存性粉末爲衣, 蟾蜍는 酒拌濃磨後入藥末. 上藥爲粉末飯丸米粒大. 蟲齒小 此丸藥一個를 插入하고 十分間 上下齒를 合堅則 完全止痛

● 주의 사항

皮膚搔痒症에 燒酒少許에 此丸藥을 三四個 넣고 完全濃磨後에 서서히 此濃液을 擦之則 痒症이 止함

2. 위장질환

加味補益湯

柴 升 甘 枳 當 橘 白 人 黃
胡 麻 草 實 歸 皮 朮 蔘 芪

3 5 各 1.5 各 3
分 分 1 錢 2 錢 錢

●주치 및 효능

胃氣下陷

疲倦, 無力感, 排便異常(便秘 或 泄瀉를 不問하고), 消化不良 등의 虛한 患者에게 적용.
양방적으로는 胃下垂 환자에 아주 좋음

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

惡心 加 茯苓, 半夏 1錢, 眩暈 加 川芎 8分

消化不良 加 砂仁 8分 草果, 山查 1錢, 食慾不振 加 黃柏 3分

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

주부들의 보약으로도 많이 씀. 대략 1년 에 100건 이상. 최소 5년간 써 왔음

補中益氣湯加味方

柴 升 陳 當 人 木 厚 砂 神 山 五 麥 甘 白 黃
胡 麻 皮 歸 蔘 香 朴 仁 麵 查 味 門 草 朮 芪
子 冬

3 5 各 2
分 分 1 錢 錢

●주치 및 효능

食慾不振

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

1제면 대략 食慾旺盛해짐.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

香砂六君子湯加味方

大	生	甘	蓮	益	藿	木	砂	草	人	當	白	厚	陳	半	白	香	白	黃
棗	薑	草	子	智	香	香	仁	豆	蔘	歸	豆	朴	皮	夏	茯	附	朮	芪
			肉	仁				蔻			蔻				苓	子		
																		蜜炙

2 3 各
個 片 1
錢

各
1.5
錢

●주치 및 효능

不思飲食(補胃)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

五苓散加味方

丁	肉	白	豬	赤	白	澤
香	桂	豆	苓	茯苓	朮	瀉
		蔻		苓		
10	5	0.5	各			2.5
粒	分	錢	1			錢
20			錢			

●주치 및 효능

大人, 小兒 水穀不入

●복용 용법·용량

水煎 약물을 입에 꼭 물고 2~3분 있다가 조금씩 삼킨다.

●주의 사항

서서히 복용한다.

香八湯

大棗	生薑	甘草	酸棗仁	陳皮	川芎	白何首烏	白朮	桂枝	人蔘	白芍藥	當歸	香附子
		炙	炒							炒		

各2錢

- **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

補中益氣湯

紅花	黃柏	柴胡	升麻	甘草	當歸	白芍	川芎	陳皮	白朮	人蔘	黃芪
各3分		各5分		各1錢		藥					2錢

- 慢性感氣 加 麥門冬 2錢, 五味子 8分

加味平胃散

甘 白 人 乾 蒼 陳 厚
草 豆 蔘 薑 朮 皮 朴
久

灸 炮 薑
製

各 各 1.4 2
6 1 錢 錢
分 錢

- 주치 및 효능
婦女嘔氣
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

小半夏湯

生 半
薑 夏

留 湯
皮 洗

各
3
錢

- 주치 및 효능
小兒 嘔吐症, 開胃消食
- 복용 용법·용량
소아 1세 이하 茶匙로 조금씩 먹임. 2세 이상은 증량하여 복용
- 주의 사항
半夏는 必히 湯洗하여야 하며 辛毒하므로 약 5分 정도 끓여서 毒性을 除去하고 再煎하여 使用함

人參養榮湯

遠志	防風	五味子	熟地黃	甘草	陳皮	肉桂	黃芪	白朮	人蔘	當歸	白芍藥
				炙			蜜炒				酒炒

5分	各7.5分			各1錢							2錢
----	-------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	----

- 주치 및 효능
위장병, 자궁내막염
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
便秘 加 柳白皮 2錢

陶氏平胃散

生薑	甘草	青木香	乾薑	山查肉	神麴	草果	枳殼	黃連	白朮	陳皮	厚朴	蒼朮
				炮	炒研	炒研	麩炒					薑汁炒

3片	各5分								各1錢			1.5錢
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	------

- 주치 및 효능
類傷寒治法-凡傷寒食成積에 亦能發熱 或惡寒頭痛하여 嘔吐 傷寒初症
이로되, 단 心腹이 飽悶하며 噯噯嘔逆이다름이 있으니 상세히 問症하여 食傷症이 確적
한 兪후에 上記 처방 사용
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
2첩外에 勿用

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

保胃湯

甘 草	乾 薑	白 豆 蔻	草 豆 蔻	貢 砂 仁	山 查 肉	枳 實	藿 香	木 香	厚 朴	陳 皮	香 附 子	元 肉	白 茯苓	白 朮	黃 芪
											各 2 錢				
各 1 錢															

● 주치 및 효능

一般 胃腸病(특히 少陰人)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 冷食

● 활투

人蔘 加味하면 효과 더 있음

泄瀉 去 枳實, 加 肉荳蔻

呃逆 胃腸疾患 經驗方1

麥 芽	神 曲	鷄 內 金	蓬 朮	三 稜	甘 草	木 香	砂 仁	厚 朴	藿 香	枳 實	香 附 子	陳 皮	蒼 朮	山 查
								各 1 錢				2 錢	5 錢	
各 7 分														

● 주치 및 효능

肉滯

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 사이에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

正氣丹

胡 乾 良 桂 檳 使 苦 山 麥 神 白 白 人 甘 藿 半 陳 厚 蒼
 椒 薑 薑 皮 榔 君 練 查 芽 曲 茯 朮 蔘 草 香 夏 皮 朴 朮
 子 根 肉 炒 炒
 薑 製

3 各 各
 錢 5 1
 錢 錢 兩
 朱 龍 丁 革 唐 砂
 砂 腦 香 撥 木 仁
 爲
 衣

2 各
 錢 3
 錢

● 주치 및 효능

四時 消化不良, 夏秋 吐瀉癰亂, 腹痛諸症

● 복용 용법·용량

藥 蜜丸 彈子大 干湯 或 溫水 磨服 或 蜜丸 梧子大. 成人 每服 40~50丸 溫服. 小兒 減量 1日 2~3回

● 주의 사항

장기복용은 불가

黃芪健中湯加味方

甘 麥 神 當 桂 黃 白
 草 芽 曲 歸 枝 芪 芍
 藥
 各 各 5
 2 3 錢
 錢 錢

● 주치 및 효능

● 주치 및 효능

神經性 消化不良

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

20 ~ 40첩

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

속쓰림 加 烏貝散.

浮腫 加 豬苓, 澤瀉.

便秘 加 大黃

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

다수의 경험이 있으며, 해당 증상에 대해 높은 치료율을 보이고 있음.

十全大補湯加味方

生 肉 黃 甘 茯 白 川 白 當 熟 紅
 薑 桂 芪 草 苓 朮 芎 芍 歸 地 麥
 藥 黃

各
1.2
錢

2.5
錢

● 주치 및 효능

神經過勞, 過勞, 胃無力으로 因한 慢性消化不良 자주 트림, 위장불량으로 부을 때,胃痛, 차가운 음식 먹고 위장 좋지 않을 때

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3제 정도 복용시킴

● 주의 사항

· 藥服用時 과일, 과일주스, 회 같은 날음식, 카페인이 들어간 음료, 차, 돼지고기 삼감.

· 홍삼은 한국산, 북한산, 중국산 모두 가능.

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

근본을 치료하는 처방으로 거의 모두 치료됨

呃逆 胃腸疾患 經驗方3

甘 草	白 豆	檳 榔	木 香	麥 芽	神 麴	山 查	黑 丑
	蔻					肉	
5 分	各 1 錢		各 1.5 錢			3 錢	5 錢

● 주치 및 효능

諸滯症(五滯) 氣血食痰熱

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

위 처방에 五積散을 加味하여 服用하면 더 효과적임. 또는 藿香正氣散을 加味하여 服用하여도 가함.

健脾丸

紫 檀 香	唐 木 香	山 查 肉	射 干	貢 砂 仁	枳 實	白 茯 苓	陳 皮	薄 荷	白 芍 藥	丁 香	藳 撥	胡 椒	桂 皮	藿 香	香 附 子	甘 草	良 薑	白 朮
各 2 兩																3.7 兩	各 7.5 兩	

薄 荷	龍 腦	麥 芽	神 麴
腦			
各 0.5 兩		各 2 兩	

● 주치 및 효능

胸腹痛 食滯 消化不良 飲酒後遺症

● 복용 용법·용량

(蜜丸梧子大) 20 ~ 30丸씩, 물 혹은 생강차로 복용, 노약자나 어린이는 감량함

● 주의 사항

규칙적인 식사. 자극성 음식물 절제. 과식주의. 위염, 궤양 환자는 복용 불가

加味養胃湯

大生烏甘草白人香葛豬車白麥神山厚白陳半蘿澤蒼
棗薑梅草果豆蔘附根苓前朮芽麵查朴茯皮夏香瀉朮

炙

2 1 1 各 8 各
枚 錢 枚 5 分 1
錢

● 주치 및 효능

腹痛, 泄瀉

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 환투

氣實時 減 人蔘 5分

虛寒 甚 加 乾薑炮, 肉桂 各 1錢

雙和湯 合 對金飲子 合 消滯丸方

薑五香黑蒼厚甘桂川當神砂赤黃熟乾白陳
三靈附丑朮朴草皮芎歸麵仁茯芪地葛芍皮
棗脂子
二

5 各 7.5 各 2 2.5 3
分 7 分 1 錢 錢 錢
錢

● 주치 및 효능

酒食傷, 胃腸病

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味平胃内消散

蓬 朮	乾 薑	三 稜	甘 草	藿 香	木 香	神 麴	枳 實	烏 藥	麥 芽	砂 仁	陳 皮	厚 朴	白 茯苓	人 蔘	山 查 肉	香 附 子	蒼 朮
各 5 分			各 1 錢												各 2 錢		

- 주치 및 효능
胃弱 消化不良 滯症 胃痛 痞滿 胃痙攣 胃癌 抑制
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
분말해서 장시간 복용하면 더욱 효과 있음.
임신부 사용금함.
- 활투
或 加 半夏炒 1錢, 鷄內金 1錢 尤效, 薑三片(半夏는 法製)
泄 加 車前子, 澤瀉, 肉豆蔻 各 1錢

加味香砂六君煎

大 棗	生 薑	益 智 仁	木 香	製 半 夏	甘 草	神 曲	麥 芽	白 豆 蔻	砂 仁	厚 朴	陳 皮	香 附 子	蓮 子 肉	山 藥	黃 精	白 茯苓	白 朮	黃 芪	白 蔘
								炒 研	炒 研				炒						
2 枚	3 片	各 5 分		各 7 分				各 1錢								各 1.5 錢			2 錢

- 주치 및 효능
胃十二指腸潰瘍症
- 복용 용법·용량
1일 2회 식사 전 빈속에 따뜻하게 복용. 3-4제 服可
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
심신을 평안히 가지고, 음식을 거칠게 먹지 않고 소화가 잘 되도록 부드럽게 식사할 것.
스트레스 해소활동과 걷기운동(식후 30분후에 경하게 산책운동) 권함.

加味六君子湯

甘 大 生 陳 砂 加 半 茯 白 人
草 棗 薑 皮 仁 防 夏 苓 朮 蔘
風

1 各 各 各
錢 1.5 2 2.5
錢 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

慢性胃腸炎, 食慾不振, 嘔吐, 神經衰弱

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味健胃湯

枯 乳 沒 赤 小 白 甘 人 鷄 枳 神 山 木 厚 蒼 玄 陳 貢 藿 牡
白 香 藥 茯 茴 豆 草 蔘 內 實 麴 查 香 朴 朮 草 皮 砂 香 蠣
礬 薤 茶 香 蔻 金
各 5 8 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各
2 分 分 1 1.2 1.5 2
錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

胃十二指腸潰瘍

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

2~3제, 久則 5~6제 必效

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

十二味寬中湯

大棗	大腹皮	木香	枳實	厚朴	益智仁	香附子	青皮	陳皮	乾薑	良薑	赤何首烏	白何首烏
2枚	各5分				各1錢							

●주치 및 효능

胃腸病(胃炎症)- 少陰人體質로 心下痞滿, 吞酸, 噯氣症

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 따뜻하게 복용.

●주의 사항

裏熱이 없는 분으로 虛弱體의 오래된 胃病에 쓰거나 陽症病에는 쓰지 않는다.
少陰體의 胃腸病이 諸藥이 不效하였으나 本方으로 治함

呃逆 胃腸疾患 經驗方4

瓜蒌仁	土香附子	陳皮	乾生薑	蘿菔子	青皮	黃芩	草豆蔻	砂仁	川芎	赤茯苓	澤瀉	半夏	麥芽	神曲	豬苓	蒼朮	枳實	白朮	甘草
							炒					薑製	炒	炒			炒		
各3分			各5分					各7分				各1錢						各2錢	
黃連	木香	檳榔	土厚朴																
各2分		各3分																	

● 주치 및 효능

滯症. 胃炎(脹滿, 胃腸痛, 食積, 食滯, 痰滯, 茶滯, 肉滯 等)

● 복용 용법·용량

1일 2회. 조식 후 1시간 溫服, 중식 후 1시간 溫服.

總使用量 3제

● 주의사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄肉, 豬肉, 酒, 餅, 粉食 等

枯礬丸加味方

甘 檳 木 海 鷄 陳 白 貢 山 枯
草 榔 香 螵 內 皮 豆 砂 查 白
蛸 金 蔻 仁 肉 礬

2.5 各
錢 5
錢

各
1
兩

● 주치 및 효능

胃潰瘍

● 복용 용법·용량

梧子大로 製丸하여 食後(空服) 每10丸

● 주의 사항

適宜加減 服用함

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

人蔘養胃湯

甘 草 藿 厚 赤 半 陳 蒼 香 檳 木 貢 山 人
草 果 香 朴 茯 夏 皮 朮 附 榔 香 砂 查 蔘
苓 茶 子 仁 肉

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

胃炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 자극성 음식

加味歸脾湯

薑 甘 木 白 白 鹿 白 艾 升 阿 地 陳 山 砂 香 黃 人 遠 酸 龍 當
 三 草 香 茯 朮 茸 芩 葉 麻 膠 榆 皮 查 仁 附 芪 蔘 志 棗 眼 歸
 棗 神 根 子 仁 肉
 二

炒
黑

炒
黑

炒

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

胃潰瘍 胃出血 及 子宮下血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

急性 5첩 ~ 10첩 慢性 20첩 以上

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

補胃散

沒 草 陳 玄 藿 麥 神 牡 小 白 厚 白 白 白 枳 山 葛 桂 寶
 藥 果 皮 胡 香 芽 曲 蠣 苳 扁 朴 朮 茯 芍 實 查 根 枝 豆
 索 粉 香 豆 苓 藥 肉 粉

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

夏 節 香 薷	丁 香	白 荳 蔻	甘 草	貢 砂 仁	五 靈 脂
2 錢	5 分	7 分		各 1 錢	

● 주치 및 효능

心胸痛, 心脾痛, 胃潰瘍, 胃痙攣

● 복용 용법·용량

粉末을 1일 2-3회 食後 30分服用. 성인 기준 용량 5푼(2g) 사용

● 주의 사항

肉, 가루음식, 맵고 짠 음식, 술, 녹두 등 위에 부담을 줄 수 있는 음식. 임신부

※ 寶豆는 반드시 법제를 하여야 하는데 식용유를 그릇에 넣어서 열을 가하여 끓거든 寶豆를 넣어 위로 떠오를 때를 기다려 떠오르면 젓가락으로 건져서 말려서 사용한 다.(寶豆 기름은 화상치료에 사용하면 좋은 효과를 볼 수 있습니다.)

桂薑養胃湯

甘 草	赤 茯 苓	半 夏 菴	草 豆 蔻	肉 桂	薑 香 朴	厚 朴	陳 皮	乾 薑	麥 芽	神 麴	砂 仁	人 蔘	蒼 朮	香 附 子	山 查 肉	山 藥	龍 眼 肉	白 芍 藥	白 朮
								炒										炒	

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

各
3
錢

各
4
錢

烏
梅

草
果

檳
榔

木
香

各
5
分

●주치 및 효능

胃腸病(胃無力, 胃炎, 胃潰瘍, 과민성대장, 食慾不振, 酒滯, 특히 소아등의 食慾不振, 편식, 소식, 食滯, 腹痛, 泄瀉)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

- 1) 성장기 소아들의 잦은 복통, 소화장애, 설사, 식욕부진 등 加 遠志, 五味子, 防風 4g, 黃連, 白豆蔻 2g, 속이 미식거리거나 차멀미 등 加 川椒 3g, 빈번한 설사시 加 蓮子肉, 桔梗, 白扁豆, 薏苡仁 6g
- 2) 胃炎 加 梔子炒, 牡蠣粉, 黃連 3g, 潰瘍時 : 金銀花 8g, 薏苡仁 12g
- 3) 酒滯 加 葛根 16g, 乾薑 대신 良薑 8g, 蓮子肉, 桔梗, 白扁豆 6g
조기구토시 加 黃連, 瓜蒌仁 4g
- 4) 심한 설사 合 四苓散.

消化丸

枳 實	白 芥 子	良 薑	靈 砂	白 扁 豆	乾 薑	赤 茯 苓	白 豆 蔻	貢 砂	麥 芽	神 曲	藿 香	蘿 蔔 子	山 查	香 附 子	陳 皮	厚 朴	白 朮	夏 節 香 薷	葛 根
--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	--------	--------	------------------	--------

各
1
兩

各
1.5
兩

各
2
兩

薄 荷 腦	草 烏	甘 草 炙	元 木 香	丁 香	蓬 朮	三 稜	薤 白	胡 椒	紫 檀 香	白 檀 香
-------------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	-------------

各
3
錢

各
7
錢

各
1
兩

●주치 및 효능

急滯, 胃炎, 消化不良, 泄瀉

●복용 용법·용량

蜜丸 彈子大로 하여 성인 1회 2丸 복용.

10세 이하 1丸, 5세 이하 1/2丸.

● 주의 사항

草烏는 가급적 甘豆湯에 법제하여 사용하거나 빼고 써도 무방함. 전에는 靈砂를 넣었으나 水銀 중독 우려로 빼고서 사용하는데 효과는 같음. 妊娠婦 禁

建理湯加味方

甘 草 仁	貢 砂	陳 皮	麥 芽	神 麴	黃 芪	白 茯 苓	人 參	榆 根 白 皮	白 朮	桂 枝	白 芍 藥
各 5 分		各 1 錢						各 2 錢			

● 주치 및 효능

胃潰瘍, 위수술 후

● 복용 용법·용량

2첩으로(제탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

20첩 이상

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

戊己丸

陳 皮	枳 實	厚 朴	蒼 朮	硫 黃	白 礬	綠 礬
				火 煨	火 煨	
各 4 兩				各 16 兩		

● 주치 및 효능

胃潰瘍, 慢性 胃炎, 十二指腸痛

● 복용 용법·용량

飯丸 梧子大 成人 1日 3回, 20-30丸 水下

● 주의 사항

綠礬, 白礬은 火煨前 重量임

香砂平胃散加味方

甘 草	木 香	人 參	半 夏	神 麴	山 查 肉	砂 仁	厚 朴	藿 香	枳 實	香 附 子	陳 皮	蒼 朮
各 5 分		各 1 錢										2 錢

● 주치 및 효능

神經性 胃腸藥

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味香砂平胃散

生 薑	唐 木 香	甘 草	枳 實	玄 胡 索	藿 香	白 茯 苓	蘿 蔔 子	麥 芽	神 麴	檳 榔	貢 砂 仁	半 夏	厚 朴	白 朮	蒼 朮	陳 皮	山 查	香 附 子
							炒 研	炒	炒			製						

1.2 錢	5 分	各 8 分		各 1 錢														各 2 錢
----------	--------	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

● 주치 및 효능

胃炎, 胃潰瘍(胃痛, 消化不良, 痞滿, 吞酸, 惡心, 嘈雜, 腹冷)

● 복용 용법·용량

水煎 1일 3회 식후 1-2시간에 따뜻하게 복용

1回 服用量 100ml-120ml

※ 抽出機로 煎時 無壓으로 2時間 40分-3時間 煎水 11000-11500ml 入 湯藥液 4000ml

內外로 約 12-13日分 適當

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

手足腹冷者 加 人蔘, 白芍藥炒, 小茴香, 乾薑炮, 草豆蔻 各1錢, 棗 2個, 甘草代 炙甘草

加味安中散(湯)

大	生	貢	陳	良	黃	枳	牡	甘	桂	乾	玄	小	人	山	白	白	半
棗	薑	砂	皮	薑	芩	實	蠣	草	枝	薑	胡	茴	蔘	查	朮	茯苓	夏
		仁					粉				索	香					
								炙		炒							

2 3 各
個 片 5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

慢性胃炎, 胃潰瘍

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味香砂平胃散

陳	人	麥	甘	藿	半	蘿	白	乾	白	枳	山	厚	神	砂	檳	香	蒼
皮	蔘	芽	草	香	夏	蔔	豆	薑	茯苓	實	查	朴	麴	仁	榔	附子	朮
						子	蔻										
																	2 錢

各
1
錢

棗	薑	梔	青	木	蘇
		子	皮	香	葉

2 3 各
枚 片 5
分

● 주치 및 효능

神經性 胃腸病. 消化不良 滯症 胃下垂 胃潰瘍

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

약 복용 후 腸鳴泄瀉시 약량 재조정

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

參朮健脾湯

薑三棗二	甘草	神麴	麥芽	砂仁	白芍藥	枳實	山查	陳皮	厚朴	黃連	梔子	半夏	赤石脂	牡蠣粉	黃芪	白茯苓	白朮	人蔘	香附子	榆根白皮
	5分	各7分					各1錢								各1.5錢				2錢	5錢

● 주치 및 효능

胃潰瘍

● 복용 용법 · 용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2제可愈

● 주의 사항

• 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활동

便秘 加 當歸，肉蓯蓉 各 2錢

加減增味二陳湯

牛膝	草豆蔻	砂仁	神麴	白芍藥	蒼朮	人蔘	川芎	當歸	枳實	厚朴	黃連	梔子	香附子	陳皮	白茯苓	半夏	黃芪	白朮	葛根
											炒	炒							
各3分				5分	各7分						各1錢								1.5錢

大 生 黃 柴 升 甘
棗 薑 芩 胡 麻 草

2 枚	3 片	各 2 分	3 分
--------	--------	-------------	--------

● 주치 및 효능

急慢性 胃酸過多症(老少不問)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味茯苓湯

白茯苓	3錢
白扁豆	1.5錢
人蔘	
當歸	
黃芪	
葛根	
蓮子肉	
玄胡索	
山查肉	
神麴	
麥芽	
陳皮	
藿香	
沒藥	
甘草	各1錢
乳香	
桂枝	各8分
竹茹	3分

● 주치 및 효능

慢性胃炎，消化不良，胃筋無力，胃潰瘍 等

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味調胃散

烏 賊 骨	白 朮	麥 芽	白 豆 蔻	貢 砂 仁	茴 香	良 薑	玄 胡 索	桂 枝	甘 草	牡 蠣 粉
各 5 分				各 1 錢			各 3.8 錢			7.5 錢

● 주치 및 효능

慢性胃炎, 胃酸過多, 神經性 消化不良症 等

● 복용 용법·용량

1일 3회, 1회 1茶匙 분량(4-6g)을 따뜻한 물에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

內消散

乾 薑	蓬 朮	三 稜	香 附 子	砂 仁	神 麴	山 查 肉	枳 實	白 茯 苓	半 夏	陳 皮	小 茴 香
各 1 錢											2 錢

● 주치 및 효능

十二指腸潰瘍 및 胃潰瘍

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

달여서 팩에 담으면 며칠 지나서 순두부와 같아지니 다시 끓였다 식혀서 들게 함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 담배, 고등어, 꽁치 금할 것.

용소단

甘 草	沈 香	葶 撥	龍 腦	貢 砂 仁	桂 皮	香 附 子	乾 薑	山 查 肉	丁 香	蓬 朮	半 夏	唐 木 香	青 皮
1 兩	各 3 兩		各 4 兩										

●주치 및 효능

慢性 胃炎(消化不良, 痞滿, 胃痛(神經性))

●복용 용법·용량

糊丸朱砂爲衣 . 1일 3회 식사후 1시간에 복용. 1회 30개 정도

慢性 : 속이 더부룩하고 트림(消化不良 및 痞滿) - 약 25-30개 정도면 效果

急性 : 食滯 및 胃痛이甚할 때 - 약 50개 정도면 即效

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味平胃散

大 生 皂 白 神 麥 天 牡 砂 山 陳 白 白 半 玄 白 薏 榆 葛
 棗 薑 角 芩 曲 芽 花 蠣 仁 查 皮 朮 芍 夏 胡 扁 苡 根 根
 子 粉 粉 肉 藥 索 豆 仁 白 皮

炒

8 5 各
 分 分 1.2
 錢

各
 3.7
 錢

●주치 및 효능

胃酸過多 胃十二指腸潰瘍증세로 속쓰리거나 위장에 통증이 심할 때

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

●주의 사항

술, 자극성 음식 담배 금함

●참고

가루약 또는 환약

·처방 : 葛根, 榆根白皮, 薏苡仁 各 2.5錢, 烏賊骨, 白朮 各 1.5錢, 玄胡索, 白芩, 麥芽, 神曲, 甘草 各 1錢. 위 약재를 분말하여 1회 2~3g 식간 공복에 복용함. 환약은 五味子大作製丸하여 1일 2~3회 식후 즉시 또는 공복에 복용함.

加味藿香正氣散

蓬朮	三稜	枳實	砂仁	草果	白扁豆	神麴炒	山查肉	甘草	桔梗	半夏	陳皮	白朮	厚朴	白茯苓	大腹皮	白芷	藿香	蘇葉
3分		5分				各1錢											各2錢	

●주치 및 효능

현대인의 스트레스 - 飽滿, 消化不良, 위염

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

술, 담배, 커피, 육식을 금함.

呃逆 胃腸疾患 經驗方5

薑三棗二	甘草	檳榔	木香	烏藥	蘇葉	藿香	枳殼	神麴	山查	厚朴	陳皮	白朮	川芎	黃芪	龍眼肉	白芍藥	當歸	香附子
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	-----

炒

各7分

各1錢

1.5錢

●주치 및 효능

급만성 위염, 신경성 소화불량, 식중독

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

· 위궤양, 위염 : 牡蠣粉, 海螵蛸

· 변비 : 草決明 2錢, 大黃 1錢,

· 불면증 : 酸棗仁炒 1~2錢

- 위장염 : 黃連 檳榔 1錢
- 간불량 : 茵陳 3錢, 柴胡 2錢, 澤瀉, 梔子炒 各7分

呃逆 胃腸疾患 經驗方6

威靈仙 蓬朮 三稜 蒸大黃 乾薑 厚朴 枳殼 防風 牡蠣粉 龍骨 檳榔 木香 益母草 海螵蛸 白朮 蒼朮 橘皮 陳皮 山查

各
2
斤

各
5
斤

寶豆 決明子 石菖蒲 良薑 江芍藥 香附子 丁香

1
兩

各
2
斤

各
4
斤

各
2
斤

● 주치 및 효능

消化제 四時用, 急慢性 胃炎, 潰瘍에 복용

● 복용 용법·용량

어린이 설사 복통에 1세-1정, 2~3세 -1정~3정, 소아 5정, 성인 10정 복용

● 주의 사항

寶豆는 가정용 식초에 12-20일정도 담구었다가 썰어서 식용유나 米糠油에 초해서 사용함. 많이 복용하면 변비 부작용 생김. 침약시는 1분투약한다.

상복하면 변비가 생기거나 많이(수량을) 복용하면 심한 변비가 있으니 위장 약할 때 소량 복용하되 치료약이나 보약과 함께 복용할 것

加味理中湯

甘 黃 甘 小 牡 玄 白 陳 香 藿 人 乾 肉 白 白 山 龍
 草 連 菊 茴 蠣 胡 芍 皮 附 香 蔘 薑 桂 朮 茯 查 眼
 香 粉 索 藥 子 神 肉

炒

5
分

8
分

各
1
錢

2
錢

3
錢

●주치 및 효능

胃潰瘍 及 十二指腸潰瘍 등

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

복용시 밀가루 음식, 육류, 찬 병과류, 자극성 음식 절대 금할 것

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

13년 간의 상기병증 치료경험이 많으며 치료율이 매우 높았음.

丹蔘補血湯

甘 砂 木 神 遠 酸 龍 山 生 當 地 白 白 蘿 山 丹 牡 白
 草 仁 香 麴 志 棗 眼 查 薑 歸 榆 扁 茯 菖 藥 蔘 蠣 芍
 仁 肉 肉 身 豆 神 子 粉 藥

炙 炒 炒 炒

3
分

5
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

各
3
錢

●주치 및 효능

胃, 十二指腸 潰瘍

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

二陳湯加味方

生 黃 甘 赤 橘 麥 神 蒼 半
 薑 連 草 茯 皮 芽 麵 朮 夏
 薑 苓
 炒 炙

3 5 5 各 2
 片 分 分 1 錢
 1 錢

● 주치 및 효능

신경만 쓰면 속이 쓰린 경우, 신물이 올라오는 경우

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味二陳湯

生 黃 麥 神 蒼 甘 茯 陳 半
 薑 連 芽 麵 朮 草 苓 皮 夏
 薑 汁 炒 炙

3 2 各 5 各 2
 片 分 1 分 1 錢

● 처방 구성

(속 쓰림→痰火로 因함)

● 주치 및 효능

食積으로 인한 소화장애, 온몸이 무겁고 피로, 권태감. 특히 속쓰림

별다른 부작용은 경험한 적이 없고 그 효과는 양방의 H2차단제와 비교할 수 없을 정도로 뛰어납니다.

● 복용 용법·용량

加味理中湯

棗	薑	黃	甘	小	牡	玄	白	陳	藿	人	乾	桂	白	白	山	龍
		連	菊	茴	蠣	胡	芍	皮	香	蔘	薑	皮	茯苓	朮	查	眼
2	3	5	各	香	粉	索	藥						各			肉
個	片	分	7		各								1.5		2	
			分		1								錢		錢	

- 주치 및 효능
胃炎, 胃潰瘍
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
- 활투
胃酸過多 加 吳茱萸, 麥芽
嘔逆 加 半夏

安心湯

五	酸	萊	石	黃	天	麥
味	棗	菴	菖	芩	門	門
子	仁	子	蒲		冬	冬
5	各				各	
分	1				2	
	錢				錢	

- 주치 및 효능
신경성 위장장애(心下痞, 消化不良 등)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

呃逆 胃腸疾患 經驗方7

甘 草	木 瓜	玄 胡 索	乾 薑	貢 砂 仁	枳 實	檳 榔	桂 枝	白 朮	薑 黃	山 查 肉	苦 楝 皮
各 1 錢							各 2 錢		各 3 錢		

●주치 및 효능

神經性 胃痙攣

●복용 용법·용량

湯後에 砂糖 1수저入. 6~20첩

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

●주의 사항

소아는 1/2로 처방함. 식사는 쌀죽으로 소량함.

心和散

甘 草	神 麴	麥 芽	麥 門 冬	枳 實	白 茯 苓	厚 朴	鷄 內 金	木 香	酸 棗 仁	龍 眼 肉	白 朮	白 茯 神	黃 芪
各 1 錢												各 2 錢	

●주치 및 효능

神經性 胃炎

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

治中湯

烏梅 甘草 桂皮 木香 使君子 砂仁 青皮 檳榔 白茯苓 山查肉 人蔘 附子 白朮 龍眼肉

炮

1 個	各 5 分	各 7 分	各 1 錢	1.5 錢	5 錢
--------	-------------	-------------	-------------	----------	--------

● 주치 및 효능

虛冷性 胃痛，胃炎，大腸炎

● 복용 용법·용량

1일 2첩. 식후 2시간에 차게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四物安胃湯

甘 草	木 香	陳 皮	貢 砂 仁	元 肉	白 朮	蓮 子 肉	紫 檀 香	乾 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸
5 分	7 分	各1錢				各1.5錢		各2錢			

● 주치 및 효능

胃潰瘍 十二指腸潰瘍

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

계백환이라 名한 환약을 3개씩 同服.

※ 계백환 만드는 법= 고백반을 만들어서 고운 자루에 넣어 지하 2척에 매장하고 7일 후 출토(화독제거)하여 爲末(180mesh)계란 흰자에 오자대 크기로 作丸함. 作丸시에 쉽게 굳어버리므로 소량으로 하고 작업시 다수인이 필요.

● 주의 사항

술, 돼지, 닭, 메밀음식, 커피, 맵고 짠 음식, 자극성 음식

● 활동

呃逆 胃腸疾患 經驗方9

甘 唐 半 貢 沒 土 山 白 桂 乾 草 人
 草 木 夏 砂 藥 橘 芍 朮 枝 薑 龍 蔘
 香 仁 皮 藥 膽
 土
 薑
 炒

各
7
分

各
2
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

胃潰瘍

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味正元散

蓮 胡 玄 厚 川 木 當 五 川 柴 黑 枳 山 桔 白 陳 藿 黃 香
 子 黃 胡 朴 芎 香 歸 靈 棟 胡 丑 殼 查 梗 朮 皮 香 芩 附
 肉 連 索 酒 脂 子 炒
 洗

各
1
錢

各
2
錢

甘 草 木 沒 大 杏 木 貢
 草 果 賊 藥 茴 仁 通 砂
 香 仁

各
5
分

●주치 및 효능

胃癌 反胃初期

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

人蔘養胃湯加味

柴 甘 人 草 藿 白 元 山 烏 大 生 半 陳 厚 蒼
胡 草 蔘 果 香 茯 肉 查 梅 棗 薑 夏 皮 朴 朮
苓

灸

各
5
分

各
1
錢

各
1.2
錢

1.5
錢

●주치 및 효능

소아, 유소년기 원인불명 腹痛 (초등학교 저학년 아침만 되면 腹痛)

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

●주의 사항

신경 예민하고 밥 잘 안 먹는 애들이 특히 더 잘 들음

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

6~10첩 정도면 대부분 好轉, 그러나 몇 개월 후 재발되는 경우 있음.

① 加味陳陳湯, ② 桂芍養胃湯, ③ 加減參圓飲

①	生薑	烏梅	花椒	甘草	雷丸	茯苓	半夏	陳皮	神麴	山楂肉	苦楝根皮			
	3片	2個	5個	各8分		各1.25錢				2.5錢	3~4錢			
②	烏梅	花椒	甘草	草果	白芍藥土	桂枝	人蔘	茯苓	藿香	半夏	神麴	陳皮	山楂肉	蒼朮
	2個	5分	5分		各8分		各1錢			各1.5錢			2錢	2.5錢
③	薑	烏梅	甘草	神麴	桂皮	唐山查	肉桂	龍眼肉	人蔘					
	3片	2個	5分		各1錢			各5錢						

● 주치 및 효능

食滯腹痛

● 복용 용법·용량

1~2첩을 연령에 따라 分服

● 주의 사항

15세 미만은 川椒不可

임신부는 禁

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

3. 설사 이질 변비 기타

加味白朮湯

甘 山 檳 肉 訶 半 白 乾 木 山 陳 厚 葛 白
 草 藥 榔 荳 子 夏 茯 薑 香 查 皮 朴 根 朮
 薤 苓

炙

各
7
分

各
1
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

大人 小兒 泄瀉

● 복용 용법·용량

大人 泄瀉의 경우, 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용
 5~6첩만 煎服하면 효과 봄

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味白朮散

甘 白 山 肉 草 藿 木 白 白 人 陳 厚 乾 乾
 草 扁 藥 荳 豆 香 香 茯 朮 參 皮 朴 薑 葛
 豆 薤 薤 苓 苓

炒

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

急慢性 腸炎及吐瀉日久

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전에 복용.

● 주의 사항

身溫安靜

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

大人小兒泄瀉氣脫 加 倍人蔘 2~5錢, 破故紙, 金櫻子, 吳茱萸 各 1錢

加味異功散

甘 草	砂 麥	神 木	厚 陳	人 白	白 朮	山 查	玄 之
草 果	仁 芽	麴 香	朴 皮	蔘 苓		肉 3 錢	草 5 錢
各 1 錢							

● 주치 및 효능

慢性 泄瀉

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味健脾湯(參朮健脾湯 加減方)

薑 三 棗 二	甘 草	海 螵 蛸	草 豆 蔻	木 香	鷄 內 金	砂 仁	麥 芽	神 曲	當 歸	龍 眼 肉	酸 棗 仁	山 藥	榆 根 白 皮	鹿 角	黃 芪	人 蔘	白 芍 藥	白 朮	香 附 子
灸						炒	炒	炒		炒							炒		
	各 5 分				各 1 錢													黃 精 法 製 各 1.2 錢	

● 주치 및 효능

腸炎 및 神經性 泄瀉 腹痛症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

특히 냉한 음식, 鷄, 猪, 酒(맥주), 음료수(커피 등), 맵고 짠 음식 等を 禁하고 菜食, 쑥국 등이 좋다.

三白湯 加減方

乾 甘 白 白 白
柿 草 芍 茯 朮
藥 苓
炙

2 5 各
個 分 1.5
錢

●주치 및 효능

泄瀉諸症. 慢性泄瀉者, 飲酒後 泄瀉

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

生冷物을 안 먹도록 지도

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

상습적인 음주자들에게 투약

胃苓湯

砂 檳 甘 肉 神 車 肉 白 赤 白 澤 猪 陳 厚 蒼
仁 榔 草 桂 麴 前 荳 芍 茯 朮 瀉 苓 皮 朴 朮
子 蔻 藥 苓

各
5
分

各
1
錢

●주치 및 효능

水樣性 泄瀉

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

人蔘朮陳湯

吳	人	五	白	白	山	甘	陳	白	白
茱	蔘	味	豆	扁	藥	草	皮	茯	朮
萸		子	薏	豆					苓
5	各								
分	1								
	錢								

●주치 및 효능

10세 미만의 소아 泄瀉로서 장기간되어 향문이 열려서 오무러지지 않는者에 特效임

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

4~5첩 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

理中湯(附子理中湯)

附	甘	乾	白	人
子	草	薑	朮	蔘

各
1.5
錢

●주치 및 효능

腹痛 下痢

●복용 용법·용량

하루 한 첩으로 충분

●주의 사항

이것저것 加味를 하면 약효는 약해진다.

黃芩芍藥湯

桂	老	甘	白	黃
心	鶴	草	芍	芩
	草		藥	
1	1	1	各	
分	撮	錢	2	錢

- 주치 및 효능
痢疾, 急慢性 腸炎
- 복용 용법·용량
1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용
- 주의 사항
당분간 禁食하는 것이 좋음
- 활투
暑 加 白扁豆, 香薷 各 1錢
老鶴草 없으면 金沸草, 玄之草로 대응

清暑二香散

甘	澤	豬	山	肉	厚	白	砂	山	白	白	人	香	香	葛
草	瀉	苓	藥	荳	朴	扁	仁	查	茯	朮	蔘	薷	附	根
				蔻		豆		肉	苓				子	
炙			炒	煨						土				
			黃							炒				
各			各									各		3
5			1									1.5		錢
分			錢									錢		

- 주치 및 효능
傷暑泄瀉
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 따뜻하게 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

甘 熟 白 川 桃 當 大
草 地 芍 芎 仁 歸 黃

黃 藥

1
錢

各
2
錢

5
錢

- 주치 및 효능
便秘(노인이나 젊은 여성들)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
설사를 하거나 하면 大黃을 줄인다.

泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方1

甘 藁 生 川 白 杜 半 麥 牛 白 當 白 車 澤 薏 葛 榆 桑
草 本 薑 芎 芷 冲 夏 門 膝 茯 歸 芍 前 瀉 苡 根 根 白
冬 苓 茶 藥 子 仁 皮 皮

各
1
兩

各
2
兩

4
兩

各
6
兩

各
10
兩

- 주치 및 효능
목양체질의 복부비만 및 체중감량
- 복용 용법·용량
分作 20帖, 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
식이조절 교육

泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方2

檳榔	土厚朴	唐木香	薏苡仁	蘆薈	蒼朮
各 1 斤		各 2 斤		3 斤	5 斤

● 주치 및 효능

便秘, 肥滿, 消化不良(특히 便秘에 特效)

● 복용 용법·용량

綠豆大糊和作丸. 1日 2回, 朝夕食後 30分. 1회에 30알 乃至 40알씩 온수에 吞下함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味雙和湯

大棗	生薑	甘草	桂皮	熟地	黃芪	檳榔	木香	川芎	當歸	白芍藥
3 個	5 片	各 1.5 錢		各 2 錢						4.5 錢

● 주치 및 효능

高等학생(특히 여고생) 변비증에 有效함

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 설탕, 찬 음식(아이스크림)

加味白虎湯

當 歸	麻 子 仁	芒 硝	瓜 薤 仁	獨 活	防 風	玄 蔘	知 母	生 地 黃	石 膏
2 錢	5 分		各 1 錢			各 3 錢		4 錢	5 錢

● 주치 및 효능

少陽人 大便不通 및 便秘

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方3

燈 心	車 前 子	麥 芽	神 麴	半 夏	木 通	滑 石	大 黃
	各 2 錢					3 錢	5 錢

● 주치 및 효능

大小便不通脹滿

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味潤腸湯

草 決 明	枸 杞 子	紅 花	桃 仁	枳 殼	檳 榔	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸	甘 草	金 銀 花	赤 何 首 烏
各 1 錢						各 1.5 錢				各 5 錢		

● 주치 및 효능

惡性便秘(特히 老人便秘)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

赤何首烏, 金銀花, 甘草 各 5錢을 쓰다가 좀 효과가 더딜 때 위 처방을 투약하면 百無一失임

泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方4

甘 草	乾 薑	木 香	厚 朴	枳 實	桔 梗	蓬 朮	小 茴 香	杜 冲	玄 胡 索	吳 茱 萸	肉 桂	白 芍 藥	香 附 子	當 歸	蒼 朮
各 5 分				各 1 錢											2 錢

● 주치 및 효능

時時腹痛症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

20첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

禹水湯

木 通	木 瓜	神 麴	檳 榔	澤 瀉	猪 苓	麥 芽	赤 小 豆
各 2 錢			各 3 錢		各 4 錢		5 錢

● 주치 및 효능

腹水

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

4. 腸癰(盲腸炎)

腸癰(盲腸炎) 經驗方1

砂 仁	桂 皮	半 夏	白 芷	川 芎	青 皮	蓬 朮	三 稜	白 茯 苓	白 芍 藥	乾 薑	當 歸	桔 梗	枳 殼	厚 朴	甘 草	麻 黃	陳 皮	小 茴 香	蒼 朮
5 分	各 7 分							各 8 分							各 1 錢			1.5 錢	2 錢
葱 白	生 薑	肉 桂	玄 胡 索	檳 榔	丁 香 皮														
2 本	3 片	各 3 分		各 5 分															

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

절대 활동 불가.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 치료경험

급성에도 복용 즉시 대효. 盲腸에 3~5첩 卽效 90% 효과.

加味玄蔘湯

甘 陳 蒼 玄
草 皮 朮 蔘

各 3 3
1 錢 兩
錢

● 주치 및 효능

腸癰(盲腸炎)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

복약후 腹痛이 심하면 중지하고, 통증이 사라지면 再服用을 시도함

腸癰(盲腸炎) 經驗方2

沒 乳 白 天 玄 金
藥 香 芷 花 蔘 銀
粉 花

各 各
1 2
錢 兩

● 주치 및 효능

盲腸炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

交腸散

枳 殼	桔 梗	川 練 子	小 茴 香	蓬 朮	三 稜	麥 芽	神 麴	山 查 肉	厚 朴	陳 皮	蒼 朮	敗 醬	金 銀 花
8 分		各 1 錢										各 2 錢	
甘 草	木 香	檳 榔	桂 皮	半 夏	白 芍	乾 薑	當 歸						
各 5 分			各 7 分		各 8 分								

● 주치 및 효능

盲腸炎

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

腸癰(盲腸炎) 經驗方3

沒 藥	乳 香	木 香	皂 角	金 銀 花	赤 芍 藥	大 黃	或 加 當 歸	白 芍 藥	山 查 肉	瓜 蘡 仁	牧 丹 皮	薏 苡 仁
各 7 分		各 1 錢				各 1.5 錢		各 2 錢			各 5 錢	

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

급성 1일 3~4회, 만성 1일 2~3회 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味正氣散

甘 桔 大 白 白 半 陳 厚 白 蘇 藿 沙 小
草 梗 腹 芷 朮 夏 皮 朴 茯 葉 香 蔘 茴
皮 苓 香

灸

各
5
分

各
1
錢

1.5
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

盲腸炎

少陰人에게 효과가 좋으며, 太陰人은 大黃牡丹皮湯 亦可

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

生活湯

桃 牧 玄 或 甘 白 當 沒 乳 青 木 穿 天 皂 黃 木 白 大 白 瓜 金
仁 丹 胡 加 草 芍 歸 藥 香 皮 香 山 花 角 芪 鼈 子 蠶 黃 芷 萸 銀
皮 索 藥 身 甲 粉 刺 子 蠶 仁 花

酒
洗

各
5
分

各
1
錢

1.5
錢

2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

盲腸炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

四物湯加味方

當歸	川芎	白芍藥	熟地黃	大黃	香附子	芒硝	砂仁	半夏
----	----	-----	-----	----	-----	----	----	----

各2錢

各3錢

7
錢

- 주치 및 효능
盲腸 腸內通利 盲腸內物送出함
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
3첩 ~ 4첩 복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味正氣散

藟 薑 甘 桔 半 陳 白 厚 白 大 白 蘇 木 青 桂 藟
草 梗 夏 皮 朮 朴 茯 腹 芷 葉 香 皮 皮 香
苓 皮 苓 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮 皮

炙製

5
分

8 分

各5分

各1錢

1.5
錢

- 주치 및 효능
盲腸炎 及 下腹痛
- 복용 용법·용량
1일 3회 빈속에 복용
3~4첩이면 止痛. 1제 服用
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 갈치, 콩치, 조기

腸癰(盲腸炎) 經驗方4

大黃	烏藥	桃仁	瓜蒌仁	牡丹皮	當歸尾	玄參	薏苡仁
1錢	各1.5錢			各3錢		4錢	7錢

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎(腸癰)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味丹皮散

桃仁	瓜蒌仁	麻子仁	薏苡仁	牡丹皮
各1.5錢		2.3錢	各5錢	

● 주치 및 효능

盲腸炎

● 복용 용법·용량

每食遠服

急性 1日 5첩 까지 쓸 수 있으며 5첩분량에 完治, 慢性 10첩 用(10日 服用).

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

大便不通 加 大黃, 當歸尾 各 1~2錢

泄瀉性 盲腸炎 加 金銀花 5錢, 甘草 2錢, 白芍藥 2錢

腸癰(盲腸炎) 經驗方5

甘 草	桔 梗	木 香	枳 殼	白 芍	檳 榔	烏 藥	防 風	白 芷	厚 朴	桂 皮	川 芎	當 歸	蘇 葉	黃 芪	柴 胡	人 蔘	薏 苡 仁
																	5 錢
各 2 錢																	

● 주치 및 효능

慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

2점오로(재탕포함) 1일 3회 식사 전에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味理陰煎

甘 草	木 香	肉 桂	鎖 陽	乾 薑	熟 地	當 歸
各 1 錢		各 3 錢			各 5 錢	

● 주치 및 효능

중수염

● 복용 용법·용량

4시간마다 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

千金湯

川 楝 子	甘 草	大 黃	芒 硝	瓜 蒌 仁	敗 醬 仁	桃 仁	天 花 粉	牧 丹 皮	金 銀 花
2 個	2 錢	各 7.5 錢		各 10 錢					

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

1첩분량으로 2일동안(5시간 간격으로) 복용, 2~3첩이면 완치됨

● 주의 사항

상기방 복용중에는 흰쌀죽, 간장, 보리차만 먹어야 함

구토증상이 있을 땐 白豆蔻 2錢 加

※ 환자가 내원하였을 경우는 足三里, 上巨虛, 少澤 穴에 刺針하여 30분~1시간 정도 유침하였음

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

약 150case 중에서 1case만 실패함

(나중에 환자가 내원하여 복막염으로 전이되어 고생을 많이 하고 수술하였다고 알려주었음)

大黃牧丹皮湯

桃	當	瓜	大	薏	牧
仁	歸	藁	黃	苡	丹
	尾	仁		仁	皮
2	各		各		
錢	3		5		
	錢		錢		

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

3~5일정도면 효과 보임.

● 주의 사항

아무리 통증이 심해도 복용 30분이면 효능이 나기 시작하며 1~2첩이면 증상 제거, 3~5일이면 완치함. 복막염이 되기 전 사용함.

蟠蔥散加味方

木香	檳榔	玄胡索	蓬朮	三稜	神麴	貢砂仁	丁香	白茯苓	青皮	甘草	大黃	牡丹皮	白芷	黃芪	薏苡仁	蒼朮	瓜蒌仁	桃仁
			酒炒	酒炒	炒	研				炙	酒蒸						研	研
各 7 分										各 1 錢							2 錢	3 錢

- 주치 및 효능
急慢性 盲腸炎
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 환투
急性 桃仁 加 5錢
慢性 瓜蒌仁 加 3錢

金銀牧丹湯

大黃	桃仁	小茴香	牡丹皮	瓜蒌仁	薏苡仁	蒲公英	金銀花土
各 2 錢		各 3 錢			各 5 錢		

- 주치 및 효능
盲腸炎(충수돌기염)
- 복용 용법·용량
상기약 1첩을 水煎하여 2~3회 분복하고 설사가 날 때까지 연복할 것.
설사 후 1일 3회 복용함
- 주의 사항
설사가 극심하면 약복용을 중단하고 통증이 소멸되면 약복용을 중단함

腸癰(盲腸炎) 經驗方6

敗 醬	金 銀	桃 仁	牧 丹	大 黃	瓜 蒔	薏 苡
	花		皮		仁	仁
7 分	各 1 錢				2 錢	3 錢

● 주치 및 효능

腸癰症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大黃牧丹皮湯

甘 草	桔 梗	木 香	枳 殼	白 芍	檳 榔	烏 藥	防 風	白 芷	陳 皮	厚 朴	桂 皮	川 芎	當 歸	黃 芪	人 蔘	蘇 葉	牧 丹 皮	大 黃	
														各 1 錢			1 錢 半		

● 주치 및 효능

直腸癰, 腸癰

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 복용.

3일 후면 효과 나타남.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減雙和湯

大 棗	生 薑	甘 草	桂 枝	黃 連	黃 柏	知 母	大 黃	生 地 黃	當 歸	白 芍 藥	連 翹	金 銀 花
2 介	3 片	各 1 錢								各 3 錢		5 錢

● 주치 및 효능

急慢性 盲腸炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 복용.

10~20첩이 가함.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

腸癰(盲腸炎) 經驗方7

皂 角	乾 薑	生 地	金 銀	紅 花
刺		黃 花		
2 錢	各 3 錢	4 錢	5 錢	

● 주치 및 효능

大便後 下血

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

2~3첩만 사용해도 下血이 그치기 시작하고, 10첩 미만에 나올 수 있음.

● 주의 사항

직장암이나 악성종양의 경우는 不治

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

芍藥黃連湯

桂 大 甘 當 日 白
心 黃 草 歸 黃 芍
連 藥

灸

2.5 5 1 各
分 分 錢 2.5
錢

● 주치 및 효능

腸風下血

● 복용 용법·용량

水煎 1日 3回 食前 溫服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

蟠葱散

葱 乾 官 玄 檳 丁 貢 青 白 蓬 甘 蒼
白 薑 桂 胡 榔 香 砂 皮 茯 朮 草 朮
索 仁 苓

灸

灸

1 各
莖 1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

諸下腹痛, 腸痙攣(대장암 자궁암의 경우도 유효하였음)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

膀胱炎 等 염증일 경우 加 金銀花, 皂角刺, 天花粉 各 1.5錢

正氣天香湯

蓬 朮	三 稜	甘 草	乾 薑	紫 蘇	陳 皮	烏 藥	香 附 子
各 5 分				各 1 錢		1.5 錢	3 錢

● 주치 및 효능

九氣冲心作痛，婦人腦痛尤妙，亦治風寒瘴氣，積氣冲心，胃痙攣

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

痛甚 加 三稜 蓬朮

消痔丸

麝 香	輕 粉	龍 腦	沒 藥	乳 香	胡 桐 淚	朱 砂	石 雄 黃	枯 白 礬	黃 柏	樗 根 皮	皂 角 刺	南 瓜 子	地 榆	秦 朮	槐 角	黃 連
各 1.5 錢		各 5 錢						各 2 兩					各 3 兩			6 兩

● 주치 및 효능

五痔通用

● 복용 용법·용량

糊丸 梧子大. 1일 2~3회 空心服 50개씩.

아래 秦朮蒼朮湯을 겸하여 복용.

외치약으로 馬兜鈴, 瞿麥를 물에 끓여 濕布하고 白礬 5錢, 靑黛 5錢, 五倍子 3錢, 龍腦 2錢, 石雄黃 1錢을 粉末한 후, 바세 린으로 作丸하여 外痔는 塗布하고 內痔는 丸藥을 凍結入肛門 1日 1次

加味秦艽蒼朮湯

甘 大 生 檳 澤 當 樗 黃 防 赤 蒼 槐 桃 皂 南 秦
草 黃 地 榔 瀉 歸 根 柏 風 芍 朮 花 仁 角 星 艽
 黃 皮 藥 仁

酒
洗

炒 炒 燒

各
5
分

各
1
錢

2
錢

● 주의 사항

空心服. 消化不良 있으면 藥量을 줄일 것

加味清腸止血散

甘 升 黃 黃 荊 防 秦 地 蒼 樗 白 當 茜 槐 側 白
草 麻 芩 柏 芥 風 艽 榆 朮 根 芍 歸 根 花 柏 芩
 炒 藥 炒 葉

炒
黑

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

● 주치 및 효능

腸風臟毒 血痔 內痔 便血 腸出血

● 복용 용법·용량

粉末 1~2錢, 食前 30分 服藥.

1일 3회 1주일 복용, 지혈됨

● 주의 사항

豬肉, 자극성 음식물, 술 禁함

● 활투

胃弱消化不良 加 陳皮, 麥芽, 神麴, 砂仁 各7分.

虛弱者 加 人蔘, 黃芪, 阿膠珠 各 1錢

秦艽蒼朮湯加味方

大 檳 澤 當 黃 防 蒼 桃 秦 皂 槐 黃
 黃 榔 瀉 歸 柏 風 朮 仁 艽 角 花 芪
 稍 仁
 炒
 黑

2 各 5 各 各 2 3
 分 3 分 7 1 錢 錢
 分 分 分 錢

- 주치 및 효능
 痔疾(치루는 잘 치료 안 됨)
- 복용 용법·용량
 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용
 보통 2~3제 복용함
- 주의 사항
 · 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵
 어른은 본방 배하고(가미약도) 소아는 본방대로 복용함

蒼朮地榆湯

甘 荊 秦 檳 地 當 枳 厚 陳 山 蒼
 草 芥 朮 榔 榆 歸 殼 朴 皮 查 朮
 肉
 炒 炒

8 各 各 各
 分 1 1.5 2
 錢 錢 錢 錢

- 주치 및 효능
 痔疾性 便秘, 痔核, 痔瘻, 便血, 脫肛痔
- 복용 용법·용량
 1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용
- 주의 사항
 · 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

下血 加 槐花 1錢

痔疾性 便秘 加 皂角刺, 大黃 各 1錢

加味消毒飲

穿 山 甲	紅 花	桃 仁	牧 丹	草 龍	蒼 朮	皂 角 刺	厚 朴	桔 梗	白 芷	當 歸	柴 胡	防 風	天 花 粉	黃 芪	連 翹	金 銀 花
各 1 錢													各 1.5 錢		2 錢	5 錢

●주치 및 효능

痔核, 痔瘻

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

잘 때, 탕액으로 환부를 씻어주면 대효하다

貓肉方

●주치 및 효능

痔漏

●복용 용법·용량

貓脂(오소리기름)를 乘溫하여 患處付之則 神效,

酒痔直腸出血에 貓肉方을 脫脂綿에 묻혀서 肛門內 插入則 神效

6. 비장 췌장질환

加味平肝消癥湯

薑	香	陳	半	山	枳	神	柴	鱉	雞	當	白	白
	附	皮	夏	查	殼	曲	胡	甲	內	歸	朮	芍
子				肉					金			藥
3 片	各 1 錢						2 錢	各 3 錢			各 1 兩	

- 주치 및 효능
脾臟腫大
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
중환자라도 1~2개월이면 효과 봄.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

絶癥丸

甘	綠	唐
草	豆	信
		石
3 錢	6 錢	3 錢

- 주치 및 효능
牙疳症, 腹癥, 脾臟腫大
- 복용 용법·용량
細末 糊丸茱子大
100 일미만 1회 1환. 100日 이상 돌 미만 2-3丸, 1-2세 3-4丸 水下
- 주의 사항
필히 용량에 주의할 것

溫中下積散

甘 草	茵 陳	烏 梅	乾 薑	蓬 朮	三 稜	山 查	桂 皮	川 椒	半 夏	陳 皮	檳 榔	苦 楝 根
各 1 錢				各 1.5 錢								3 錢

● 주치 및 효능

脾臟炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

급성을 제외한 만성 의 통증은 70~80%는 치료될 것으로 사료됨

脾臟 脾臟疾患 經驗方1

木 香	厚 朴	枳 殼	柴 胡	黃 芩	大 黃	蒲 公 英	茵 陳
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------

炒

各 8 分	各 1.3 錢	2.5 錢
-------------	---------------	----------

● 주치 및 효능

急性脾臟炎(단순수종형). 肝膽에 濕熱이 울체되고 腑氣가 通降作用을 喪失한 경우에는 疏肝清熱利濕 通腑攻下 해야함

● 복용 용법·용량

1일 2첩 水煎 3회 식후 30분 溫服

● 주의 사항

實證에 限하여 사용하는 약임

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

大便秘結 加 玄明粉(芒硝를 정제한 약) 4g 冲服

腹脹甚 加 檳榔 5g, 川楝子 4g

嘔吐甚 加 竹瀝 3g, 代赭石 5g

南薤湯

小 唐 山 蒲 玄 赤 天 穿 皂 金
茴 木 查 公 蓼 茯 花 山 角 銀
香 香 肉 英 苓 粉 甲 刺 花
炒 炒

各
1
錢

1.5 2
錢 錢

● 주치 및 효능

臍臟炎

● 복용 용법·용량

水煎食遠服 1~2劑而見效

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味生薑橘皮湯

生 薑 生 陳
半 香 薑 皮
夏

2.5 3 各
錢 錢 1
兩

● 주치 및 효능

臍臟炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전에 복용.

2~3일 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味治中湯

沒藥	五靈脂	玄胡索	草果	灸甘草	神麴	木香	山查肉	破古紙	小茴香	橘皮	白芍藥	白朮	桂枝	乾薑	人蔘
											炒			炒	

5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

脾臟炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

凉血飲

燈心	甘草	連翹	車前子	山梔子	生地黃	麥冬	赤芍藥	天花粉	白芷	薄荷	荊芥	瞿麥	木通
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	----

少
許

各
1
錢

● 주치 및 효능

急性脾臟炎 及 急性脾臟囊腫 初期

● 복용 용법·용량

水煎 斷食而急此再三服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

7. 간장 담낭질환

加味茵陳湯

[illegible]

- 주치 및 효능
黃疸
- 복용 용법 · 용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
경우에 따라 加 葛根 良薑

加味八物湯

茵陳 當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 人蔘 白朮 白茯苓 澤瀉 猪苓 梔子 乾薑 枳實 陳皮 神麴 麥芽 甘草

炒 炮 炒

5 分	各 7 分	各 1 錢	各 2 錢	各 1.5 錢	3 錢
--------	-------------	-------------	-------------	---------------	--------

- 주치 및 효능
黃疸(症狀:全身黃色 或浮腫 微熱 惡寒 或瘙癢 消化不良 小便赤澀 便秘症)
- 복용 용법·용량
2점으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

茵陳五苓散

燈	枳	檳	蘿	青	厚	蒼	猪	澤	赤	茵
心	實	榔	朮	皮	朴	朮	苓	瀉	茯苓	陳
			子						苓	
各									2	3
1									錢	錢
錢										

● 주치 및 효능

黃疸

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味五苓散

桂	赤	日	猪	澤	車	木	瞿	白	蒼	秦	茵
皮	茯苓	綠	苓	瀉	前	通	麥	朮	朮	朮	陳
	苓	礬			子						
5	各								2	3	5
分	1								錢	錢	錢
錢	錢										

● 주치 및 효능

黃疸

● 복용 용법·용량

1일 3회 빈속에 복용. 小兒는 分服, 妊婦는 減量.

輕者는 10첩, 重者는 2~3제

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

肝臟 膽囊疾患 經驗方1

甘	大	梔	枳	葛	陳	蒼	當	茵
草	黃	子	實	根	皮	朮	歸	陳
各								
1								
錢								

3
錢

● 주치 및 효능

黃疸病

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

退黃飲

蘇 茵 金
木 藺 銀
花

3 5 1
錢 錢 兩

● 주치 및 효능

黃疸

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

消黃湯

甘 使 苦 赤 車 砂
草 君 棟 茯 前 仁
子 皮 苓 子

2 各 1 各
錢 4 兩 2
錢 錢 兩

● 주치 및 효능

傷食腹痛 及 浮腫黃疸

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

柴胡瀉肝湯

甘 桔 連 川 青 黃 梔 元
草 梗 翹 芎 皮 芩 子 柴
胡
炒

5 各 各 1.5 2
分 8 1 錢 錢
分 分 錢

● 주치 및 효능

肝臟炎 及 黃疸

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味淸肝湯

薑 甘 木 青 白 枳 蘿 白 砂 牧 黃 山 白 白 柏 香 枸 薑 決 靈
三 草 香 皮 芥 殼 菴 豆 仁 丹 芪 藥 芍 朮 子 附 杞 黃 明 芝
棗 子 子 蔻 皮 藥 仁 子 子 子 子
二
酒 微
炒 炒

各 各 各 2
5 1 1.5 錢
分 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

肝臟炎(飲酒過多而 成者, 勞力過多而 成者)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

兼黃疸 加 茵陳蒿 2.5錢 爲君

加味小柴胡五苓湯

燈 心	甘 草	神 麴	半 夏	黑 豆	人 蔘	猪 苓	白 朮	赤 茯苓	黃 芩	車 前 子	山 查 肉	柏 子 仁	澤 瀉	柴 胡
各 5 分		各 1 錢				各 1.5 錢			各 2 錢				2.5 錢	3 錢

● 주치 및 효능

肝硬化症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味柴苓湯

草 決 明	蓮 子 肉	半 夏	澤 瀉	麥 芽	神 曲	山 查 肉	青 皮	陳 皮	蒼 朮	白 芍 藥	川 芎	當 歸	人 蔘	大 腹 皮	香 附 子	黃 芩	白 茯苓	柴 胡
各 1 錢																2 錢	各 2.5 錢	

梔
子
扁
豆
乾
龍
葛
膽

各
1
錢

● 주치 및 효능

肝臟炎 肝臟腫大症一切

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

肝臟 膽囊疾患 經驗方2

梔 草 蓮 青 人 陳 麥 神 山 黃 草 蒼 白 川 當 白 黃 白 柴
子 決 子 皮 蔘 皮 芽 曲 查 芪 龍 朮 芍 芎 歸 扁 芩 茯 胡
明 肉
炒

各
1
錢

1.2
錢

2
錢

3
錢

各
3.8
錢

甘 薄 半 澤
草 荷 夏 瀉

各
5
分

8
分

1
錢

●주치 및 효능

肝肥大症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味柴平湯

棗 薑 甘 白 川 青 厚 陳 蒼 黃 柴
草 芍 芎 皮 朴 皮 朮 芩 胡
藥

2
個

3
片

各
1
錢

各
2
錢

3
錢

●주치 및 효능

肝炎 肝膿症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●참고

※ 本方은 小柴胡湯과 平胃散合方에 靑皮, 川芎, 白芍藥 各 1錢을 加味한 것이다.

※ 元柴胡를 猪膽炒하여 쓸 것이며 膽石症에는 위 처방에 貢砂仁, 三稜, 蓬朮, 玄胡索 各 1錢을 加하여 투약한 바 현저한 효과를 보았다.

加味升麻葛根湯

甘 草	龍 膽 草	柴 胡	木 香	靑 皮	陳 皮	赤 茯苓	車 前 子	茵 陳	麥 芽	神 麴	山 查 肉	草 決 明	升 麻	白 芍 藥	葛 根
各 5 分						各 1 錢									

●주치 및 효능

肝臟炎, 肝膿瘍, 肝臟肥大, 黃疸, 膽石症, 一切肝膽疾患

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

氣血虛 加人蔘, 當歸, 川芎 各 1~2錢,

膽石症 倍龍膽草

肝硬化症 加白頭翁根 1~2錢

肝臟 膽囊疾患 經驗方3

陳 皮	枳 殼	薄 荷	柴 胡	香 附 子	甘 草	天 花 粉	當 歸	白 芍 藥	金 銀 花
各 1 錢		各 2 錢					各 5 錢		

● 주치 및 효능

肝癰

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

有膿者 5~6첩 服用으로 膿排出

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四苓對金飲子

甘 蒼 神 貢 白 猪 赤 澤 乾 陳
草 朮 麴 砂 芷 苓 茯 瀉 葛 皮
仁 苓

炒

各 7 分	各 1 錢	各 1.5 錢	2.5 錢	2 錢	3 錢
-------------	-------------	---------------	----------	--------	--------

● 주치 및 효능

알콜중독성 肝硬化증(肝部位硬堅及黃疸)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清肝解鬱湯

甘 草	白 芥 子	蒼 朮	梔 子	川 芎	枳 殼	赤 茯 苓	半 夏	陳 皮	香 附 子
各 1 錢			各 1.5 錢			各 2 錢			3 錢

● 주치 및 효능

肝臟腫大, 肝臟炎重症, 肝硬化 初中期

- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
便秘 加牧丹皮, 桃仁

加味清肝消氣湯

甘 草	唐 木 香	枳 殼	檳 榔	烏 藥	防 風	白 芷	厚 朴	官 桂	白 芍 藥	川 芎	當 歸	黃 芩	白 茯 神	香 附 子	赤 茯 苓	橘 皮	蘇 葉	半 夏	青 皮
										去 油				童 便 炒				薑 製	薑 製
各 5 分									各 1 錢						各 1.3 錢			2 錢	3 錢

- 주치 및 효능
甲狀腺腫大, 肝硬化, 疑似乳癌 腹腔內疑似癌, 子宮內疑似癌, 膽石症, 其他 諸臟腑結石症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
1~2개월 혹은 3개월 이상 장복해야 효과 봄.
- 활투
肝硬化 加 柴胡 1錢 尤效

柴胡湯

棗	薑	甘 草	香 附 子	乾 葛	蒼 朮	厚 朴	蓬 朮	三 稜	枳 殼	青 皮	陳 皮	半 夏	黃 芩	柴 胡
2 個	3 片	5 分	各 1 錢											

● 주치 및 효능

肝臟炎, 膽石症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

平肝湯

防 木 甘 烏 麻 麥 山 半 陳 厚 黃 秦 葛 蒼 茵
風 通 草 梅 黃 芽 查 夏 皮 朴 芩 皮 根 朮 陳

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

取汗토록 하며 7日 ~ 15日間 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

嘔吐 甚 加 丁香, 草豆蔻 各 1錢

加味生肝健脾湯

香 柴 蘿 砂 枳 青 藿 白 厚 神 猪 麥 白 山 陳 蒲 金 澤 茵
附 胡 菹 仁 實 皮 香 茯 朴 曲 苓 芽 朮 查 皮 公 銀 瀉 陳
子
各
1
錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢

各
1.5
錢

2
錢

各
3
錢

3.5
錢

薑 甘 蓬 三 木 蘇
草 朮 稜 香 葉

3 各 1
片 8 錢
分

● 주치 및 효능

諸般 肝炎, A型 B型 肝炎, 黃疸, 酒傷肝炎, 肝硬化 消化不良

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

蒲公英은 隨症하여 去加한다. 或 加 榆根白皮, 魚腥草, 玄之草 尤效

生肝健脾湯

生 甘 青 枳 蓬 三 蘿 砂 木 陳 藿 厚 白 猪 麥 白 山 澤 茵
薑 草 皮 實 朮 稜 菹 仁 香 皮 香 朴 茯 苓 芽 朮 查 瀉 陳
子

3 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各
片 8 1 2 4
分 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

急慢性肝炎 肝硬化症/黃疸 腹滿 腹水 積聚 간암

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減小柴胡湯

甘 白 半 桂 黃 白 柴
草 芥 夏 枝 芩 芍 胡
子

各 各 各 各 各 各 各
1 2 2 2 2 3
錢 錢 錢 錢 錢 錢 錢

- 주치 및 효능
急性 肝炎
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
大便不通 加 大黃, 枳實 各 2錢
黃疸 加 茵陳蒿, 蒼朮 各 2錢

加味大柴胡湯

大 生 黃 甘 黃 人 桂 半 白 猪 澤 柴
棗 薑 苓 草 柏 蔘 枝 夏 朮 苓 瀉 胡

各 1.5 各 各 各
1 錢 2 2.5 3
錢 錢 錢 錢

- 주치 및 효능
肝炎 黃疸 肝硬變 肝化膿症 其他 肝病
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味清肝湯

棗 薑 甘 草 梔 枳 黃 檳 茯 半 青 厚 白 柴 茵
草 龍 子 殼 芩 榔 苓 夏 皮 朴 朮 胡 陳
膽 炒 蒿

2 3 5 各 各 1.5 3
個 片 分 8 1 錢 錢
分 錢

● 주치 및 효능

肝臟腫大 腹脹 寒熱似瘧 / 右脇牽硬痛 發黃 心下痞

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

胸痞에 加 神麴, 蘿菹子炒

痞積不利 加 香附子 2錢 三稜 蓬朮 木香 各 1錢

肝熱 眼赤에 加 草龍膽 決明子 各 1錢

腹脹에 加 蒼朮 1.5錢 大腹皮 桑白皮 茯苓皮 各 2錢

濕熱薰蒸에 加 黃連酒炒 5分 連翹 1錢

尿不利에 加 冬瓜子 1.5錢 猪苓 澤瀉 1錢 燈心 1團

清肝補肝湯

草	茵	木	半	車	麥	神	砂	桔	枳	香	澤	陳	厚	黃	白	白	柴	白
龍	陳	香	夏	前	芽	曲	仁	梗	殼	附	瀉	皮	朴	芩	茯苓	芍	胡	朮
膽	蒿			子						子								
各														各				3
1														2				錢
錢																		

甘 藷 草
草 香 果

各
1
錢

● 주치 및 효능

肝炎 / 右脇下滿痛 或 硬化 往來寒熱 食慾不振 乾嘔 消化不良 等症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味鹽田湯

肉桂	茴香	青皮	麥芽	神麴	厚朴	白茯苓	枳殼	蓬朮	三稜	白芍藥	川芎	當歸	瓜蒌仁	白芥子	半夏	柴胡	蒼朮	葛根
5分	各1錢																	各2錢

大生甘
棗薑草

2 3 5
個 片 分

●주치 및 효능

肝炎 肝部位 壓痛 或 浮腫

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大柴胡湯1

棗	薑	茵陳蒿	柴胡	半夏	枳實	大黃	白芍藥	黃芩	蝸螺
2個	3片	各1錢			1.5錢	2錢	各2.5錢		1升

●주치 및 효능

便秘性 肝炎 濕熱性

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味茵陳五苓散

甘 草	官 桂	澤 瀉	猪 苓	滑 石	梔 子	蒼 朮	牡 蠣 粉	赤 茯苓	白 朮	茵 陳 蒿
各 2 分		各 1 錢						各 1.5 錢		3 錢

● 주치 및 효능

肝炎 肝硬變에 特效方

● 복용 용법·용량

細末한 뒤 每 12g씩 1日 3回 복용

● 주의 사항

肝炎(黃疸) 초기에 牡蠣粉을 去하고 使用한다.

겸하여 침법 : 百會, 曲池, 間使, 合谷, 足三里, 太衝에 10分 留針. 청장년에는 성욕을 감퇴시키기 위하여 照海에 施鍼한다.

加味柴胡養胃湯

甘 草	草 果	大 棗	生 薑	茯 苓	半 夏	黃 芩	厚 朴	陳 皮	人 蔘	蒼 朮	茵 陳 蒿	柴 胡
各 5 分		各 1.5 錢								各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

急慢性 肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味雙金湯

大 棗	生 薑	神 麴	砂 仁	赤 茯苓	甘 草	桂 皮	川 芎	熟 地 黃	當 歸	葛 根	陳 皮	白 何 首 烏	蒼 朮	白 芍 藥
2 個	3 片	各 1 錢			各 1.5 錢		各 2 錢				各 3 錢		各 4 錢	

●주치 및 효능

알콜성 胃炎 및 肝炎

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

消化不良 加 藿香 1錢,

目黃 加 茵陳蒿 柴胡 各 2錢

敗醬散

沒 藥	玄 胡 索	木 香	甘 草	薏 苡 仁	厚 朴	白 芍 藥	小 茴 香	玄 蔘	蒲 公 英	金 銀 花	敗 醬
各 1 錢			各 2 錢					各 3 錢			5 錢

●주치 및 효능

肝浮腫 및 盲腸炎 面浮 慢性腎臟炎

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

茵陳胃苓湯

大 棗	生 薑	肉 桂	車 前 子	梔 子	柴 胡	枳 殼	白 朮	赤 茯苓	澤 瀉	木 通	茵 陳 蒿
2 個	3 片	8 分	各 1 錢				各 1.5 錢		各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

肝炎 脂肪肝 膽囊炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減地黃湯

麥 芽	神 麴	青 皮	猪 苓	車 前 子	防 風	荊 芥	獨 活	羌 活	茵 陳 蒿	柴 胡	澤 瀉	牧 丹 皮	茯 苓	山 茱 萸	熟 地 黃
									各 2 錢						
各 1 錢															

● 주치 및 효능

少陽人 肝炎, 酒客肝炎, 黃疸性 肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

無間生肝湯

蒼 朮	枳 殼	砂 仁	牛 蒡 子	車 前 子	白 茯苓	陳 皮	澤 瀉	猪 苓	厚 朴	青 皮	桂 枝	白 芍 藥	人 蔘	茵 陳 蒿	黃 芩	牧 丹 皮	赤 芍 藥	柴 胡
																各 1.5 錢		2.5 錢
各 1 錢																		

大 生 甘 棗 薑 草

2 3 2
個 片 分

● 주치 및 효능

肝硬化症 / 肝硬化로 食慾不振 體瘦 腹脹 疲勞 等症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

番瀉葉湯

甘	砂	木	青	蓬	三	枳	蘿	藿	厚	猪	白	陳	白	山	麥	澤	茵	番
草	仁	香	皮	朮	稜	實	菹	香	朴	苓	茯苓	皮	朮	查	芽	瀉	陳	瀉
							子							肉			蒿	葉
																炒		
							酒	酒										
							炒	炒										

各
5
分

各
8
分

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

急慢性 肝臟炎

● 복용 용법·용량

+薑3片 棗2枚 . 1日 2첩 오전 오후 식후 30분 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

番瀉葉은 시중에 유통이 되지 않고 있어 구하기 어렵지만, 肝臟에는 특수한 작용이 있다.

加味大柴胡湯2

왕	半	枳	白	黃	瓜	柴	蝸
머	夏	實	芍	芩	蒂	胡	螺
루			藥				
뿌							
리							
덩							
굴							
30	1	1.5	各		各		
錢	錢	錢	2		4		
			錢		錢		

● 주치 및 효능

肝炎 肝硬化 癌症

● 복용 용법·용량

1日 1첩 服用. 이와는 別途로 熊膽 1.4g씩 燒酒에 朝夕 2次 調服함

● 주의 사항

便秘 熱甚加 大黃 8g, 黃疸加 茵陳蒿 12~20g, 瓜蒂는 개똥참외꼭지도 무방

健脾軟肝湯

甘	鷄	茜	枳	蒲	青	丹	地	茯	五	白	柴	炙	白
草	內	根	殼	黃	皮	蔘	龍	苓	靈	朮	胡	鰲	茅
	金								脂			甲	根
5	8	各				各						2	3
分	分	1				1.5						錢	錢
		錢				錢							

● 주치 및 효능

肝硬化

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

腹脹消食 加 山查肉, 神麴, 麥芽 各 1.5錢, 砂仁 1錢

腹水 加 黑丑, 白丑(并炒) 1~1.5錢, 車前子 1.5~2錢, 砂仁 0.7~1錢

腹脈暴露者 加 赤芍藥, 鬱金, 三稜, 蓬朮 各 1.2~1.5錢

蜘蛛紙와 朱砂掌 加 生地黃, 赤芍藥 各 1.5錢, 桃仁 1.2錢, 紅花 1錢, 鷄血藤 2錢
 大便泄 加 澤瀉 1.2錢, 蒼朮, 神麴, 藿香 各 1錢
 脾肝腫大者 地鱉蟲, 桂枝 各 1錢, 射干 1.2錢

加味人養湯

大 生 梅 草 甘 人 藿 茵 王 赤 厚 陳 半 蒼
 棗 薑 果 草 蓼 香 陳 不 茯 朴 皮 夏 朮
 蒿 留 苓
 行

炙

2 3 1 各 各 各 2
 個 片 個 5 1 1.2 錢
 分 錢 錢

● 주치 및 효능

肝硬化症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
 或加 藪菜 蛇莓草 1.5錢, 草龍膽 8分, 白屈菜 5分

加味茵陳化瘀湯

紅 青 桃 牧 赤 大 當 梔 白 人 丹 穿 澤 茵 牡
 花 皮 仁 丹 芍 黃 歸 子 朮 蔘 山 瀉 陳 蠣
 皮 藥 皮 甲 蒿 粉
 各 各 各 10
 2 4 5 錢
 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

肝硬化症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

潮熱 加 柴胡, 地骨皮.

清肝湯

乳 沒 砂 木 黃 烏 枳 甘 山 榆 連 陳 皂 茵 白 赤
香 藥 仁 香 芩 藥 實 草 查 根 翹 皮 角 陳 芍 茯
肉 白 皮 刺 蒿 藥 苓

炒
黑

5 各
分 1
錢

1.5 各
錢 2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

肝硬變 實證 腹水 慢性肝炎 肝膿瘍 胸痛 消化不良 等症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

治肝湯

木 山 榆 皂 穿 半 梔 神 香 蒲 白 桔 澤 柴 金 白 白 甘 連 茵 豨
香 查 根 角 山 夏 子 麵 附 公 朮 梗 瀉 胡 銀 茯 芍 草 翹 陳 蓀
肉 白 刺 甲 子 英 花 苓 藥 蒿

炒

各
1
錢

各
2
錢

●주치 및 효능

肝部腫硬疼痛 高血壓 消化不良 面黑

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味仙方活命飲1

甘 草	黃 芩	柴 胡	貝 母	半 夏	牛 蒡 子	羌 活	天 花 粉	穿 山 甲	沒 藥	乳 香	大 黃	白 芷	防 風	黃 芪	陳 皮	當 歸	皂 角 刺	金 銀 花
各 1 錢																		各 2 錢

●주치 및 효능

肝 實質組織 肥大充血/ 肝位 持續疼痛 高熱 黃疸 呼吸困難 嘔吐 消化 不良 等 重症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味仙方活命飲2

沒 藥	穿 山 甲	防 風	甘 草	赤 芍 藥	白 芷	天 花 粉	貝 母	乳 香	陳 皮	皂 角 刺	當 歸 尾	金 銀 花	大 黃
	炒												

各
5
分

8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

3
錢

5
錢

●주치 및 효능

肝膿瘍

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 사이에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

金銀花治肝湯

① 甘 天 牛 蔓 白 蒲 麥 金
 草 花 蒡 蓼 芷 公 門 銀
 粉 子 英 冬 花
 各 3 5 5
 錢 錢 兩

② 甘 紅 桂 當 陳 半 烏 薑
 草 花 心 歸 皮 夏 藥 黃
 各 8 各 1.5 3
 5 分 1 錢 錢

● 주치 및 효능

肝癰

● 복용 용법·용량

①번약 1첩 水煎 3~5回 分服 或加 陳皮 1兩

②번약 1제 즉 永差

消積正元散

甘 山 麥 砂 青 陳 赤 海 玄 枳 梔 香 神 白 葛 茵
 草 查 芽 仁 皮 皮 茯 粉 胡 實 子 附 曲 朮 根 陳
 肉
 各 7 各 1.5 2 4
 分 錢 錢 錢

● 주치 및 효능

알콜성 간질환, 알콜성 간경화

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

腹水가 있을 때는 合五苓散

加味對金飲子

人茵葛麥神砂茯甘蒼厚陳
蔘蔞根芽曲仁苓草朮朴皮

各
2
錢

各
1
錢

3
錢

● 주치 및 효능

알콜성 간염, 간경화증, 약물중독증

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

10일 이상 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 참고

天水散 겸용하면 더욱 좋음. 天水散은 一茶匙, 오전 11시, 오후 5시, 1일 2회 복용

清肝健脾湯

生青蓬三麻大神蘿枳半藿麥赤車澤厚陳白蒼山
薑皮朮稜子腹麵菰蕒實夏香芽茯前瀉朴皮朮朮查

3
片

各
5
分

各
7
分

各
8
分

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

香附肉桂丸

附 使 澤 大 蓬 三 雷 黑 藿 青 肉 香
子 君 瀉 黃 朮 稜 丸 丑 香 皮 桂 附

子
5 各
分 1
錢

2.5 各
錢 4
錢

● 주치 및 효능

肝디스토마

● 복용 용법·용량

糊丸 梧子大로 40丸 정도를 1日 3回 食間服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味小柴胡湯

甘 半 龍 青 蒼 茯 澤 白 川 當 人 黃 柴
草 夏 膽 皮 朮 苓 瀉 芍 芎 歸 蔘 苓 胡
藥

各 各
5 1
分 錢

2 3
錢 錢

● 주치 및 효능

肝臟炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

當歸退黃湯

甘 柴 豬 黃 草 木 梔 砂 枳 青 厚 木 車 澤 陳 人 茵 白 山 蒼 當
草 胡 苓 連 龍 香 子 仁 實 皮 朴 通 前 瀉 皮 蔘 陳 茯 查 朮 歸
膽

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

肝炎

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용.

2~3제 可愈

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

小柴胡合內消散

大 生 甘 半 人 黃 柴 乾 蓬 三 香 砂 神 山 枳 白 陳
棗 薑 草 夏 蔘 芩 胡 薑 朮 稜 附 仁 麴 查 實 茯 皮
子

2 1 5 各 2 各
個 錢 分 1 錢 3
錢

● 주치 및 효능

肝硬化 및 肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

肝臟 膽囊疾患 經驗方4

薄 陳 砂 厚 麥 當 柴 白 丹 沙 枳 白 白
荷 皮 仁 朴 門 歸 胡 茯 蔘 蔘 殼 芍 朮
冬 苓 藥

各 各 各
1 1.5 2
錢 錢 錢

● 주치 및 효능

肝炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味生肝湯

大棗	生薑	青黛	蓬朮	三稜	甘草	唐木香	藿香	山查	半夏	陳皮	厚朴	赤茯苓	蘿菔子	蘇葉	枳實	香附子	蒼朮	澤瀉	茵陳
																童便炒			
2個	3片	5分	各3分		5分	各8分						各1錢					1.5錢	3.5錢	5錢

●주치 및 효능

肝機能低下. GOT, GPT 수치를 떨어뜨릴 수 있음

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용 약 20日 정도 복용으로 可愈

●주의 사항

지방간 소견을 접할때 靑黛를 5分~1錢 加한다. 단 위장이 약한자는 금한다.

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

50명 이상의 치료 경험이 있으며. 약 50%에서 유효했음.

治疸湯

甘草	檳榔	麥芽	神曲	貢砂仁	白芍藥	熟地黃	當歸身	葛根	桂皮
				炒					
					炒末				
5分	7分	各1錢					各5錢		

●주치 및 효능

慢性肝炎, 肝硬變初期, 消化障礙合併時

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味消脹湯

酸 棗 仁	玄 胡 索	鯨 甲 尾	當 歸	半 夏	神 麴	山 查	甘 草	枳 殼	陳 皮	白 朮	葛 根	蘇 葉	蘿 菥 子
各 1 錢											各 1.5 錢		

● 주치 및 효능

肝腫大 (후 肝脾腫大)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

肝癌, 肝硬化 或은 肝化膿이 아닌 모든 肝臟病에, 특히 肝이 肥大하여 있는
증에 著效가 있다.

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

50명 이상의 치료경험이 있으며, 80% 이상에서 효과보임.

肝臟 膽囊疾患 經驗方5

蓬 朮	三 稜	小 茴 香	草 龍 膽	青 皮	枳 殼	梔 子	檳 榔	甘 草	麥 芽	牡 蠣 粉	半 夏	厚 朴	柴 胡 土	香 附 子 土	山 查 肉 土	陳 皮	白 朮	白 芍 藥	金 銀 花	當 歸	
酒 炒	酒 炒									炒											
各 1 錢										薑 汁 炒			各 1.5 錢						2 錢		

● 주치 및 효능

肝硬化症(尿赤)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

20첩 복용으로 可愈

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味解勞散

大 生 甘 香 檳 茯 青 川 人 鱉 黃 枳 芍 柴
棗 薑 草 附 榔 苓 皮 棟 蔘 甲 芩 實 藥 胡
子 子

4
錢

- 肝臟炎，膽囊炎，肝癰，肝硬化虛證 神效

- 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

주의 사항

- **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清肝丸

甘草 當歸 柴胡 梔子 澤瀉 白朮 白芍藥 白茯苓 半枝蓮 虎杖根 白花蛇舌草 熊膽粉 丹蔘 黃瓜藤 茵陳 板藍根 夏枯草 大青葉

各5錢

- 諸般肝炎，肝硬化，肝數值低下，酒傷肝，肝機能保護

- 上藥을 精選水洗乾燥爲末作丸하되 熊膽粉(熊膽汁乾燥)을 酒精에 녹여서 그 물로 作丸
함

1일 2회 7g씩 3개월 이상 복용

- 服藥中 便泄있으면 藥量을 줄임

加味清肝湯

棗	生	沒	乳	甘	杏	木	神	天	瓜	陳	白	枳	桔	皂	穿	白	梔	連	柴	白	白	金
薑	藥	香	草	仁	香	曲	花	薤	皮	朮	殼	梗	角	山	芷	子	翹	胡	茯	苓	芍	藥
								粉	仁					刺	甲							花
2	3	各														各				3	5	7
個	片	5														2				錢	錢	錢
		分														錢						

● 주치 및 효능

肝硬化症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

茵陳湯

甘	白	薤	蓬	三	大	半	草	青	砂	蘿	陳	厚	赤	猪	白	蒼	山	麥	澤	茵
草	芍	香	朮	稜	腹	夏	龍	皮	仁	菖	皮	朴	茯	苓	朮	朮	查	芽	瀉	陳
	藥				皮		膽			子			苓							
各																	各		3	5
1																	1.5		錢	錢
錢																	錢			

● 주치 및 효능

肝硬化

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

1~5제까지

● 주의 사항

鷄, 猪, 酒, 麵, 메밀, 녹두음식 금할 것

或 加 金銀花, 枳實, 神麴, 木香, 木通, 柴胡 各 4g

生肝健脾湯

生 薑	甘 草	砂 仁	木 香	青 皮	蓬 朮	三 棱	枳 實	蘿 蔔 子	藿 香	厚 朴	豬 苓	白 茯 苓	陳 皮	麥 芽	山 查 肉	白 朮	澤 瀉	茵 陳
各 8 分										各 1 錢				各 2 錢			各 3.7 分	

- 주치 및 효능
손상간의 회복과 재생
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

柴胡疎肝散

甘 草	白 芥 子	青 皮	赤 芍 藥	川 芎 子	香 附 子	枳 殼	陳 皮	柴 胡
					醋 炒			

各 1 錢	各 1.5 錢	各 2 錢
-------------	---------------	-------------

- 주치 및 효능
諸般脇痛(肝火盛으로 오는 脇痛)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 활투
肝經一條扛起 加 麥芽, 青皮, 山查.
血痛 加 當歸, 南星, 桃仁, 紅花, 牡丹皮
乾嘔咳脇下痛停飲 加 半夏, 白茯苓.
冷痛 加 肉桂, 吳茱萸.
脣焦口渴乍痛乍止 加 山梔, 黃芩

生肝健脾湯

生 甘 砂 唐 青 蓬 三 枳 蘿 藿 厚 猪 白 陳 麥 山 白 澤 茵
 薑 草 仁 木 皮 朮 稜 實 菴 香 朴 苓 茯 皮 芽 查 朮 瀉 陳
 香 子 苓 炒

3 各
 片 8
 分

各
 1
 錢

各
 3
 錢

各
 4
 錢

● 주치 및 효능

B형간염, 알콜성지방간, 간경화성황달

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2-3제면 治癒

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

過飲酒者는 加葛根 2.5錢, 良薑 2錢, 草豆蔻 1錢. 或加秦皮 3錢

肝臟 膽囊疾患 經驗方6

甘 龜 鹿 淫 牡 鎖 肉 杜 熟 黃 枸 五 白 白 黃 人 威 天
 草 板 角 羊 蠣 陽 荏 冲 地 精 杞 味 花 何 芪 蔘 靈 花
 藿 蘆 薤 蓉 黃 子 子 蛇 首 烏 仙 粉
 草

各
 等
 分

● 주치 및 효능

肝炎 肝癌

● 복용 용법·용량

食間服 1日 1~2回. 虛弱者 少量 服用함

● 주의사항

간질환이 있는 자는 약을 약하게 복용한다.

●활투

膀胱尿道炎 加 草薢 車前子

肝炎 黃疸 尿黃而少 加 茵陳, 車前子, 梔子

筋肉化膿 加 黃芩, 金銀花, 連翹, 穿山甲, 白芷, 黃柏

加味茵陳湯

甘 麥 神 陳 山 砂 赤 白 葛 玄 川 防 白 澤 茵
草 芽 麴 皮 查 仁 茯 朮 根 草 芎 風 屈 瀉 陳
肉 苓

炒

各
7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
3
錢

5
錢

●주치 및 효능

A형 간염 황달

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味消煎湯

半 枳 神 山 柴 白 桂 鰲 當 白 白
夏 殼 麴 查 胡 茯 枝 甲 歸 朮 芍
肉 苓 苓 身 藥

各
7
分

各
1
錢

2
錢

3
錢

各
5
錢

●주치 및 효능

慢性 肝硬化症

●복용 용법·용량

水煎 食間服.

二指大程度로 腫硬者 1제, 三指大者 2제, 四五 指大者 3~4제

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

烏梅一味煎

烏梅一味煎湯

● 주치 및 효능

肝硬化症

● 복용 용법·용량

無時服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味良枳湯

薑	甘	繁	良	黃	蘿	陳	枳	白	桂	半	白	柴
三	草	甲	薑	芩	菹	皮	實	茯	枝	夏	芍	胡
棗					子			苓				藥
二												

各
7.5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

膽石症, 膽囊炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大柴胡湯加減方

石	桔	枳	大	甘	黃	柴	白
膏	梗	實	黃	草	芩	胡	芍
							藥
各			2	各		4	5
1.5			錢	2.5		錢	錢
錢				錢			

● 주치 및 효능

膽石症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大柴胡湯

棗	薑	草	青	甘	桂	半	枳	黃	大	玄	白	白	柴	當	小
		龍	皮	草	皮	夏	實	芩	黃	胡	茯苓	芍藥	胡	歸	茴香
2	3	5	各				各			各		各			
個	片	分	1				1.5			2		3			
			錢				錢			錢		錢			

●주치 및 효능

膽石症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味疎肝湯

半	陳	赤	猪	黃	生	柴	甘	蓬	三	青	木	蘿	麥	山	厚	白	澤	茵
夏	皮	茯苓	苓	芩	乾地黃	胡	草	朮	稜	皮	香	菴子	芽	查肉	朴	朮炒	瀉	陳蒿
					1.5	2												8
					錢	錢												錢
棗	薑	紅	枳															
		花	實															
2	3	3	1															
個	片	分	錢															

●주치 및 효능

膽石症/ 消化不良 腹水 脹滿 小便不利 黃疸

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

노약자는 주의함.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味正氣散

甘 草	神 曲	旋 覆 花	木 通	枳 實	木 香	山 查 肉	白 芍 藥	藿 香	赤 茯 苓	半 夏	厚 朴	蒼 朮
2 分		各 8 分				各 1.5 錢						2 錢

●주치 및 효능

膽石症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

解毒湯

甘 草	黃 芩	柴 胡	海 金 砂	鬱 金	車 前 子	唐 木 香	龍 膽 草	山 梔 子	滑 石	赤 茯 苓	澤 瀉	茵 陳 蒿
各 5 分			各 1 錢		各 1.3 錢				各 2 錢			

●주치 및 효능

膽石症 및 膽囊炎/ 膽囊腫大와 一般黃疸症에 有效하다

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

蛔膽湯

烏 梅	甘 草	麥 芽	神 曲	檳 榔	川 芎	藿 香	苦 楝 根 皮	白 芍 藥	山 查 肉	赤 茯 苓	半 夏	陳 皮	厚 朴	蒼 朮
3 個	各 2 分			各 8 分		各 1 錢								2 錢

● 주치 및 효능

因蛔蟲 膽道閉塞症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

藿香正氣散加味方

甘 草	梔 子	旋 覆 花	當 歸	黃 芩	藿 香	烏 藥	白 芍 藥	葛 根	黃 連	青 皮	香 附 子	赤 茯 苓	半 夏	厚 朴	蒼 朮
2 分	5 分	8 分	各 1 錢												2 錢

● 주치 및 효능

化膿性 膽囊炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

治囊湯

甘草	2錢	白芍藥		柴胡		當歸		草龍膽	各1錢	金銀花		瓜蒌仁	各8分	青皮		黃連		梔子		牡丹皮	各7分	大黃	5分	木香	2分
----	----	-----	--	----	--	----	--	-----	-----	-----	--	-----	-----	----	--	----	--	----	--	-----	-----	----	----	----	----

- 주치 및 효능
膽囊炎
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大柴胡湯

玄 胡 索	乳 香	梔 子	半 夏	甘 草	黃 芩	柴 胡	白 芍 藥
	微 炒	炒					

各 1 錢	各 8 分	1.5 錢	2 錢	各 3 錢
-------------	-------------	----------	--------	-------------

- 주치 및 효능
膽石症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味凉膈散火湯

防 荊 石 薄 梔 連 忍 決 生
風 芥 膏 荷 子 翹 冬 明 地
藤 子 黃

各
1
錢

各
2
錢

- 주치 및 효능
少陽人 膽石症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減柴胡湯

甘 玄 梔 枳 黃 大 半 白 柴
草 胡 子 實 芩 黃 夏 芍 胡
索

炒

各
1
錢

各
1.5
錢

3
錢

- 주치 및 효능
膽結石 及 炎症(가슴앓이)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味補中益氣湯

大 棗	生 薑	龍 眼 肉	烏 梅	川 椒	肉 桂	乾 薑	柴 胡	陳 皮	升 麻	當 歸	甘 草	白 朮	人 蔘	黃 芪
2 個	3 片	1 錢	1 個	30 粒	各 7 分		3 分	各 5 分			各 1 錢			1.5 錢

● 주치 및 효능

膽石

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大柴胡湯加味方

大 棗	生 薑	青 皮	甘 草	黃 連	鬱 金	山 梔 子	半 夏	枳 實	赤 芍 藥	黃 芩	厚 朴	大 黃	元 柴 胡
2 個	3 片	各 5 分							各 1 錢				2 錢

● 주치 및 효능

膽石症(有腹力有熱口渴胸悶 便秘者最適)

● 복용 용법·용량

水煎 1日 2回 食間 溫服

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

肝臟 膽囊疾患 經驗方7

茵 陳	甘 草	神 麴	陳 皮	藿 香	檳 榔	木 香	枳 殼	蘇 葉	川 芎	烏 藥	厚 朴	山 查	蒼 朮	香 附 子
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 各 1 錢 1.5 錢 </div>														

● 주치 및 효능

慢性 虛症의 膽囊炎 및 膽石症(自覺症狀을 心下 정도만 느끼는 환자)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

不眠 加 酸棗仁 7分

藿香正氣散

大 棗	生 薑	甘 草	桔 梗	半 夏	陳 皮	白 朮	厚 朴	白 茯苓	大 腹 皮	白 芷	蘇 葉	藿 香
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------------	--------	--------	--------

灸

2 3 各
枚 片 5
分

1 1.2
錢 錢

● 주치 및 효능

膽石疝痛

平素健康한 듯이 보이거나 갑자기 胃痛하여 數十分間씩 每個月 不定期的으로 反復함

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

小柴胡湯加味方

甘 生 大 人 白 黃 桂 半 柴
草 薑 棗 蔘 芍 芩 枝 夏 胡
藥

5 各
分 1
錢

2 3
錢 錢

● 주치 및 효능

膽石症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 환투

無熱 減 柴胡 2錢

제9장 내분비 및 영양 및 대사 질환

1. 내분비 질환

加味歸脾湯

柴 甘 貝 桔 梔 黃 酸 遠 白 黃 當 白 人
胡 草 母 梗 子 連 棗 志 茯 芪 歸 朮 蔘
仁 苓

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

甲狀腺炎

● 복용 용법·용량

水煎 1日 2첩 3回 食後 30分 溫服

● 주의 사항

감기몸살 등 表熱이 있을 때는 복용하지 않는다.

加味苓香湯

升 甘 桔 陳 香 荊 白
麻 草 梗 皮 附 芥 茯
子 苓

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

4
錢

● 주치 및 효능

甲狀腺 肥大症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

內分泌疾患 經驗方1

甘 草	大 腹 皮	柴 胡	青 皮	桔 梗	枳 殼	麥 門 冬	薑 黃	肉 桂	川 芎	大 薊	玄 蔘	夏 枯 草	香 附 子	人 蔘	蓮 子 肉	柏 子 仁	白 茯 神
各 5 分		各 1 錢									各 1.5 錢						2 錢

● 주치 및 효능

甲狀腺肥大

● 복용 용법·용량

水煎 1日 3回 食前 30分 溫服

● 주의 사항

1제 服用 後 心悸 面熱은 없어짐. 3제부터 加 白芥子, 南星 各 5分하여 4제 服用 後 甲狀腺肥大도 消失되었다.

2. 비만증

加味調胃升清湯

龍 眼 肉	酸 棗 仁	天 門 冬	麥 門 冬	女 貞 實	黃 精	續 斷	桑 枝	遠 志	石 菖 蒲	五 味 子	桔 梗	麻 黃	萊 菔 子	乾 栗	薏 苡 仁
各 1 錢													1.5 錢	各 3 錢	

● 주치 및 효능

太陰人 肥滿 諸症狀

● 복용 용법·용량

1日 2첩 3回 食前 30分 溫服

● 주의 사항

太陰人 辨別要望

或加 葛根 蓮子肉 大黃

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

300名 以上 中 約 70% 前後 好轉

①蒼朮白虎湯(治善食而肥)/②加味二陳湯(食不甘而反肥 氣短身重)

① 粳 甘 知 石 蒼
米 草 母 膏 朮

半 1 2 4 5
合 錢 錢 錢 錢

② 麥 神 山 或 甘 陳 赤 半 香 蒼
芽 麴 查 加) 草 皮 茯 夏 附 朮
肉 川 芎

各 各 各 5
1 2 3 錢
錢 錢 錢

● 주치 및 효능

肥胖病

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

3. 당뇨병

加味四物湯

五 麥 人 熟 白 川 當 天
味 門 蔘 地 芍 芎 歸 花
子 冬 黃 藥 粉
各 各 8
2 2.5 兩
兩

● 주치 및 효능

糖尿(上消)

●복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味地黃湯

烏梅	天花粉	蓮子	五味子	土茯苓	枸杞子	桂枝	玄蔘	麥門冬	黃芩	地骨皮	黃芪	人蔘	白茯苓	澤瀉	牡丹皮	山茱萸	山藥	熟地黃
1 個	各 1 錢												各 2 錢				各 3 錢	4 錢

●주치 및 효능

糖尿病

●복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

加味 丹蔘, 黃精 各 1錢, 桑椹子 5分

加味地黃湯

五味子	黃柏	知母	澤瀉	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃	土天花粉
各 2 兩			各 3 兩			各 4 兩		各 8 兩	

●주치 및 효능

糖尿(下消煩燥引飲 耳輪焦枯 小便如膏)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯

[illegible]

- 주치 및 효능
糖尿病
- 복용 용법·용량
1日 3回 水煎 空心服. 3제 복용 요망
- 주의 사항

糖尿病 經驗方1

[illegible]

- 주치 및 효능
糖尿
- 복용 용법·용량
分作 20帖. 一日 三回 食間服
- 주의 사항
식사금기 - 鷄, 豚肉, 酒 禁忌, 粉食, 무우

糖尿病 經驗方2

女貞實 各2兩	芡仁	五味子	枸杞子 各2.5兩	蓮子肉	山藥	淫羊藿	肉蓯蓉	山茱萸	覆盆子	何首烏	鎖陽	黃精	免絲子	杜冲	熟地黃	巴戟
------------	----	-----	--------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----

甘 蛇 附 五 鹿 人 破
草 床 子 加 茸 蔘 古
子 皮 紙

1.2
兩 各
2
兩

● 주치 및 효능

糖尿 및 精力不足

● 복용 용법·용량

分作 20帖. 水煎 1日 3回 空心服

● 주의 사항

금식: 돼지고기, 닭고기, 밀가루음식, 녹두음식, 무우

血糖定丸

五 山 白 牧 山 澤 熟 蜈 紫 蓮 白 肉 巴 當 黃 枸 麥 天 葛
味 茱 茯 丹 藥 瀉 地 蚣 何 肉 殭 苳 歸 精 杞 門 花 根
子 萸 苓 皮 黃 車 蠶 車 蠶 蠶 子 冬 粉 根
1 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各
錢 1.5 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢 2 錢

免 車 覆
絲 前 盆
子 子 子
各 1
錢

● 주치 및 효능

糖尿(下消)

● 복용 용법·용량

丸藥을 만들어 복용(梧子大)

加味地黃湯

五 味 子	土 茯 苓	天 門 冬	白 茯 苓	牧 丹 皮	蓮 子 肉	山 茱 萸	山 藥	天 花 粉	葛 根	熟 地 黃
各 1 錢			各 1.5 錢		2.5 錢	各 3 錢				4 錢

● 주치 및 효능

糖尿病(消渴)

● 복용 용법·용량

水煎 1日 3回 空心服

● 주의 사항

식사금기 : 鷄, 猪, 酒, 麵

中消 去 熟地黃, 加 白朮 4錢, 消化不良 加 神麴, 貢砂仁 各 1錢

加減六味地黃湯

牧 丹	茯 苓	山 茱 萸	山 藥	益 智 仁	烏 藥	熟 地 黃
各 1.5 錢		各 2 錢		各 3 錢		3.8 錢

● 주치 및 효능

夜尿症, 多尿, 糖尿, 小便頻數

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯

1次藥

甘 瓜 天 黃 知 牧 五 白 澤 山 山 熟 白 當
 草 蓴 花 柏 母 丹 味 茯 瀉 茱 藥 地 芍 歸
 仁 粉 皮 子 莢

各
1
錢

2次藥

山 山 白 元 白 枸 灸 黃 鹿 人
 茱 藥 豆 砂 茯 杞 甘 芪 茸 蔘
 莢 蔻 仁 苓 子 草 灸
 炒

各
等
分

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

1次藥-2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

2次藥-蜜丸靈神丸大로 作丸하여 1日 3回 매회 2~3丸씩 3개월간 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯1

羌活 烏藥 女貞實 當歸 天花粉 玄蔘 沙蔘 鎖陽 麥門冬 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 海棠花根 蓮子肉 白朮 山茱萸 山藥 蒼朮 熟地黃

酒炒

黃土炒

炒

各1錢

各1.5錢

各3錢

各4錢

甘草 肉桂 白朮 木瓜 獨活 蠶

各5分

各8分

1錢

●주치 및 효능

消渴病 諸症(多渴 四肢痛 疲勞 高血壓 血液循環障礙 및 神經性疾患)

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전, 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

四肢麻痺, 屈伸困難, 觸寒觸熱이면 전신통증 및 糖의 수치가 고저로 급변 하기도 하고 혈압이 상승하며 시각각각이 둔화되기도 한다.

加味地黃湯2

澤 瀉	牧 丹	白 茯 苓	山 藥	山 茱 萸	熟 地 黃	漏 蘆
各 1.5 錢			各 2 錢		4 錢	5 錢

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

民間仙方

魯 香 海
豆 蕒 帶

3.25 7.5
兩 兩

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

海帶(다시마)를 소금기를 제거한 후 잘라 말리고, 香蕒(표고버섯)은 썬 그늘에 말리고, 魯豆(서목테)는 씻은 후 말린다. 이상을 爲末하여 糯米糊和丸하되, 梧子大로 한다. 食前 40~50丸 服用. 30일후면 눈에 띄게 糖의 수치도 확실하게 떨어지고 활력이 넘치게 된다. 꾸준히 지속적으로 복용하여야 한다.

● 주의 사항

一般 糖尿病 禁忌食은 그대로 지킨다.

加味六味湯

澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯 苓	麥 門 冬	天 花 粉	葛 根	山 茱 萸	山 藥	玄 蔘	熟 地 黃
各 1.5 錢			各 2 錢					3 錢	4 錢

- 주치 및 효능
糖尿病
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯3

天 花 粉	澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯 苓	山 茱 萸	山 藥	石 膏	葛 根	熟 地 黃
1 錢	各 1.5 錢			各 2 錢			3 錢	4 錢

- 주치 및 효능
消渴病
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.
발병 1년 미만자 2~3제, 2년 이상자는 5제
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味升麻白朮湯

甘 草	川 芎	天 花 粉	茯 苓	巴 戟 天	山 茱 萸	生 地 黃	麥 門 冬	人 蔘	蓮 子 肉	當 歸	白 芍 藥	升 麻	葛 根	白 朮	山 藥
5 分	各 1 錢						各 1.5 錢						2 錢	各 3 錢	

● 주치 및 효능

糖尿病 初期

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

千金文武湯

白 芷	升 麻	桔 梗	五 味 子	麥 門 冬	柏 子 仁	山 藥	藁 本	黃 芩	葛 根
各 1 錢						各 2 錢			4 錢

● 주치 및 효능

消渴病

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

地黃苦蔘湯

黃 柏	知 母	玄 蔘	五 味 子	澤 瀉	白 茯 苓	葛 根	山 茱 萸	山 藥	苦 蔘	熟 地 黃
各 1 錢				各 1.5 錢		各 2 錢				4 錢

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

精力不足 小便不利 加 益智仁炒研 2錢

葛根當歸湯

烏 梅	甘 草	當 歸	川 芎	天 門 冬	香 附 子	五 味 子	竹 茹	山 茱 萸	天 花 粉	蓮 子 肉	知 母	麥 門 冬	木 瓜	熟 地 黃	白 芍 藥	葛 根
3 個	5 分	1 錢	各 1.5 錢													3 錢

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味六味地黃丸

乾 薑	肉 桂	白 朮	砂 仁	防 風	白 扁 豆	天 花 粉	麥 門 冬	天 門 冬	澤 瀉	牧 丹 皮	白 茯苓	葛 根	五 味 子	黃 連	白 殭 蠶	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
各 1 錢				各 2 錢					各 3 錢			各 4 錢						8 錢

● 주치 및 효능

消渴病

● 복용 용법·용량

爲末하여 牛膽汁 및 神麴과 糊化丸하되, 梧子大로 한다..

1일 3회. 매 30~50丸씩 식 전 1시간에 복용

● 주의 사항

隨症하여 或 加 蓮子肉, 知母, 黃柏

加味十二味地黃湯

車 前 子	地 骨 皮	防 風	荊 芥	獨 活	羌 活	牧 丹 皮	知 母	天 花 粉	玄 蔘	澤 瀉	白 茯苓	山 茱萸	熟 地黃
各 1 錢							各 2 錢						4 錢

● 주치 및 효능

少陽人 消渴症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味淸心蓮子飲

五 味 子	甘 菊 花	黃 芩	厚 朴	遠 志	芡 仁	栢 子 仁	桔 梗	麥 門 冬	天 門 冬	蘿 菔 子	山 藥	蓮 子 肉	玄 蔘	天 花 粉
各 1 錢										各 2 錢				3 錢

● 주치 및 효능

太陰人 消渴症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

眞陰蓮子湯

糯米	大棗	生薑	黃柏	五味子	甘草	天花粉	枸杞子	知母	澤瀉	葛根	白朮	人參	山藥	陳皮	麥門冬	當歸	白芍藥	熟地黃	黃芪	蓮子肉
2匙	2枚	3片	各5分		各8分						各1錢					各1.5錢				2錢

●주치 및 효능

糖尿病(面白 額廣 眉盛 心熱 肺虛白汗 口乾渴 或 不渴 等症으로 血糖 150 ~ 200cc로 久病者)

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味八珍湯

棗	薑	艾葉	蒲公英	甘草	茵陳蒿	苦參	川芎	陳皮	白芍藥	當歸	五味子	澤瀉	白茯苓	黃芪	人參	麥門冬	白朮	熟地黃
2個	3片	各2分		各5分							各8分				各1錢			2錢

●주치 및 효능

糖尿病

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

●활투

渴症 加 茵陳蒿, 決明子, 益智仁 各 1錢

附記 : 虎杖根 煎服하면 유효하다.(朴泰二)

雙補丸

澤瀉	沈香	藿香	黃芪	當歸	木瓜	石斛	五味子	覆盆子	菟絲子	肉苁蓉	熟地黃	薏苡仁	白茯苓	人蔘	鹿角膠
			蜜炙									炒			

各5分	各1錢
-----	-----

- 주치 및 효능
腎水枯渴性 消渴病
- 복용 용법·용량
爲末 蜜丸 梧子大 朱砂 爲衣. 每 50丸 空心服 棗湯下
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿藦

人蔘茯苓散

砂仁	梔子	天花粉	桔梗	澤瀉	白朮	人蔘	連翹	大黃	黃芩	薄荷	葛根	赤茯苓	甘草	滑石	寒水石
各2分							3分	各5分					8分	各1.5錢	

- 주치 및 효능
消渴病 小便如膏者
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

糖尿丸

人 蔘	蓮 子 肉	白 朮	白 僵 蠶	酸 棗 仁	山 藥	天 花 粉	當 歸	麥 門 冬	五 味 子	白 茯 苓	黑 豆
各 7.5 錢					各 11.3 兩		各 15 兩				50 兩

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

爲末 牛膽汁 10個로 拌均하여 梧子大 作丸한다.

1料는 一劑量. 1日 3回, 매 50~80丸씩 복용한다.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味腎氣丸

槲 實	蓮 子 肉	梔 子	菟 絲 子	葛 根	香 附 子	烏 藥	五 加 皮	白 芥 子	牧 丹 皮	山 茱 萸	山 藥	生 地 黃	陳 皮	白 茯 苓	白 芍 藥	當 歸
各 1 兩																

● 주치 및 효능

糖尿病

● 복용 용법·용량

1料는 一劑量. 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

治糖丸

黃 連	甘 菊 花	五 味 子	蓮 子 肉	石 斛	車 前 子	天 花 粉	麥 門 冬	玄 蔘	熟 地 黃
各 1 兩		各 1.5 兩		各 2 兩		各 3 兩		各 5 兩	

●주치 및 효능

糖尿病

●복용 용법·용량

爲末 蜜丸 梧子大.

1일 3회, 食間 溫水服. 초기 20丸, 최종 60丸

●주의 사항

부작용없이 장복가능, 당뇨병 초기 호전 이후에 반년 이상 복용

제10장 비뇨생식계 질환

1. 비뇨계질환

加味蓼苳湯

甘 草	肉 桂	升 麻	益 智 仁	破 古 紙	杜 冲	陳 皮	白 朮	熟 地 黃	當 歸	白 茯苓	黃 芪	人 參	韭 子
			炒 研										炒

各
4
分

8
分

各
1
錢

3
錢

● 주치 및 효능

小兒遺尿(夜間寢宿時 不知中遺尿)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味補腎湯

貢 砂 仁	牡 蠣 粉	龍 骨	益 智 仁	烏 藥	鷄 內 金	五 味 子	家 韭 子	枸 杞 子	白 茯苓	牧 丹 皮	金 櫻 子	山 茱 萸	生 山 藥	熟 地 黃
7 分	各 1 錢							各 1.5 錢				各 2 錢	4 錢	

● 주치 및 효능

遺尿 小兒夜尿 小便不禁

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味蓼莪湯

柴 胡	附 子	甘 草	肉 桂	升 麻	陳 皮	白 朮	五 味 子	熟 地 黃	雞 內 金	當 歸	茯 苓	黃 芪	人 蔘	山 藥	益 智 仁	烏 藥
各 1.7 兩		各 2 兩			各 2.5 兩							各 3.7 兩		各 5 兩		

● 주치 및 효능

女子小便 數(요실금)

● 복용 용법·용량

1料는 一劑量. 2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

泌尿系疾患 經驗方1

砂 仁	陳 皮	蓮 子	赤 茯苓	黃 芪	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸
各 1 錢		各 2 錢			各 3 錢			

● 주치 및 효능

老虛人 小便不通 是氣血虛也

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味六味元

牡 蠣	龍 骨	元 肉	烏 藥	升 麻	黃 芪	肉 桂	遠 志	酸 棗 仁	牧 丹 皮	白 茯苓	山 茱 萸	益 智 仁	熟 地 黃
各 1 錢									各 1.5 錢		各 2 錢		4 錢

● 주치 및 효능

少陽人 夜尿症(大小人共用)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

泌尿器疾患 經驗方2

薑 三 棗 二	山 茱 萸	烏 梅	花 椒	甘 草	草 果	人 蔘	神 麴	藿 香	赤 茯 苓	半 夏	厚 朴	陳 皮	蒼 朮	山 查 肉
------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------

留
核

法
製

1 2 5
兩 枚 分

各
1
錢

各
1.2
錢

1.5 2
錢 錢

● 주치 및 효능

夜尿症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味蔘芪湯

大 棗	生 薑	益 智 仁	升 麻	肉 桂	黃 芪	熟 地 黃	白 芍 藥	當 歸	山 藥	陳 皮	甘 草	白 茯 苓	白 朮	白 蔘
--------	--------	-------------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------

蜜
灸

炒

炒

2 3 8
枚 片 分

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

遺尿症(小兒)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

3제이상.

● 주의 사항

鷄內金 炒末 매 5분씩(1일 2회 30~60일 服可)

禁食 : 돼지고기, 닭고기, 술, 담배, 사탕(설탕)

주의 : 밤시간에 수분섭취를 적게 할 것. 밤시간에 몇 차례 잠을 깨워서 소변을 보도록 할 것(교감신경 전달이 정상일지라도) 소아들의 숙면관계로(피곤하게 놀았으므로) 잠을 깨우지 못하고 유뇨하게 됨

加減地黃湯

鹿茸	官桂	桑螵蛸	家韭子	益智仁	人參	烏藥	破故紙	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃
1錢	5分	各1錢								各1.5錢		各3錢

● 주치 및 효능

小兒遺尿

● 복용 용법·용량

4~5세 5첩, 10여세 10첩 必效

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 무우

分清飲

紫草	益智仁	牡丹皮	通草	大腹皮	枳殼	厚朴	蒼朮	車前葉	赤茯苓	澤瀉	白茅根	玄蔘	冬葵子	地膚子
各1錢											各2錢			3錢

● 주치 및 효능

尿血

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 30분 溫服

●주의 사항

冬葵子 換 草決明, 車前葉 換 車前子

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味五苓散

肉	猪	白	赤	澤	玉
桂	苓	朮	茯	瀉	蜀
			苓		黍
					穗
5	各			2.5	5
分	1.5			錢	錢
	錢				

●주치 및 효능

急性腎臟炎

●복용 용법·용량

1日 3첩 3回 食前 2時間 溫服

●주의 사항

蔓荊子和 大棗肉을 각 5g씩 고루 섞은 후 찧어서 湧泉穴에 붙이면 효과 좋다.

加味厚朴湯

甘	桂	赤	澤	猪	桑	大	枳	厚
草	心	茯	瀉	苓	白	黃	實	朴
		苓			皮			
各		各				各		5
5		1				2		錢
分		錢				錢		

●주치 및 효능

慢性腎臟炎 浮腫脹滿

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

蘇葉 人蔘 青皮 黃芪 當歸 川芎 官桂 厚朴 白芷 防風 烏藥 檳榔 白芍 枳殼 木香 甘草 桔梗

各5分

各1錢

1.2 錢

● 주치 및 효능

腎癰

● 복용 용법·용량

水煎 1日 2回 食間 溫服

● 주의 사항

寶豆末 4g과 九煎紅靈砂 2g을 균등히 섞어 5봉지로 만들고, 위의 약 복용시에 함께 복용하며 효과 좋다.

菟絲子 何首烏 白茯苓 枸杞子 柏子仁 人蔘 黃芪 山藥 山茱萸 乾薑 附子 肉桂 白朮 橘皮 砂仁 竹茹 甘草

各5分

各1錢

各
1.5
錢

各2錢

● 주치 및 효능

腎症候群

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

• **부양 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

甘草 燈心 當歸 香附子 車前子 薏苡仁 虎杖根 澤瀉 金銀花 枳殼 木通

各1錢

各2錢

● 주치 및 효능

腎臟炎/ 腎臟 膀胱結石 盲腸炎症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大分清飲加味方

甘 草	車 前 子	桃 仁	白 朮	梔 子	黃 柏	猪 苓	澤 瀉	地 膚 子	陳 皮	木 通	赤 茯 苓
5 分	各 1 錢							各 2 錢			3 錢

● 주치 및 효능

膀胱炎, 尿道炎, 小便不利, 腎臟結石

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味五苓散

山 梔 子	肉 桂	車 前 子	小 茴 香	木 通	草 龍 膽	猪 苓	白 朮	赤 茯 苓	澤 瀉	瞿 麥	王 不 留 行	滑 石
-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	--------	-------------	--------	--------	------------------	--------

炒

各 5 分	各 1 錢	各 1.5 錢		2.5 錢	各 3 錢	5 錢
-------------	-------------	---------------	--	----------	-------------	--------

● 주치 및 효능

急性膀胱炎, 尿道澀痛, 小便不利

- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
6첩 이내에 小便自利하고 尿道澀痛이 호전된다.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
수십명 치료 경험 중 6첩이내에 80%는 치료되었음.

黃芩猪苓湯

甘 香 滑 砂 陳 厚 紅 五 大 杏 白 香 白 石 雷 木 虎 澤 猪 金 黃
草 附 石 仁 皮 朴 花 靈 黃 仁 扁 薹 茯 菖 丸 通 杖 瀉 苓 銀 芩
子 脂 豆 苓 蒲 碎 根 花
炒

各
1
錢

各
2
錢

各
5
錢

- 주치 및 효능
膀胱癌
- 복용 용법·용량
水煎 1日 3回 空心服用
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

增味五苓散

燈 甘 車 桂 虎 赤 白 白 澤 鹿
心 草 前 皮 杖 茯 朮 茅 瀉 角
子 根 苓 根 膠
8 1 各 各 各
分 錢 1.5 2 3
錢 錢 錢 錢 錢

- 주치 및 효능
急慢性 淋疾 尿道炎/ 前立腺肥大症 萎縮腎 等

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味地黃湯4

肉桂	白朮	白茯苓	牡丹皮	猪苓	地膚子	山茱萸	山藥	澤瀉	熟地黃	魚腥草
各1錢				各1.5錢				各3錢		5錢

●주치 및 효능

前立腺炎으로 因한 小便不利

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味六味地黃湯1

玄蔘	車前子	牛膝	澤瀉	白茯苓	牡丹皮	山藥	山茱萸	熟地黃
各1錢			各1.5錢			各2錢		4錢

●주치 및 효능

前立腺炎(小便不利)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~10첩으로 治療된다.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

●활투

重症이면 增加 牛膝, 車前子, 玄蔘 各 5錢

加味八味元

鹿茸	薏苡仁	山豆根	附子	肉桂	澤瀉	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃
各5分			各1錢		各1.5錢			各2錢		

● 주치 및 효능

前立腺炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 환투

膿血 尿血時 加 阿膠珠, 地榆草, 槐花炒, 梔子炒黑, 樗根白皮蜜炒 各 1錢

※別方 - 前立腺炎으로 血尿시

樗根 阿膠珠 赤茯苓 豬苓 澤瀉 滑石
蜜炒

各1錢 各2錢 3錢 5錢

無間胡葵湯

甘草	生地黃	白葵根	胡葵	杏仁	枳殼	瞿麥	澤瀉	玄蔘	牛膝	石葦	車前子	冬葵子	滑石
各8分								各1.2錢			各1.5錢		2錢

● 주치 및 효능

前立腺 肥大症 / 尿意頻數 淋瀝 小腹不快 痛症 疲勞 神經症 羸瘦

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

八正蟠葱散

車 前 子	梔 子	燈 心	海 金 沙	滑 石	篇 蓄	木 通	大 黃	瞿 麥	甘 草	蒼 朮
各 1 錢										

乾 薑	官 桂	玄 胡 索	檳 榔	丁 香 皮	砂 仁	青 皮	白 茯苓	蓬 朮	三 稜	琥 珀
各 3 分			各 5 分			各 7 分				

●주치 및 효능

腎結石

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減五積散

甘 草	桂 皮	半 夏	白 芷	川 芎	玄 胡 索	厚 朴	陳 皮	滑 石	大 黃	阿 膠 珠	蒼 朮	當 歸	茯 苓	山 茱 萸	澤 瀉	白 芍 藥	金 銀 花
各 8 分								各 2 錢					各 3 錢			各 5 錢	

●주치 및 효능

腎臟結石/ 腎臟部位 腹脹 發熱疼痛 便秘等

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●참고

·一方 : 五積散 去 麻黃하고 加 金銀花, 連翹 各2錢, 山查肉, 玄胡索 各 1錢, 木香, 桃仁, 紅花 各 5分하여 膀胱結石症 치료방으로 쓴다.

加味蟠葱散

葱 白	乾 薑	官 桂	玄 胡 索	檳 榔	丁 香 皮	砂 仁	青 皮	白 茯 苓	蓬 朮	三 稜	甘 草	蒼 朮	白 朮	當 歸	小 茴 香	沙 蔞
1 莖	各 2 分			各 5 分			各 8 分				各 1 錢		各 2 錢		各 3 錢	

●주치 및 효능

腎結石 腎盂炎 膀胱結石/ 膽囊炎, 膽結石

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

蟠葱散證의 腎氣作痛 膀胱痛과 脾胃虛冷, 心腹刺痛 등증을 참고하고 隨症하여 藥量 增하여도 可함

加味芍藥甘草湯

黃 柏	茴 香	木 通	阿 膠 珠	猪 苓	澤 瀉	滑 石	甘 草	白 茯 苓	白 芍 藥
8 分	各 1 錢			各 1.5 錢			各 2 錢		4 錢

●주치 및 효능

腎 膀胱 結石症

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

本草院二神散

滑石粉末	海金砂	石韋	木香	當歸尾	王不留行	車前子	麥門冬	木通
1錢	2錢	各7.5分			1.5錢	各2.5錢		

●주치 및 효능

腎 膀胱 結石 및 石淋

●복용 용법·용량

海金沙와 滑石은 탕전 후 첨가. 1日 2첩 朝夕 空心服

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味地黃湯2

紅花	黃柏	蓬朮	三稜	甘草	燈心	滑石	車前子	虎杖根	蕭藆	瞿麥	澤瀉	牡丹皮	牛膝	白朮	山藥	白茯苓	熟地黃
各5分				各1錢							各1.5錢				各2錢		

●주치 및 효능

腎結石-右側腰脇痛 下腹痛 小便難澁 惡心

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

金石五苓散

肉桂	猪苓	白朮	赤茯苓	牛膝	冬葵子	石韋	滑石	鷄內金	金錢草	海金沙	澤瀉
5分	各1.5錢			各2錢							2.5錢

●주치 및 효능

尿路結石(小結石 3첩 得效)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

虛冷者는 加 人蔘, 附子炮, 乾薑 各 1錢

增味導赤散

生薑	竹葉	甘草	赤芍藥	川芎	梔子	車前子	黃芩	木通	生乾地黃
3片	10枚	各1錢							

●주치 및 효능

腎臟(尿路)結石

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

●참고

增味導赤散은 血淋藥이나 腎臟結石을 禹功散(方藥合編 下 82)과 交代服用으로 완치하였고 導赤散만으로 尿路結石을 治療하였다.

加味地黃湯3

篇蓄	瞿麥	木通	滑石	海金沙	車前子	牛膝	澤瀉	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	熟地黃
各 1.5 錢										各 2 錢		4 錢

● 주치 및 효능

尿路結石症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

滑石散

木通	蜀葵子	瞿麥	石韋	石膏	滑石
各 3 錢				各 5 錢	

● 주치 및 효능

腎結石 輸尿管結石

● 복용 용법·용량

爲末. 1회에 8g을 葱白 2莖, 燈心 1團 煎水에 蜜 2匙를 섞은 물로 服用한다. 또는 湯제로 煎服하여도 좋다.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

2. 유방질환

加味逍遙散

薄 荷	麥 門 冬	金 銀 花	續 斷	青 皮	玄 胡 索	紅 花	桃 仁	梔 子	甘 草	柴 胡	當 歸	白 茯 苓	白 芍 藥	白 朮
	7 分	各 1 錢												

●주치 및 효능

婦人經度時 乳房腫痛

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味芷貝湯

甘 草	瓜 薤 仁	當 歸 尾	皂 角 刺	貝 母	穿 山 甲	天 花 粉	白 芷	木 瓜	澤 蘭	蒲 公 英	金 銀 花
	各 1 錢				1.5 錢	2 錢	各 3 錢				

●주치 및 효능

乳腫

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味化癌湯

白朮	黃芪	忍冬藤	當歸	茜根	白芥子	白茯苓	白何首烏	人蔘	柴胡	沒藥
1兩			各5錢					各1錢		5分

- 주치 및 효능
乳岩
- 복용 용법 · 용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용
2제 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四物湯加味方

當歸 川芎 白芍藥 乾地黃 石膏 滑石 各2錢

- 주치 및 효능
乳腫痛
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

乳房疾患 經驗方1

金	玄	蒲	牛	天
銀	蔘	公	蒴	花
花		英	子	粉
3	各			4
錢	2			錢
	錢			

● 주치 및 효능

乳腫

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~4첩 복용하면 효과보임.,

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

乳房疾患 經驗方2

丹	沒	乳	白	天	生
蔘	藥	香	芍	花	乾
			藥	粉	地
					黃
各			3	各	
2			錢	5	
錢				錢	

● 주치 및 효능

乳腫慢性潰瘍 又は 乳癌症狀으로 乳頭 沒落, 穿孔乳汁自出者, 外科
治療 不能者

● 복용 용법·용량

1日 2첩 每 食遠微溫服. 3제 연복하면 효과 나타남.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味蟠葱散

乾 薑	官 桂	玄 胡 索	檳 榔	丁 香 皮	砂 仁	青 皮	白 茯 苓	蓬 朮	三 稜	柴 胡	甘 草	蒼 朮
各 6 分			各 1 錢			各 1.4 錢				各 2 錢		

- 주치 및 효능
乳頭龜裂症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

3. 婦人門 月經 崩漏 帶下

加味通經湯

元 肉	紅 花	桃 仁	甘 草	枳 實	黃 芩	香 附 子	荊 芥	地 榆	杜 冲	續 斷	玄 胡 索	山 查 肉	厚 朴	陳 皮	蒼 朮	川 芎	當 歸	白 芍 藥	熟 地 黃
各 5 分			各 8 分					各 1 錢								各 2 錢			

- 주치 및 효능
月經痛, 月經不順, 經來時 腰腹痛
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

活血湯

清	蓬	三	牧	玄	沒	桂	大	紅	蘇	赤	白	當
酒	朮	稜	丹	胡	藥	皮	黃	花	木	芍	芍	歸
			皮	索						藥	藥	尾
3	各											4
匙	1											錢
	錢											

● 주치 및 효능

月經痛

● 복용 용법·용량

水煎 1日 3回 食間 溫服

● 주의 사항

淸酒는 약복용 때 약에 넣어서 복용하면 됨

加味四物湯

鬼	玄	紅	熟	白	沒	川	當
箭	胡	花	地	芍	藥	芎	歸
羽	索		黃	藥			
各					2	各	
1					錢	2.5	
錢						錢	

● 주치 및 효능

婦人月經不調 經腹痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加減調經湯

甘 草	紅 花	肉 桂	玄 胡 索	赤 芍 藥	木 香	乾 薑	茴 香	山 查 肉	牧 丹 皮	川 芎	熟 地 黃	烏 藥	白 朮	陳 皮	白 芍 藥	當 歸	香 附 子 童 便 炒 或 炒	龍 眼 肉
各 5 分				各 1 錢							各 1.5 錢						各 2 錢	

● 주치 및 효능

月經痛, 冷腹痛, 月經過多症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

小便不利 加 澤瀉, 薏苡仁 各 1錢. 腰痛 加 續斷炒 1錢

月經色紫黑則 加 黃芩, 黃連 8分

加味調血湯

玄 胡 索	牧 丹 皮	蘇 木	紅 花	桃 仁	蓬 朮	三 稜 子	香 附 子	黃 連	生 乾 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸
-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	-------------	--------	------------------	-------------	--------	--------

各
1
錢

● 주치 및 효능

婦人行經腹痛症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

吳茱萸湯

紅 花	白 芷	桃 仁	青 皮	枳 殼	當 歸	柴 胡	吳 茱 萸
各 1 錢					各 1.5 錢		2 錢

● 주치 및 효능

經來 腰痛刺痛

● 복용 용법·용량

月經 중에 통증 심하면, 水煎 1日 2回 食間 溫服
다음 달에도 통증이 가시지 않으면, 1제가량 長服.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味通經湯

蘇 葉	木 香	五 靈 脂	玄 胡 索	紅 花	牧 丹 皮	桃 仁	蒲 黃	赤 芍 藥	當 歸	荊 芥	益 母 草

炒

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

月經不順 經來腹痛

● 복용 용법·용량

經來腹痛 1제 服用

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四物湯加味方

甘 草	杜 冲	木 瓜	牛 膝	玄 胡 索	茴 香	紅 花	蘇 木	桃 仁	牧 丹 皮	木 香	益 母 草	乾 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸	烏 藥	香 附 子
												各 2 錢					4 錢
各 1 錢																	

● 주치 및 효능

月經痛, 月經不順

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

附子理中湯

(1)

甘 草	吳 茱 萸	乾 薑	肉 桂	當 歸	白 朮	人 蔘	附 子
--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

除
毒
川
烏
代

各
1
錢

各
1.2
錢

月經不順 加 益母草 4g

(2)

厚 朴	陳 皮	當 歸	肉 桂	乾 薑	白 朮	人 蔘	附 子
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

川
烏
炮
代

各
1
錢

各
1.2
錢

(1) (2) 처방은 附子理中湯 앞에 다 있음.

●주치 및 효능

体冷女性 月經不順, 体冷 胃炎不消化 便滑

●주의 사항

附子를 川烏代는 丸으로 먹고 湯에 넣어서 끓이지 않음.

五積散加味方

蘇 木	生 薑	牧 丹	桃 仁	玄 胡	甘 草	桂 皮	半 夏	白 芷	當 歸	川 芎	茯 苓	白 芍	乾 薑	枳 殼	桔 梗	厚 朴	陳 皮	蒼 朮	香 附 子
各 1.2 兩	各 17 兩		2 兩	各 1.5 兩				各 2 兩										3 兩	3.7 兩

●주치 및 효능

月經腹痛 및 腰痛

●복용 용법·용량

一料는 一劑量. 湯제로 하여 1포에 120g씩 50포하여 1일 3회 空心服한다.

●주의 사항

요통에는 小茴香을 2.5兩을 加하고 생리통에 紅花 1.2兩을 加한다.

금하는 음식: 닭고기, 돼지고기, 술, 밀가루음식, 녹두음식

加味五積散

甘 草	桂 皮	半 夏	白 芷	川 芎	牧 丹	益 母 草	吳 茱 萸	小 茴 香	香 附 子	白 茯 苓	白 芍	乾 薑	當 歸	枳 殼	桔 梗	厚 朴	陳 皮	蒼 朮	
5 分	各 8 分							各 1 錢										1.2 錢	2 錢

●주치 및 효능

婦人科疾患. 月經不順, 子宮冷症, 下腹痛, 生理痛

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 따뜻하게 복용

●주의 사항

手足部 熱者 禁用, 腰痛 加 杜冲, 狗脊, 五加皮 各 1錢

加味調經湯

沒藥 紅花 蒲黃 桃仁 玄胡索 五靈脂 肉桂 白芷 牡丹皮 香附子 川芎 白芍藥 當歸

醋炒

5分 8分 各1錢

各1.5錢

各2錢 各3錢

●주치 및 효능

婦人及室女 月經不順

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

月經時 身溫及 安靜 必要

●활투

冷加 乾薑炒 1.5錢, 吳茱萸 1錢,

虛加 鹿茸, 甘草各 1錢

加味益胃升陽湯

生黃 柴胡 升麻 甘草 陳皮 當歸身 神麴 人蔘 黃芪 白朮 乾薑 地榆 荊芥

炒黑 炒黑 炒黑

各5分

各1錢

2錢 各2.5錢

●주치 및 효능

여성 자궁 출혈 및 생리후 출혈시

●복용 용법·용량

水煎 1日 3回 溫服

·시간 : 오전 10시 ~ 11시, 오후 3시 ~ 4시, 밤 9시 ~ 10시

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味升陽湯

蔓 荊 子	甘 草	黃 芩	升 麻	麥 門 冬	白 朮	阿 膠 珠	艾 葉	蒲 黃	神 麴	柴 胡	陳 皮	香 附 子	荊 芥	黃 芪	人 蔘	地 榆	當 歸
	炙							炒				炒	炒	蜜 灸			

3 分	各 5 分			各 1 錢									各 1.5 錢			2 錢	5 錢
--------	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--------	--------

● 주치 및 효능

崩漏

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

4첩만 煎服하면 久崩漏도 快愈함 (長時日間の 經度에도 特效)

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

溫經湯

甘 草	吳 茱 萸	川 芎 朮	芍 藥	麥 門 冬	阿 膠	當 歸	丹 皮	茯 苓	桂 枝	乾 薑	人 蔘
各 2 錢				各 3 錢							

● 주치 및 효능

治婦人帶下及小腹寒冷久不受胎或崩漏下血或經水過多

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方1

甘 草	藿 香	貢 砂 仁	艾 葉	益 母 草	元 肉	白 茯 苓	川 芎	當 歸	生 地 黃	香 附 子	阿 膠 珠	側 柏 葉	茜 根	地 榆
各 1 錢					各 1.5 錢				各 2 錢					

● 주치 및 효능

崩漏

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

升學大補湯

防 風	羌 活	黃 柏	黃 連	陳 皮	荊 芥	升 麻	甘 草	黃 芪	熟 地 黃	人 蔘	當 歸	白 朮
		炒	炒				炙					

各
5
分

1
錢

各
2
錢

2.5
錢

3
錢

● 주치 및 효능

老壯婦人下血無度子宮出血症

● 복용 용법·용량

空心服 1日 3回

● 주의 사항

冷飲食物禁忌

● 환투

口燥則加麥門冬, 五味子 各 一錢, 泄瀉則去黃柏加澤瀉, 蓮子肉 各 1錢,
有痰則加半夏 一錢, 白帶下則加半夏, 蒼朮 各 1錢

然惜紅煎

●처방의 출전

景岳全書 新方固陣 第四方

●처방 구성

(惜紅煎에 加味한 처방임)

烏 梅	甘 草	五 味 子	荊 芥	乾 薑	五 倍 子	川 芎	阿 膠 珠	蓮 子 肉	酸 棗 仁	黃 芪	當 歸 身	熟 地 黃	續 斷	鹿 角 膠	山 藥 炒	白 朮	白 芍 藥 炒	地 榆 炒
	灸	研	炒 黑	炒 黑	炒				炒 研				酒 炒					
2 個	各 8 分				各 1 錢			各 1.5 錢					各 2 錢					3 錢

●주치 및 효능

崩漏와 急慢性의 子宮出血 및 赤帶下

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

- 1) 破血作用이 있는 食醋와 熟地黃의 禁忌인 鷄, 마늘, 파 등을 금한다.
- 2) 止血될 때 까지 사용한다.

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方2

烏 梅	續 斷	甘 草	白 朮	荊 芥	地 榆 穗	山 藥
2 個	各 2 錢					

●주치 및 효능

下血 婦人出血

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方3

甘 吳 玄 阿 乾 棕 荊 人 川 黃 當
草 茱 胡 膠 薑 櫚 芥 蔘 芎 精 歸
莢 索 珠

灸

黑
炒

炭

黑
炒

蜜
灸

7 各
分 8
分

2 各
錢 3
錢

5
錢

● 주치 및 효능

崩漏出血症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

9첩 분량이면 유효

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減八味帶下方

大 芒 桃 牧 金 陳 木 茯 川 當 瓜 土
黃 硝 仁 丹 銀 皮 通 苓 芎 歸 藎 茯
皮 花

5 各
分 1
錢

各
15
錢

3
錢

● 주치 및 효능

黃, 白色帶下症, 慢性帶下症 및 化膿性帶下, 細菌性, 非細菌性 莫論,
子宮內膜炎 및 蟲垂炎, 下腹部疼痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

王 不 留 行	秦 朮	地 榆	乾 薑	黃 芪	人 蔘	黃 連	黃 芩	香 附 子	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸
各 1 錢									各 1.5 錢			

● 주치 및 효능

婦人子宮出血, 崩漏病

● 복용 용법·용량

一料는 一劑量. 1일 2회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용하되, 五靈脂炒末을 5分씩 청주에 타 함께 복용한다.

● 주의 사항

절대 안정 요함

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味四物湯

枳 殼	半 夏	山 藥	當 歸	川 芎	白 芍 藥	熟 地 黃
1 兩	3 兩	4 兩	各 5 兩			

● 주치 및 효능

帶下症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

四物湯加味方

荊 陳 地 阿 牧 玄 桃 續 熟 白 川 當 香
芥 皮 榆 膠 丹 胡 仁 斷 地 芍 芎 歸 附
皮 索 黃 藥 子

炒

5
分

各
1
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

崩漏(子宮出血不止)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味五積散

檳 木 甘 白 蓬 三 吳 破 小 白 乾 枳 桔 半 厚 陳 香 蒼
榔 香 草 芷 朮 稜 茱 古 茴 芍 薑 殼 梗 夏 朴 皮 附 朮
酒 酒
炒 炒
便 製

各
6
分

各
8
分

各
9
分

各
2
錢

● 주치 및 효능

惡性子宮炎, 分泌物過多, 子宮癌

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

10첩 ~ 20첩

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

腹痛下血者 加艾葉, 阿膠珠 各 1錢

炎症(冷)甚者 加 薏苡仁, 敗醬 各 3錢

加味四物湯

生 薑	甘 草	地 榆	乾 薑	荊 芥	艾 葉	黃 柏	知 母	黃 連	白 芍 藥	阿 膠 珠	黃 芩	乾 地 黃	川 芎	當 歸	香 附 子
			炒 黑	炒 黑	炒 黑										

3
片 各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

崩漏症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味升陽益胃湯

神 麴	人 蔘	熟 地 黃	牛 膽 南 星	石 菖 蒲	香 附 子	薄 荷	淡 竹 葉	乾 薑	地 榆	白 芍 藥	荊 芥	黃 芪	藿 香	酸 棗 仁
炒		炒 黑			炒			炒 黑	炒 黑	炒 黑	炒 黑			炒
各 7.5 分		各 8 分												各 1 錢

生 柴 升 甘 陳
黃 胡 麻 草 皮
芩

炙

2 各 各
分 3 5
分 分 分

● 주치 및 효능

神經衰弱, 氣血兩虛, 消化不良者의 月經不止(血色良好者),
平素 白帶下者(再生組織力不調者)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

胃酸過多, 潰瘍者 加 牡蠣粉 1錢

益胃升陽湯

黃 砂 甘 柴 升 陳 當 神 人 黃 白
芩 仁 草 胡 麻 皮 歸 麴 蔘 芪 朮

各 各 各 1.5 2.5
3 5 1 錢 錢
分 分 錢

● 주치 및 효능

崩漏

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

崩漏日久 倍 人蔘 或 加 熟地黃 乾薑 荊芥妙黑 地榆 之類 良好

地榆四物湯

麥 芽	神 麴	山 查	蒼 朮	阿 膠 珠	甘 草	荊 芥	乾 薑	白 朮	熟 地 黃	黃 芪	香 附 子	川 芎	當 歸	續 斷	山 藥	白 芍 藥	地 榆
						炙	炒 黑	炒 黑			炒			炒	炒	炒	炒

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

- 주치 및 효능
子宮의 機能性 出血(월경 후 지속적인 下血)
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
보통 3일분(6첩)을 투여하는데 보통 5첩 이후에 효과 발생
20명 정도의 진료와 90% 이상 치료효과 있음

清宮湯

大 棗	乾 薑	荊 芥	龍 骨	山 茱 萸	山 藥	白 茯 苓	沒 藥 苓	熟 地 黃	樗 根 白 皮	當 歸	白 芍 藥	側 柏 肉	龍 眼	甘 草	白 朮	艾 葉	阿 膠 珠	蓮 根	白 葵 花

炒 炒

四
個

各
5
分

各
1
錢

各
2
錢

- 주치 및 효능
子宮出血症, 子宮內膜炎, 白帶下症, 특히 弛緩性 子宮出血症
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

學元煎

甘 草	升 麻	烏 賊 骨	川 芎	香 附 子	附 子	肉 桂	砂 仁	白 茯 神	當 歸	人 蔘	山 藥	大 薊	黃 芪
5 分		各 1 錢					各 1.5 錢			各 2 錢		各 3 錢	

● 주치 및 효능

血漏·血崩(자궁출혈)

● 복용 용법·용량

식사 후 2~3시간에 차게 복용

● 주의 사항

上熱下寒으로 상체로 열이 많은 자는 黃芩 1錢을 加하며 너무 성질내고 화내지 말 것
주의

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

어떠한 체질을 불문하고 효과. 보통 3일에 치료된다.

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方4

紅 花	細 辛	蔓 荊 子	熟 地 黃	生 地 黃	川 芎	藁 本	甘 草	乾 葛	當 歸 身	柴 胡	獨 活	羌 活	防 風	升 麻	白 芍 藥
--------	--------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------

1 分	各 3 分		各 4 分		各 5 分		各 7 分								各 1 錢
--------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

香 附 子	白 葵 花	地 榆
炒		炒 黃

7 分	1 錢	2 錢
--------	--------	--------

● 주치 및 효능

婦人 崩漏症 日久하여 百藥이 無效한 症狀

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味五積散

甘 草	白 茯	防 風	荊 芥	桂 皮	半 夏	乾 薑	枳 殼	桔 梗	白 芷	白 芍	川 芎	當 歸	厚 朴	陳 皮	麻 黃	蟾 蜍	蒼 朮	金 銀 花
各 1 錢										藥						各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

婦人 月經不通, 五色帶下, 子宮內膜炎

● 복용 용법·용량

藥 2~3첩으로 효과 보임.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味秘元煎

甘 草	五 味 子	家 韭 子	蛇 床 子	黃 芪	小 茴 香	遠 志	杜 冲	白 朮	金 櫻 子	丹 蔘	山 棗 仁	芡 仁	山 藥	樗 根 白 皮	香 附 子
			炒 研			去 骨	炒 去 絲		去 核		炒	炒		蜜 炙	
5 分	7 分	各 1 錢											各 1.5 錢		

● 주치 및 효능

婦人 神經症-婦人憂思 過度勞役 或 半產不攝, 白淫流出 其臭如腐 心悲不樂

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 2시간 반에 복용.

40첩까지 연복한 후, 예후 살핌.

●주의 사항

酒, 猪肉, 과도한 勞役과 夫婦關係

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方5

白 茯 苓	白 芍 藥	乾 薑	當 歸	枳 殼	桔 梗	厚 朴	陳 皮	麻 黃	益 母 草	桃 仁	玄 胡 索	牧 丹 皮	枸 杞 子	吳 茱 萸	麻 黃	蒼 朮	山 查	香 附 子
																		炒 炒

各
8
分

各
1
錢

各
2
錢

●주치 및 효능

子宮이 冷한 諸證

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

●활투

熱證(體質) 加 黃柏 1錢, 車前子 1~2錢, 芡仁 2錢, 黃連, 黃芩 各 0.5錢

加味蟠葱散

甘 草	烏 藥	乾 薑	肉 桂	白 茯 苓	當 歸	小 茴 香	蒼 朮	山 查 肉	枸 杞 子	金 銀 花	沙 蔞	白 朮	薏 苡 仁	白 芍 藥
灸		炒										炒		炒

各
1.5
錢

各
2
錢

各
3
錢

唐 玄 檳 青 蓬 三 牧 麥 神 砂 香
木 胡 榔 皮 朮 稜 丹 芽 麴 仁 附
香 皮 子

5 各 各
分 8 1 1.5
分 錢 錢

● 주치 및 효능

下腹部의 광범위한 諸症狀, 不妊, 便秘, 腎盂炎, 慢性盲腸炎, 과민 성 대장염, 장무력
증, 생리불순, 생리통

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

● 활투

1) 不妊, 月經痛, 月經不順 加 吳茱萸 1錢, 益母草 4錢

(단, 자궁이 약한 사람은 하혈하는 수가 있음)

2) 便秘 加 大黃 1錢, 枳實, 川芎, 蘿菔子 1.5錢

3) 盲腸炎 脈遲 下腹部冷 加 蒲公英 3錢

4) 腎盂炎 초기발열, 腎臟部 熱(少腹痛時) 加 柴胡 3錢 黃芩 蓮子肉 各2錢, 地骨皮 麥門
冬 各1錢, 半夏 人蔘 各5分

5) 腎臟結石痛 발열시 4)의 加味와 더불어 滑石 3錢, 澤瀉 1.5錢, 猪苓 木通 燈心 各1錢

6) 慢性腎盂炎 및 結石에 열이 없으면 加 滑石 3錢, 澤瀉 1.5錢, 猪苓 木通 燈心 各1錢

7) 과민성 대장인 경우 合 麥苓白朮散

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方6

葱 薑 甘 桂 半 白 川 白 白 乾 當 枳 桔 厚 陳 玄 烏 山 蒼
草 皮 夏 芷 芎 茯 芍 薑 歸 殼 梗 朴 皮 胡 藥 查 朮
茶 藥 索 肉 研

2 3 6 各 各 各 各
本 片 分 7 8 1.5 2
分 分 錢 錢

- 주치 및 효능
子宮內膜炎(膿流下門)
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方7

半 夏	甘 草	黃 柏	龍 膽 草	大 黃	川 芎	桃 仁	牧 丹 皮	敗 醬	海 金 砂	貫 衆	鱉 甲	蓬 朮	牛 膝	木 通	玄 胡 索	白 茯 苓	虎 杖 根	當 歸
各 5 分					各 7 分			各 1 錢								各 2 錢		3 錢

- 주치 및 효능
子宮瘤 惡性子宮炎症
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方8

蓬 朮	三 稜	青 皮	陳 皮	良 薑	乾 薑	川 芎	當 歸	香 附 子
醋 炒	醋 炒							
各 5 分		各 1 錢					1.5 錢	

- 주치 및 효능
子宮內膜炎 子宮腫 冷濕 不妊 月經不調
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

白帶 加 吳茱萸, 丹蔘 各 1錢

有淋 加 虎杖根, 白鮮皮 各 1錢

不消 加 枳實, 玄胡索 各 1錢 極甚者

補血歸經湯

甘 草	阿 膠	續 斷	川 芎	山 茱 萸	白 芍 藥	荊 芥	白 朮	當 歸 身	地 榆	熟 地 黃
5 分	各 1 錢			各 1.5 錢			各 2.5 錢		各 5 錢	

● 주치 및 효능

婦人血氣虛弱 經血過多 或止更出 或三五日 止而更出者等

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

5~7첩 복용하면 止血되는 것을 확인할 수 있고, 그 이후에는 地榆 대신 人蔘 2錢을 가하여 10첩정도 복용한다.

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方9

荊 芥	阿 膠	柴 胡	白 朮	黃 芩	蒲 黃	白 芍 藥	當 歸
--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------

炒

各
1
錢

5 1
錢 兩

● 주치 및 효능

자궁기능성출혈

●복용 용법·용량

1일 2회 식후 1시간에 복용.

6~10첩 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味瀉濕湯

甘	梔	黃	柴	草	赤	木	車	生	當	澤	白	蛇
草	子	芩	胡	龍	茯	通	前	地	歸	瀉	朮	床
				膽	苓		子	黃			藜	子
							酒					
							炒					

5
分

各
7
分

各
1
錢

2
錢

3
錢

●주치 및 효능

男子下焦濕, 女子陰部瘙痒症

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味除濕湯

苦	柴	秦	梔	白	白	當
練	胡	芩	子	茯	芍	歸
根				苓	藥	
各				各		
5				1		
分				錢		

●주치 및 효능

肝臟濕熱 及 婦人陰戶痒痛

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

●활투

·외용으로 사용시 - 地骨皮, 蛇床子, 秦芩 各 3錢, 水煎 薰洗患處

婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方10

狼 蛇
牙 床
子
2 3
兩 兩

● 주치 및 효능

女子下疳瘡痒洗藥

● 복용 용법·용량

濃煎 1日數次 洗當處

● 환투

蛇床子 1兩, 荊芥 5錢, 白礬 5錢, 苦蔘 3錢. 以上藥을 濃煎洗當處 1日朝夕則 神效. 婦人帶下시 陰痒에도 濃煎洗當處면 痒症이 全消됨

當歸黃芪湯加味方

甘 遠 柴 升 靈 魚 白 白 當 人 黃
草 志 胡 麻 神 膠 芍 朮 歸 蔘 芪
草 藥

蜜
灸

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

婦人脫陰症

● 환투

脫肛에도 神效. 加地榆, 秦艽 各 1錢, 去人蔘

4. 불임증

蟠葱散

葱	乾	官	玄	檳	丁	砂	青	白	蓬	三	甘	蒼
白	薑	桂	胡	榔	香	仁	皮	茯	朮	稜	草	朮
			索		皮			苓				
1 莖	各 3 分			各 5 分			各 7 分				各 1 錢	

● 주치 및 효능

卵管障導로 인한 不孕, 乳頭破裂痛 等

● 복용 용법·용량

꼭 파가 들어가야 한다.

● 활투

卵管通過障導로 不孕時 加 當歸, 川芎, 白芍藥

膽管異狀時 疝痛時 加 小茴香, 沙蔘.

加味調經種玉湯

甘	菟	山	山	覆	阿	砂	陳	白	人	吳	白	川	當	熟	香	白
草	絲	茱	藥	盆	膠	仁	皮	朮	蔘	茱	芍	芎	歸	地	附	何
	子	萸		子	珠					萸	藥		身	黃	子	首
																烏
各 1 錢																各 1.5 錢

生	艾	官	乾	牧	玄
薑	葉	桂	薑	丹	胡
				皮	索
3片	各 5 分		各 8 分		

● 주치 및 효능

婦人無子 經不調 不妊症

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

1제-3제까지 복용하면 임신확율이 약 60% 가량 높아진다고 봄

● 주의 사항

妊娠成願 服藥中 勿爲交媾, 月經止后 交媾成孕也

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿菔根

임신하였을 경우 복약중지함

調經種玉湯

藥	官	乾	牧	玄	陳	白	白	川	吳	當	香	熟
艾	桂	薑	丹	胡	皮	茯	芍	芎	茺	歸	附	地
				索		苓	藥		莢	身	子	黃
各		各						各			各	
5		8						1			1.5	
分		分						錢			錢	

● 주치 및 효능

月經不調, 不妊, 下腹痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 1시간에 빈속으로 복용.

● 주의 사항

한 제를 지어서 월경기간만 복용하고 다음 월경시를 기다려 또 복용하되
만드시 월경이 있는 것을 확인하고 복용할 것

加減種玉湯

生	藥	官	乾	白	牧	玄	貢	陳	白	土	吳	當	香	熟
薑	艾	桂	薑	茯	丹	胡	砂	皮	芍	川	茺	歸	附	地
				苓	皮	索	仁		藥	芎	莢	身	子	黃
			炒							去	湯	酒	炒	薑
										油	炮	洗		炒
2	各		各						各				各	
片	7		9						1				1.5	
	分		分						錢				錢	

● 주치 및 효능

부인 불임증

● 복용 용법·용량

매월 생리 시작된 즉시 1일 두 첩 씹 끝날 때까지 연용. 3~6개월 연용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿菔根

加味補血催孕湯

香附子 炒
當歸
烏藥
白茯苓
藿香
元肉
玄胡索
吳茱萸
砂仁
白蘼
白芨
白附子
王不留行
甘草
或加乳香
沒藥

各7分

7 分

各1錢

各
1.5
錢

3
錢

- 주치 및 효능
부인 불임증
- 복용 용법·용량
1일 2, 3회. 오전 10시, 오후 3시, 밤 9시
매월 월경이 정상으로 있으며 불임자 혹은 월경불순자도 치료가 되며 임신이 가능함
- 활투
血虛者 丹蔘爲君 或 當歸爲君.
冷甚者 吳茱萸爲君.
腰痛 加 杜冲, 續斷
- 주의 사항
禁忌 - 술, 닭고기, 돼지고기 등

加味滯經湯

柴胡	丹蔘	人蔘	杜冲	牡丹皮	生棗仁	沙蔘	白芍藥	當歸	山藥	白朮	熟地黃
5分	各1錢				各1.5錢			各2.5錢			4錢

- 주치 및 효능
不妊症(女性多年間 不妊症. 나팔관 閉鎖 或은 排卵不振者)
- 복용 용법·용량
위 처방을 3제 연용함.
1제 탕전액을 45-50봉으로 하여 1일 2회씩 복용하고 1일 1회는 姪子丸(沈氏尊生方)을

梧子大 40丸씩 溫酒로 복용함.

나뉘어 복용함. 마지막에 娠子丸만 1일 2회 服用함

● 주의 사항

월경시에는 위 약을 중단하고 調經種玉湯을 1일 2회씩 복용토록한다.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿菔根

生棗仁은 볶아서는 안 된다.

● 활투

氣血虛弱者 加 鹿茸 1錢,

消化不良者 加 貢砂仁 五分

加味調經湯

棗	薑	紅	甘	艾	肉	乾	牧	玄	菟	山	益	丹	吳	陳	白	白	川	香	當	熟
花	草	葉	桂	薑	丹	胡	絲	茺	母	蔘	茺	皮	茯	苓	芍	芎	芩	附	歸	地
						皮	索	子	莢	草		莢		苓				子		黃
						炒													炒	

2 3 3 各
個 片 分 5
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

不妊 및 經度不順

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿菔根

加味四物湯

大	生	肉	乾	艾	半	厚	吳	益	牧	陳	白	白	香	川	白	當	熟
棗	薑	桂	薑	葉	夏	朴	茺	母	丹	皮	茯	朮	附	芎	芍	歸	地
							莢	草	皮		苓		子		藥		黃
																	炮

2 3 各
個 片 5
分

各
6
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

●주치 및 효능

냉증, 생리통, 불임증

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

然調經種玉湯

(‘調經種玉湯’의 重量을 일부 增量하고 加味된 처방임)

生 薑	艾 葉	肉 桂	乾 薑	牧 丹	陳 皮	白 茯苓	山 查	半 夏	砂 仁	丹 蔘	玄 胡	吳 茱萸	酸 棗仁	白 芍藥	菟 絲子	川 芎	當 歸身	熟 地黃	香 附
			炮					炒	薑 製	炒 研		湯 水 浸	炒 研		酒 製		酒 洗		童 便 浸 炒
3 錢	各 5 分		各 8 分					各 1 錢					各 1.5 錢						2 錢

●주치 및 효능

不妊症 / 婦人科 系統의 補强으로 月經을 정상화하고 排卵을 촉진시켜서 不妊을 治療함

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사후 2시간에 복용.

●주의 사항

- 1) 3종의 妊娠禁忌藥(牡丹, 半夏, 肉桂)이 들어 있으며, 婦人科系의 환경도 좋지 않으므로 약 복용 중에는 피임을 하여야함.
- 2) 熟地黃의 禁忌인 날 무우, 마늘, 파 등을 금함.
- 3) 건강이나 개인차에 따라서 다를 수 있으나 보통 출산 경력이 있을 경우 2제 내외, 출산경력이 없을 경우 3제 내외를 사용한다.

大溫經湯

甘草	附子	吳茱萸	肉桂	阿膠珠	益智仁	香附子	牡丹皮	半夏	人蔘	白芍藥	川芎	麥門冬	當歸身	丹蔘
灸	炮或代砂仁					便炒								
各5分				各1錢								各1.5錢		2錢

● 주치 및 효능

不妊症 (血虛한 경향이 있고 月經不順하여 妊娠이 안 되는 경우)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 2시간에 복용. 2제 분량

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

加味毓麟煎

川椒	甘草	五味子	吳茱萸	肉桂	川芎	枸杞子	杜冲	白芍藥	白茯苓	白朮	人蔘	山藥	菟絲子	當歸	山茱萸	熟地黃
去合目者	灸		湯泡浸去毒汁				酒炒	酒炒					法製			
3分	5分	各7分				各1錢							各2錢			

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 2시간에 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

加味種玉湯

薑 甘 鹿 何 人 蛇 艾 桂 乾 牧 玄 陳 白 吳 香 熟 白 川 當
 草 茸 首 蔘 床 葉 皮 薑 丹 胡 皮 茯 茱 附 地 芍 芎 歸
 烏 子 炮 炒

三 各
 個 8
 分

各
 1.5
 錢

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

五積散加減

大 生 甘 桂 桔 枳 白 半 蒼 厚 陳 川 當 白
 棗 薑 草 皮 梗 殼 芍 夏 朮 朴 皮 芎 歸 芷
 藥

2 3 各 各
 個 片 5 1
 分 錢

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

1일 3회 공복에 복용함.

1제 ~ 4제까지 사용하며 복약 중 임신이 되면 약을 중단함. 임신이 되면 하복부가 불편함.

● 활투

月經腹痛 加 香附子, 小茴香, 吳茱萸 各 1錢

月經腰痛 加 羌活, 獨活, 牛膝 各 1錢

月經 乳房痛 加 青皮 1錢

常時 便秘 加 大黃 8分 ~ 1.2錢

加味調經種玉湯

熟艾	官桂	乾薑	牡丹皮	玄胡索	陳皮	白茯苓	白芍藥	川芎	吳茱萸	甘草	當歸身	香附子	益母草	熟地黃
各5分		各8分						各1錢				各1.5錢		

- 주치 및 효능
不妊症
- 복용 용법·용량
1일 3회 식사 전 30분에 복용
- 주의 사항
· 피해야할 음식 - 술, 담배, 커피, 찬 음식, 녹두음식, 무우 등
- 상기 환자의 경험 및 치료 실적
결혼 2년경과 불임증에 1~3제 복용하면 임신가능성이 약 80% 높아진다고 봄.

不妊症 經驗方1

甘草	吳茱萸	人蔘	桂皮	乾薑	牡丹皮	熟艾	玄胡索	陳皮	白茯苓	白芍藥	川芎	當歸	香附子	龍眼肉
各5分		各1錢											各1.5錢	

- 주치 및 효능
不妊症(난관협착, 자궁발육부전, 자궁내막염 등으로 인함)
- 복용 용법·용량
1일 2회 식사 전 빈속에 복용.
60첩 이상 지속적으로 복용 요함(4-5제 내에 효과)
- 주의 사항
이 약과 함께 滋宮丸을 복용하면 효과가 훨씬 빠르다.
* 滋宮丸 處方 : 熟地黃, 人蔘 各 10兩, 白茯苓20兩, 貢砂仁3兩

調經種玉湯加減方

益 母 草	艾 葉	乾 薑	白 朮	丹 蔘	吳 茱 萸	牧 丹 皮	玄 胡 索	白 茯 苓	白 芍 藥	川 芎	芫 蔚 子	香 附	當 歸 身	熟 地 黃
	炒		土 炒	酒 蒸				酒 炒	酒 蒸	酒 蒸	鹽 水 浸 炒			9 蒸
	各 5 分		各 1 錢								各 2 錢			

● 주치 및 효능

不妊症(자궁허냉, 난소기능 부전)

● 복용 용법·용량

酒水相半煎湯. 1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

加味附益八物湯

甘 草	吳 茱 萸	良 薑	乾 薑	肉 桂	玄 胡 索	白 芷	丹 蔘	白 茯 苓	白 朮	人 蔘	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸	益 母 草	香 附 子
各 8 分					各 1 錢						各 1.5 錢				各 2 錢	

● 주치 및 효능

不妊症(婦人 月經不順 無子)

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味溫膽湯

薑 五 棗 二	甘 草	木 香	香 附 子	白 茯 神	鹿 茸	白 朮	黃 芪	人 蔘	遠 志	龍 眼 肉	當 歸	竹 茹	枳 實	白 茯 苓	陳 皮	半 夏
	各 5 分		各 1 錢										各 1.5 錢			

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 전 빈속에 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆 飲食

加味補中益氣湯

升 麻	柴 胡	甘 草	檳 榔	益 智 仁	車 前 子	澤 瀉	烏 藥	當 歸	白 茯 苓	白 朮	人 蔘	鹿 角	黃 芪
各 5 分		各 1 錢										2 錢	各 3 錢

● 주치 및 효능

不妊症, 流産後遺症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

30여년 경험상 만성병피로증 및 부인과 유산후 회복제로 치료율은 90%이상

調經種玉湯

熟肉乾牧玄陳白白川吳當香熟
艾桂薑丹胡皮茯芍芎茺歸附地
皮索苓藥莢身子黃
炒炒酒洗

各
5
分

各
8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

四物湯加味方

當川白熟肉乾玄山甘陳砂五梔元
歸芎芍地桂薑胡楂草皮仁味子肉
藥黃索
各1錢 2錢

● 주치 및 효능

不妊症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

不妊症 經驗方2

紫 河 車	蛇 床 子	五 味 子	菜 子	枸 杞 子	覆 盆 子	當 歸	仙 茅	生 地 黃	肉 蓯 蓉	仙 靈 脾	熟 地 黃	桑 椹 子
各 1.2 錢	各 3 錢			各 3.7 錢				各 5 錢				

● 주치 및 효능

남성불임증(정자수 2000만/ml이하인 경우)

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 2회 식사 전 빈속에 복용

20일을 1회 치료로 하고, 그 후 7일은 복용을 중지한 후 다음 치료를 한다.

● 활투

腎精虧虛 加 巴戟

腎精不足 加 附子, 肉桂, 鹿茸

陰虛火旺 加 黃柏, 龜板

肝氣鬱結 加 柴胡, 白芍藥, 丹蔘

濕熱下注 加 萆薢, 黃柏, 澤瀉

氣血瘀滯 加 川芎, 紅花

寒熱錯雜 加 附子, 黃連

慎言育精湯

車 前 子	蛇 床 子	覆 盆 子	菜 子	何 首 烏	山 茱 萸	肉 蓯 蓉	桑 椹 子	紫 石 英	紫 河 車	補 骨 脂	白 茯 苓	熟 地 黃	淫 羊 藿	枸 杞 子
各 2.2 錢				各 2.5 錢			各 3 錢				各 3.7 錢			

● 주치 및 효능

精少症

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용

매주 5첩, 3개월을 치료과정으로 함.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

固本湯

甘 牡 巴 石 柏 官 附 白 枸 何 菟
草 蠣 戟 菖 子 桂 子 茯 杞 首 絲
 蒲 仁 苓 子 烏 子
 (神)

去骨

5分

- ## ● 주치 및 효능

早漏治腎心虛 見聞漏精不久戰 早漏

- ## ● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

- ## ● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

大營煎加味

甘草	砂仁	艾葉	桂皮	牛膝	杜沖	枸杞子	當歸	熟地黃
各1錢			各2錢				2 ~ 5錢	3 ~ 7錢

- ## ● 주치 및 효능

嫌夫症(性交忌避症) 婦人 身體虛弱으로 性交忌避하거나 分泌物不足으로 痛症을 呼訴할 때

- 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 1시간에 복용.

30日 이상 복용

- ### ● 주의 사항

陰虛에서 오는 病症이 아니고, 사랑을 느끼지 못하는 性交拒否症에는 效果없음.

不妊症 經驗方3

각 호소자의 상황에 따라, 歸脾湯이나 聰明湯 등 1제에 地榆 80g 가함.

- 주치 및 효능
수험생 성욕향진

引精止血湯加減方

黃 柏	乾 薑	車 前 子	荊 芥 穗	白 茯 苓	山 茱 萸	人 蔘	熟 地 黃
							薑 拌
	炒 黑						

5 分	1 錢	各 3 錢		各 5 錢		1 兩
--------	--------	-------------	--	-------------	--	--------

- 주치 및 효능
交感出血, 婦人有一交合, 流血不止者
- 복용 용법·용량
2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

不妊症 經驗方4

附 子	人 蔘	白 朮	石 斛	菟 絲 子	淫 羊 藿	巴 戟 去 骨	楮 實 子	女 貞 實
				製			酒 蒸	

3 分	5 分	8 分	各 1 錢
--------	--------	--------	-------------

- 주치 및 효능
陽氣不足

●복용 용법·용량

蜜丸 梧子大 30~50丸로 1일 3회 식사 전 1시간에 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 - 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

補肝湯

知 神 蒼 澤 黃 當 連 陳 羌 柴 人 葛 白 豬 升 甘 黃
母 麵 朮 瀉 柏 歸 翹 皮 活 胡 蔘 根 茯 苓 麻 草 芪
苓

炒

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

3
錢

●주치 및 효능

勃起無力과 陽氣不足 陰冷과 陰汗

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 전 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

十全五子湯

鎖 破 巴 車 菟 五 蛇 覆 枸 熟 白 川 當 肉 黃 甘 白 白 人
陽 故 戟 前 絲 味 床 盆 杞 地 芍 芎 歸 桂 芪 草 茯 朮 蔘
紙 子 子 子 子 子 子 黃 藥 苓

各
1
錢

●주치 및 효능

氣血不足, 精力不足

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

●주의 사항

혹시 소화가 불량하거나 몸에 조금이라도 이상이 있으면 1일 2회만 복용함.
즉 몸에 맞게 적량 복용함

八味地黃湯加味方

生 薑	附 子	肉 桂	澤 瀉	牧 丹 皮	枸 杞 子	大 棗	菟 絲 子	白 芍 藥	牡 蠣 骨	龍 骨	白 茯 苓	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
3 片	各 1 錢				各 2 錢									3 錢

● 주치 및 효능

精力減退 陰部濕潤

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

1제 이상

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

滋腎湯(雙和湯加味)

大 棗	生 薑	附 子	甘 草	桂 皮	巴 戟 乾	肉 苳 蓉	杜 冲	枸 杞 子	山 茱 萸	黃 芪	熟 地 黃	川 芎	當 歸	白 芍 藥
2 枚	3 片	5 分	各 7 分		各 1 錢			各 1.5 錢		各 2 錢				3 錢

● 주치 및 효능

補精 虛勞 房事過度 陰陽俱虛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 1시간 빈속에 복용

● 활투

泄瀉, 消化不良 加 山查, 神曲, 砂仁, 陳皮

勃起不全湯

牧 當 升
丹 歸 麻
皮

0.5 1 2
} 錢 錢
1 錢

● 주치 및 효능

勃起力 增強

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

● 주의 사항

목단피의 양으로 약의 강도 조절. 半제정도 복용후 효과 나타남.

만드시 따뜻하게 데워 복용한다. 과도한 복용은 眩暈을 유발 가능성 있음

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

清胃하여 잇몸염증을 가라앉힐 목적으로 복용중에 효과 발견 (黃連은 胃寒을 우려하여 嚥음) 임상경험이 많지 않음

拱辰龜板丸

甘 龜 牛 肉 巴 龍 人 山 熟 車 蛇 覆 枸 五 菟 麝 山 當 鹿
草 板 膝 蓯 戟 眼 蔘 藥 地 前 床 盆 杞 味 子 香 茱 歸 茸
蓉 肉 黃 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子

各
2
兩

5
錢

各
4
兩

蜥 蒼 蜈 紫
蜴 朮 蚣 何
車

各
2
兩

● 주치 및 효능

精力제

● 복용 용법·용량

梧子大 丸藥 만들어 복용

加味溫膽湯

薑 五 棗 二	甘 草	木 香	香 附 子	白 茯 神	鹿 茸	白 朮	黃 芪	人 蔘	遠 志	龍 眼 肉	當 歸	竹 茹	枳 實	白 茯 苓	陳 皮	半 夏
	各 5 分		各 1 錢										各 1.5 錢			

●주치 및 효능

갱년기 증후군 (不眠, 上熱, 頭痛, 心悸, 易驚, 不安, 手足痺, 신경성 소화불량)

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

●활투

高血壓者 去 人蔘.

不眠甚 加 酸棗仁 2~3錢.

浮腫 加 澤瀉

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

치료 경험환자 중 80%는 좋아짐

加味逍遙散

薄 荷	乾 薑	甘 草	山 梔 子	牧 丹 皮	柴 胡	茯 苓	白 朮	芍 藥	當 歸
各 5 分		8 分	各 1 錢		各 1.5 錢				

●주치 및 효능

여성 갱년기 장애 증후군 (上氣, 寒熱往來, 發汗, 疲勞感, 頭重, 不眠, 憂鬱症, 짜증, 신경질)

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 상관없이 복용

●주의 사항

매운 것을 적게 먹게 하고 다른 것은 갱년기 장애의 식이요법에 준한다. 환자의 피부가 매우 건조하거나 건조한 피부질환이 있을 경우 熟地黃과 川芎 1錢을加한다.

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

치료 경험 100 예 이상인데, 정도차이가 있으나 70%정도의 환자에서 호전을 보임.
침치료 병행하면 유효율이 높아짐

加慈陰降湯

大 棗	生 薑	甘 草	牧 丹 皮	澤 瀉	龜 板	鹿 茸	遠 志	枸 杞 子	白 茯 苓	肉 蓯 蓉	山 藥	山 茱 萸	熟 地 黃	巴 戟	杜 冲	牛 膝	黃 柏	知 母
2 分	3 片	各 7 分			各 1 錢						各 1.5 錢						各 2 錢	

●주치 및 효능

男女陰虛 火動上氣 更年期障礙, 男女性不能

●복용 용법·용량

爲末糊丸五味子大, 1일 2~3회 식사 후 30분~1시간에 60~70개씩 복용.

●주의 사항

술, 담배, 커피, 닭고기 脂肪이 많은 음식은 피하고 식물성기름은 무방함.

●활투

消化障礙 加 山查, 神曲, 砂仁 各 1錢

不眠 加 山棗仁炒 1~2錢

加味逍遙散

鰾 甲	甘 草	乾 薑	薄 荷	牧 丹 皮	梔 子	白 朮	土 柴 胡	白 茯 苓	白 芍 藥	當 歸
各 1 錢						各 2 錢				

●주치 및 효능

50대 갱년기 장애로 寒熱往來, 疲勞, 神經痛, 頭痛, 眩暈

●복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 冷食

加味逍遙散

甘 薄 梔 牧 柴 白 白 白 當
草 荷 子 丹 胡 茯 朮 芍 歸
 皮 苓 藥

各
5
分

各
8
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

更年期 障礙, 自律神經失調症, 血道症

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 환투

心熱로 인한 寒熱往來 加 黃連 五分

怔忡 加 麥門冬, 牡蠣

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

10여년의 치료경험상, 80%정도의 유효를 보임

제11장 임신, 출산 및 산육

1. 妊娠 出產 産育

保胎飲

升 麻	柴 胡	條 芩	大 腹 皮	陳 皮	當 歸	甘 草	砂 仁	白 茯 苓	白 朮	人 參	黃 芪
各 5 分		各 1 錢				各 1.5 錢			各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

流産防止

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

임신 후 3개월 이내에 1제 복용으로 낙태방지된다. 태아도 건강해진다

● 주의 사항

3개월 이후 복용하면 태아가 커져서 순산하기 어렵다.

泰山盤石散

甘 草	砂 仁	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	糯 米	黃 芩	人 參	黃 芪	香 附 子	續 斷	白 朮	當 歸
炙					炒							
各 5 分		各 8 分			各 1 錢						各 2 錢	

● 주치 및 효능

習慣性流産及胎元不固

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

찬 음식을 피하고, 몸을 따뜻하게 하며, 절대안정을 취함.

然安胎飲

蘇 葉	川 芎	甘 草	糯 米	鹿 角 膠	香 附 子	艾 葉	陳 皮	砂 仁	阿 膠 珠	白 芍 藥	當 歸 身	熟 地 黃	赤 何 首	續 斷	杜 冲	黃 芩	白 朮
		灸			炒			炒 研					米 泔 浸	鹽 酒 炒	鹽 酒 炒		
各 8 分			各 1 錢										各 1.5 錢				2 錢

●주치 및 효능

衝擊, 勞動 胎盤異常에 의한 流産, 習慣性 流産 豫防과 治療.

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사후 2시간에 복용.

●주의 사항

- 1) 절대 안정과 破血作用의 식초를 금하고 熟地黃의 금기인 날무우, 마늘, 파 등을 금한다.
- 2) 自然 流産의 예방에는 1제 이상 사용한다. 자연유산의 징후 치료에는 태아의 건강 여부를 관찰하면서 완전 止血이 될 때까지 투약한다.

保胞養血飲

甘 草	木 香	貢 砂 仁	肉 桂 莢	吳 茱 萸	人 蔘 苓	白 茯 苓	枸 杞 子	山 茱 萸	杜 冲 薑	破 故 紙	山 芍 藥	丹 蔘	川 芎	當 歸	白 朮	香 附 子 童 便 炒
									炒							
各 1 錢					各 1.5 錢						各 2 錢				各 3 錢	

●주치 및 효능

習慣性 流産

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

찬 음식을 피하고, 몸을 따뜻하게 하며, 절대안정을 취함

人蔘達生散

青 黃 砂 枳 蘇 人 陳 甘 白 白 當 大
葱 芩 仁 殼 葉 蔘 皮 草 朮 芍 歸 腹
葉 藥 皮

灸

5
本

各
5
分

1.5
錢

各
1
錢

3
錢

● 주치 및 효능

順産

● 복용 용법·용량

3첩으로 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

찬 음식을 피하고, 몸을 따뜻하게 하며, 절대안정을 취함

加味橘皮飲

薑 人 白 丁 枳 烏 甘 黃 竹 梔 砂 厚 香 白 烏 黃 半 桔 赤 橘
三 蔘 豆 香 殼 梅 草 連 茹 子 仁 朴 附 朮 藥 芩 夏 梗 茯 皮
棗 蔻 二 子 苓 苓 茶 皮

炒

薑
炒

各
1
錢

各
5
分

3
個

各
7.5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

妊娠惡阻症

● 복용 용법·용량

2첩으로 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

복약중에도 구토하는 경우가 있으니 소량씩 천천히 복용한다.

藿香正氣散加味方

藿 丁 人 甘 桔 半 陳 厚 大 白 蘇 元 黃 藿 砂 白
 三 香 蓼 草 梗 夏 皮 朴 腹 芷 葉 肉 芩 香 仁 朮
 棗
 二

製

3 各
分 5
分

各
1
錢

1.5 各
錢 2
錢

● 주치 및 효능

妊娠 2, 3個月 嘔吐症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

6첩을 3일동안 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味順肝湯

甘 貢 竹 神 白 陳 白 當 人 麥 白 白 山
 草 砂 茹 麴 豆 皮 茯 歸 蔘 門 朮 芍 藥
 仁
 炒 研 去 心 炒

各
7
分

各
1.5
錢

5
錢

● 주치 및 효능

妊娠惡阻症

● 복용 용법·용량

2첩으로 1일 3회 식사 후 30~60분에 복용.

5-6첩에 호전됨.

● 주의 사항

처음 복용할 때 구토가 나오면 뱉어버리고 두 번째는 먹는다.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 冷食
절대안정

加味保生湯

生 薑	蘇 葉	枳 殼	桔 梗	旋 覆 花	甘 草	白 豆 蔻	人 蔘	白 茯 苓	半 夏	陳 皮	烏 藥	香 附 子	白 朮 土 炒
									薑 製				
5 片	5 分	各 7 分			各 1 錢				1.5 錢	各 2 錢			

- 주치 및 효능
妊娠惡阻症
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
5-6첩에 호전됨.
- 주의 사항
악취가 심하면 10첩 이상

通乳湯

好 酒	米 糊	穿 山 甲	甘 草	木 通	枳 殼	青 皮	漏 蘆	續 斷
1 鐘 子	1 鐘 子	6 分	1 錢	2 錢	各 2.5 錢	4 錢	9 錢	

- 주치 및 효능
乳道不通
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

日 甘 防 白 川 當
黃 草 風 芍 芎 歸
連

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

產後乳頭糜爛 (유두가 갈라지고 헤어져 심하게 아픔)

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~3일 복용하면 유효하며, 4~5일 복약이면 치료가능.

● 활투

2~3일 복용해도 효과가 없으면, 日黃連을 去 黃柏, 梔子 各 1錢 加 하고, 이때, 腸胃
虛冷으로 泄瀉가 유발되면, 日黃連, 黃柏, 梔子의 中량을 減半함

佛手散加味方

甘 乾 紅 桃 牧 玄 蓬 三 川 當
草 薑 花 仁 丹 胡 朮 稜 芎 歸
皮 索

炒
黑

末

各
5
分

各
7
分

4 8
錢 錢

● 주치 및 효능

產後腹痛(하복부 간헐적으로 疼痛)

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

升堤歸芪湯

升 柴 訶 川 人 黃 當
麻 胡 子 芎 蔘 芪 歸
肉

酒 酒 蜜 酒
炒 炒 灸 灸

各 各 各
1 2 1
錢 錢 兩

● 주치 및 효능

産後脫陰症(原因臨産用力太過或産後下元未固之時强舉重物或氣弱血虛肺氣不能收縮而然 宜大補氣血兼用)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

찬음식물 금함.

加味小調經湯

麝 五 甘 琥 沒 桂 赤 當
香 靈 草 珀 藥 心 芍 歸
脂 藥

5 各 各
分 1 1
錢 錢 兩

● 주치 및 효능

産後遍身浮腫(大小便不利者是水血相亂血化爲水所致也)

● 복용 용법·용량

爲末每回二錢 薑汁調服. 腫消爲度瘀消則水自通矣

● 주의 사항

消化不良飲食禁忌

人蔘麥門冬湯

人參 麥門冬 熟地黃 天花粉 黃芩 白朮 甘草

各
2.5
錢

- 産後燥渴症

- 1일 3회 식사 후 30분에 복용

- 冷飲食物不服用

- 虛煩 加 浮小麥 竹茹 各 1錢

金霍飲子

大棗 生薑 甘草 砂仁 桔梗 車前子 木香 白芷 半夏 厚朴 白茯苓 陳皮 白朮 澤瀉 豬苓 大腹皮 蘇葉 藿香 金銀花

灸

各1錢

各2錢

3
錢

- ## 慢性 産後浮腫症

- 1일 3회 식사 후 30분에 복용

- 육식을 피함.

加味補血湯

酒 紅 甘 沒 桃 蘇 五 蒲 玄 乾 白 川 當
 花 草 藥 仁 木 靈 黃 胡 地 芍 芎 歸
 脂 索 黃 藥
 酒 炒

三 5 各
 匙 分 1
 錢

各
 1.5
 錢

● 주치 및 효능

産後腹痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 전 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

妊娠 出産 産育 經驗方1

桃 甘 燈 車 赤 川 木 陳 防 澤 白
 仁 草 心 前 芍 芎 通 皮 己 蘭 朮
 子 藥

10 5 各
 個 分 1
 錢

各
 2
 錢

3
 錢

● 주치 및 효능

産後浮腫

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

妊娠 出產 產育 經驗方2

五 味 子	甘 草	當 歸 身	杜 冲	人 蔘	白 茯 苓	麥 門 冬	枸 杞 子	山 茱 萸	山 藥	白 朮	熟 地 黃
3 分	各 1 錢			各 2 錢						各 5 錢	

● 주치 및 효능

產前產後 下血症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

少陽人 不可

人蔘鹿茸湯

右 人 鹿
粉 蔘 茸
末
分
飲

各
1
錢

● 주치 및 효능

孕婦 順產陣痛

● 복용 용법·용량

임산부가 통증이 오며 모래집이 파열된 후에 上記 粉末한 것을 나누어서 물로 넘기게 함. 腎水가 많이 생기게 되니 順產함(3分~10分痛)

● 주의 사항

파열 후에 3-10분이면 순산함. 통증이 잠시 오다가 잠을 자다가 통증이 반복해 오는 임부는 1-2시간 만에 순산하는 수도 있다.

調血湯

甘黃 枸陳 烏牧 香益 砂乾 丹白 白芍 熟地 白朮 川芎 當歸 蔓
草 芪 杞 皮 藥 丹 附 母 仁 薑 蔘 茯 苓 藥 黃
子 皮 子 草 炒

各
1.5
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

産後諸症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

浮腫 加 木通 3錢

母乳不服用時 加 麥芽 3錢

歸芪補血湯

生甘 陳川 白人 當黃
薑草 皮芎 朮蔘 歸芪

3
片

7
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

5
錢

● 주치 및 효능

産後 雜病, 身痛, 汗出, 眩暈, 發熱, 惡寒

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

20첩이면 치유가능

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

본인은 약 100여 건에 부작용 없이 거의 모든 증상이 없어짐(통계자료 없음). 외조부는 수십년간 애용한 처방임

産後補元湯

木瓜 牛膝 牡丹皮 益母草 乾干 烏藥 香附子 羌活 桂枝 山查 荊芥 陳皮 白茯苓 白朮 蒼朮 熟地黃 川芎 當歸

各
1.5
錢

- 産後風，全身肢節痛(주로 氣血衰弱者)

- 1일 3회 식사 후 1시간에 복용

출산 1주일에 복용권장, 산후풍이 심하지 않는 자는 거의 한제로 좋아짐

- 浮腫甚者 加 澤瀉，車前子，木通 各 1錢

腰痛 加 杜冲，續斷，補骨脂 各 1錢

- 200여명이상 임상, 90%이상 산후 1제로 쾌유.

부작용은 거의 없음

五積散加味方

玄 山 砂 神 牧 澤 蔓 甘 桂 半 白 川 白 白 乾 當 枳 桔 厚 陳 麻
胡 查 仁 麴 丹 蘭 蔘 草 皮 夏 芷 芎 茯 芍 薑 歸 殼 梗 朴 皮 黃
索 苓 藥

酒炒

各1錢

- 産後調理

- 1일 3회 식사 후 30분에 복용

- 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

산후에는 1일 1회 정도 약간 땀내는 것이 필요함.

● 활투

浮腫 增加 澤蘭

未浮腫 澤蘭 去, 麻黃 去

加味四物湯

厚	枳	麥	神	山	陳	黃	白	白	苦	熟	白	川	當	沙	香
朴	實	芽	麴	查	皮	芪	茯	朮	楝	地	芍	芎	歸	蔘	附
				肉			苓		皮	黃	藥				子
											酒				
											炒				

各
1
錢

2
錢

● 주치 및 효능

産後 氣血虛損 飲食無味症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

歸朮保産湯

元	黃	烏	陳	乾	甘	白	白	白	川	當
肉	芪	藥	皮	薑	草	茯	朮	芍	芎	歸
						苓		藥		
								酒		
								炒		

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

産後 調理

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야 할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

● 활투

腹痛 加 玄胡索, 桃仁, 蘇木, 紅花

玉露散

當 歸	甘 草	赤 茯 苓	人 蔘	赤 芍 藥	川 芎 芩	桔 梗
5 分	各 1 錢			1.5 錢	各 2 錢	

● 주치 및 효능

産後乳汁不行

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3일분 6첩이면 효과 봄.

● 주의 사항

芎歸調血湯加味方

牧 丹	益 母 草	續 斷	茴 香	白 茯 苓	烏 藥 茶	乾 薑	陳 皮	川 芎 芩	當 歸	甘 草	白 朮	香 附 子	葛 根

炒

各
7
分

各
1
錢

各
1.2
錢

1.3
錢

1.8
錢

● 주치 및 효능

産後調理 産後浮腫, 産後乳汁不足

● 복용 용법·용량

1일 2~3회. 식사 1시간 전 복용

● 주의 사항

산후에는 꼭 바람을 주의함

● 활투

下腹痛 加 木通 澤瀉 各 1.5~2錢, 玄胡索 7分~1.2錢

妊娠 出產 產育 經驗方3

升 麻	乾 薑	肉 桂	砂 仁	甘 草	杜 冲	澤 蘭	白 芍 藥	川 芎	當 歸	白 朮	人 蔘	防 風	黃 芪
	炒 黑						酒 炒						蜜 炙
3 分	各 5 分			各 1 錢					各 1.5 錢				2 錢

● 주치 및 효능

産後調理

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

少陽人 不可

海桐皮湯

續 斷	威 靈 仙	牛 膝	皂 角 刺	豨 薟	桔 梗	半 夏	陳 皮	厚 朴	白 朮	白 茯 苓	大 腹 皮	白 芷	蘇 葉	蘿 蔔 子	藿 香	山 查	香 附 子	海 桐 皮
各 1 錢																		2 錢
甘 草	木 瓜	桂 枝	防 風															
各 1 錢																		

● 주치 및 효능

産後風, 高血壓

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

建中湯加味方

白芍藥酒炒
桂枝
白茯苓
白朮
澤瀉
當歸
川芎
生薑
大棗
甘草

各3錢

● 주치 및 효능

搔爬流產 後遺症(小腹痛, 腹膜炎, 浮腫, 遍身痛, 頭痛, 頭重, 肩凝, 眩暈)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

3~4日 服用

● 주의 사항

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味起枕散

沒藥	牡丹皮	五靈脂	蒲黃	桂心	白芷	蘇木	紅花	桃仁	玄胡索	蓬朮	三稜	川芎	白芍藥	當歸
									醋炒	醋炒	醋炒		酒炒	

各2錢

● 주치 및 효능

兒枕痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

知母湯

艾 砂 知
葉 仁 母

炒
研

2 3 7
錢 錢 錢

●주치 및 효능

胎中諸症, 下腹引痛, 胎漏, 感氣, 腹中諸不安症

●복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

膠朮安胎飲

紫	陳	貢	當	熟	阿	白
檀	皮	砂	歸	地	膠	朮
香		仁		黃	珠	
各		各		各		3
5		1.5		2		錢
分		錢		錢		

●주치 및 효능

六個月以上 胎兒不安 於胞中疼痛不忍者

●복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용. 2~3첩이면 효과 봄.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

●활투

胎兒受寒不安於胞中而小腹疼痛者 用貢砂仁 3錢 溫酒調服

佛手散

川 當
芎 歸

2 8
錢 錢

● 주치 및 효능

臨月服之縮胎易產

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

凡臨產時使產母不可用力太甚而 以麥麵一碗加眞油猪肉等滑物充腹助元氣可也

● 활투

臨熟入酒少許 加 益母草 3錢尤妙

不嗜服藥者 加炙甘草用之無妨

臨產 加 蘇葉貢砂仁 1錢,

氣虛者 加 人蔘 3~5錢,

血虛者 加 鹿茸 3~5錢,

四物湯加味方

丹 甘 杜 續 牛 香 川 益 白 當 熟
麥 草 冲 斷 膝 附 芎 母 芍 歸 地
子 草 藥 黃
酒
炒

1.5
錢

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

流產(自然流產 2, 3次. 腰脊重痛 肢節痛 頭痛 脇痛 乍寒乍熱, 咳嗽, 食慾不振, 顔色蒼白, 肉瘕, 下腹部 隱隱痛)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

歸朮破癥湯加味方

玄 胡 索	官 桂	紅 花	吳 茺 萸	烏 藥	半 夏	蓬 朮	三 稜	丹 蔘	牧 丹 皮	黑 丑	大 黃	香 附 子	川 芎	赤 芍 藥	當 歸 尾	五 靈 脂
各 1 錢			各 1.5 錢								各 2 錢				2 ~ 4 錢	3 錢

● 주치 및 효능

落胎

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

출산 불가사유 이외에는 사용금지처방임.

蘇紅芎歸湯

甘 川 當 紅 蘇
草 芎 歸 花 梗

各 3 5
1 錢 錢
錢

● 주치 및 효능

流產腹痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

2~3첩이면 효과 봄

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

養腎湯

甘 草	知 母	黃 芪	唐 木 香	續 斷	肉 桂	玄 胡 索	小 茴 香	當 歸	破 古 紙	杜 冲
									鹽 炒	鹽 炒 去 絲
各 1 錢				各 1.5 錢					各 2 錢	

● 주치 및 효능

産後腰痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 따뜻하게 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

除濕牛桂飲

生 薑	附 子	川 芎	牧 丹	肉 桂	牛 膝 皮
5 片	3 分	5 分	1.2 錢	各 2.5 錢	

● 주치 및 효능

産後 血臑浮腫

● 복용 용법·용량

1일3회 식사 전 빈속에 복용.

10첩 정도 분량이면 유효

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

香蘇散加味方

甘 草	神 麴	山 查 肉	獨 活	羌 活	白 芷	柴 胡	大 腹 皮	半 夏	烏 藥	陳 皮	蘇 葉	蒼 朮	香 附 子
各 5 分							各 1 錢				各 2 錢		3 錢

● 주치 및 효능

産後骨節痛, 心衰喘滿

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

4~5첩이면 효과 봄. 다만, 産後骨節痛에는 하루에 약간의 取汗을 해야 좋음.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

妊娠 出産 産育 經驗方4

甘 草	官 桂	木 香	檳 榔	乾 薑	桔 梗	川 芎	黃 芩	當 歸	厚 朴	三 稜	蓬 朮	川 練 子	赤 芍 藥	玄 胡 索	大 黃
各 5 分									薑 製			去 核			2 錢

● 주치 및 효능

一切 心腹暴痛(經病 産後腹痛, 腹滿, 喘悶 或癥瘕癖塊)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味澤蘭湯

澤蘭	3錢
赤茯苓	2錢
木香	
當歸	
川芎	
白芍藥	
熟地黃	
木通	
車前子	
大黃	
大戟	各1錢
甘草	5分

- 주치 및 효능
産後內熱 心煩 浮腫 腹脹
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿藦

加味起枕散

大棗	生薑	甘草	紅花	沒藥	五靈脂	白芍藥	玄胡索	乾薑	牡丹皮	益母草	桃仁	香附子	川芎	當歸	熟地黃	白茯苓
		炙				酒炒										
5枚	3片	各5分		各7分				8分	各1錢				1.5錢	各2錢		

- 주치 및 효능
産後腹痛
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加味補虛湯

甘 草	玄 胡 索	破 古 紙	吳 茱 萸	香 附 子	白 朮	陳 皮	黃 芪	白 芍 藥	川 芎	何 首 烏	當 歸
								酒 炒			

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

5
錢

● 주치 및 효능

産後虛勞, 腰腹痛, 浮腫

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

輕者 2~3첩, 重者 5~6첩 분량

● 활투

産後腹痛 加 山查肉, 沒藥, 五靈脂 各 1錢

産後浮腫 加 木通 1錢

逐露飲

葱 白	生 薑	五 靈 脂	丹 蔘	茜 根	桃 仁	蓬 朮	三 稜	玄 胡 索	牧 丹 皮	赤 芍 藥	當 歸	川 芎	生 地 黃
		醋 炒	醋 炒				醋 炒			酒 洗			

2
莖

3
片

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

兒枕痛(産後腹痛)

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味芎歸湯 1

荊 人 熟 川 當
芥 蔘 地 芎 歸
黃

炒

2 5 各 2
錢 錢 1 兩

● 주치 및 효능

産後厥冷瘀血腹痛症

● 복용 용법·용량

1일 1회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味芎歸湯 2

桃 荊 益 蔘 川 當
仁 芥 母 芎 歸
草

炒

各 2 3 5 1
1 錢 錢 錢 兩

● 주치 및 효능

産後虛症

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

2~3첩 복용.

● 활투

有風時 加 柴胡 5分

有寒時 加 肉桂 1錢,

血暈時 加 薑黑炒 5分
 衄血時 加 麥門冬 1錢
 夜熱時 加 地骨皮 5分
 有食滯時 加 神麴, 貢砂仁 各1錢
 有痰時 加 白芥子少許

白朮異香散

大	烏	甘	川	當	人	陳	白	赤	竹	梔	白	黃
棗	梅	草	芎	歸	蔘	皮	芍	茯	茹	子	朮	連
							藥	苓				
							酒			炒	土	干
							炒			黑	炒	炒

各
2
個

各
7
分

各
8
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

産後泄瀉

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味生化湯

桃	益	紅	乾	山	川	當
仁	母	花	薑	查	芎	歸
	草			肉		
				炮		

各
1
錢

3
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

産後腹痛

- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
3~6첩이면 효과 봄.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味補虛湯

大 棗	生 薑	前 胡	甘 草	竹 茹	薏 苡 仁	桂 枝	羌 活	白 朮	黃 芪	敗 醬	荊 芥	熟 地 黃	白 芍 藥	陳 皮	川 芎	當 歸
2 個	3 片	3 分	5 分	7 分	各 8 分				各 1 錢							1.5 錢

- 주치 및 효능
産後風 刺痛
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿菔

妊娠 出産 産育 經驗方5

桃 仁	玄 胡	山 查	川 芎	當 歸 索
各 1 錢		2 錢		各 5 錢

- 주치 및 효능
産後瘀血腹痛
- 복용 용법·용량
1일 2회 식사 전 빈 속에 복용.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

平胃散加味方

甘 桃 蒲 玄 厚 陳 蒼 白
草 仁 黃 胡 朴 皮 朮 芍
索
薑 醋
製 炒
炒

5 各
分 1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

産後腹痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

生 陳 紫 香 柴 熟 白 川 當
薑 皮 蘇 附 胡 地 芍 芎 歸
葉 子 黃 藥
酒
炒

3 各
片 1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

産後傷寒兼時疫症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

有汗 加 桂枝, 防風 減 紫蘇

無汗 加 麻黃, 葱白

頭痛 加 藁本, 細辛

遍身痛 加 羌活, 蒼朮
 熱不惡寒 加 葛根
 發熱而渴 加 知母, 麥門冬, 淡竹葉

柴胡四物湯

生 薑	甘 草	半 夏	人 蔘	黃 芩	當 歸	赤 芍	川 芎	生 地	柴 胡
3 片	各 5 分			各 1 錢				各 2 錢	

- 주치 및 효능
産後發熱, 熱入血室
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 환투
高熱時 人蔘을 沙蔘으로 換

四物湯加減方

竹 茹	赤 茯 苓	丹 蔘	麥 門 冬	熟 地 黃	酸 棗 仁	人 蔘	川 芎	當 歸
1 團	各 1 錢		3 錢	5 錢	各 1 兩			2 兩

- 주치 및 효능
産後 見鬼, 譫妄, 心煩不止
産後 見鬼譫妄, 煩躁驚悸, 言語顛倒 甚則不醒人事 等症, 此由, 敗血干心也,
- 복용 용법·용량
1일 3회 식사 후 30분에 복용
1~2첩 복용하면 효과를 바로 볼 수 있음.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味四物湯

香 防 烏 羌 麥 木 熟 白 川 當
附 風 藥 活 門 香 地 芍 芎 歸
子 冬 黃 藥
酒
炒

各
1
錢

各
2
錢

- 주치 및 효능
産後十指皆麻症
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

補肺通乳散

升 麻 桔 牛
麻 黃 梗 乳
房
2.5 各 1
錢 0.7 個
} 1
兩

- 주치 및 효능
産後乳汁不足方
- 전탕법
牛乳房을 煎取汁한 후, 위의 약재를 넣고 다시 달임.
- 복용법
1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

當歸芍藥散

白 川 當 澤 茯 芍
朮 芎 歸 瀉 苓 藥

各
1.5
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

婦人 腹中 諸疾痛, 筋肉無力, 疲勞, 貧血, 腰痛, 腰冷, 下腹部가 不快, 頭痛, 頭冒, 動悸, 脈沈

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物調經湯

甘 吳 玄 白 陳 肉 乾 貢 枸 元 香 白 川 當 熟
草 茺 胡 茯 皮 桂 薑 砂 杞 肉 附 芍 芎 歸 地
 莢 索 苓 仁 子 子 藥 黃

炒

各
8
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

習慣性流産(暗産) 月經不順

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

습관성유산의 소인이 있는 부인이 임신 전에 복용하여 자궁의 冷積을 제거하고 補血煖水臟하여 임신한 후에 태아를 양육할 수 있는 힘을 기르는 처방임. 임신중에 주의해야 할 약인 현호색, 건강, 육계 등이 배합되어 있어, 임신 전에만 복용해야 함.

妊娠 出産 産育 経験方6

艾葉	山查	糯米	升麻	甘草	白茯苓	川芎	黃芩	人蔘	黃芪	杜冲	當歸	白芍藥 酒炒	白朮	熟地黃
----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	-----

1 1 1 3 7 1
捲 錢 匙 分 分 錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

習慣性 流産

● 복용 용법·용량

이 약을 임신 3개월에 10첩 복용한 후, 매 초하루마다 4첩씩 다려 복용하면, 유산을 방지할 수 있음.

● 주의 사항

습관성 유산자의 임신 후, 유산방지 처방임.

順血湯

[illegible]

各1錢

3	5
錢	錢

● 주치 및 효능

產後 子宮血積 小腹痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

5첩 이내 효과 봄.

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味通乳湯

甘 連 赤 白 青 天 柴 瞿 木 麥 桔 當 黃
草 翹 芍 芷 皮 花 胡 麥 通 門 梗 歸 芪
藥

蜜
灸

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

2
錢

3
錢

5
錢

● 주치 및 효능

乳汁不下

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味養血湯

甘 破 杜 砂 香 青 川 艾 阿 白 當 黃 人
草 古 冲 仁 附 皮 芎 葉 膠 芍 歸 芪 蔘
紙 子

珠

酒
炒

各
1
錢

● 주치 및 효능

流産後下血不止

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

妊娠 出產 產育 經驗方7

甘 川 當 紅 益 蘇
草 芎 歸 花 母 梗
草

各
1
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

婦人病 瘀血性 腰脇痛 不可忍症(閉經期때 자주 發生), 産後腹痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味轉陽湯

江 熟 土 當 續 元 破 肉
芍 地 川 歸 斷 杜 古 蓰
藥 黃 芎 身 冲 紙 蓉
九 去 酒 酒 酒 酒
蒸 油 洗 炒 炒 洗
薑 炒

各
2.5
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

生男

● 복용 용법·용량

세 첩 1일 1첩 두 차례 나누어 복용하는 것으로 3일간 연용함.

월경 끝난 후(임신 가능 추정시) 40~45일 이내에 3일간 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

加味地黃湯

紅 花	甘 草	砂 仁	白 朮	黃 芪	白 茯 苓	澤 瀉	山 茱 萸	山 藥	熟 地 黃
3 分	各 1 錢				各 1.5 錢		各 2 錢		4 錢

● 주치 및 효능

轉女爲男

● 복용 용법·용량

1일 1첩, 오전 10시경 복용. 하루 건 너 한 첩 씩 복용

● 주의 사항

임신 3개월 내 빈속에 복용해야 함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

加減地黃湯

紅 花	澤 瀉	人 蔘	香 附 子	白 茯 苓	山 茱 萸	熟 地 黃	山 藥
各 2 分		4 分	6 分	1 錢	2 錢	各 4 錢	

● 주치 및 효능

生男

● 복용 용법·용량

3첩복용

● 주의 사항

임신 2개월까지 복용하여야 하고 2개월이 넘으면 효과없다고 봄.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

제12장 근골격계 질환

1. 근골격계질환

加味八仙湯

大	生	柴	桂	牛	秦	甘	羌	防	半	人	熟	白	川	陳	白	白	當	黃
棗	薑	胡	枝	膝	朮	草	活	風	夏	蔘	地	芍	芎	皮	茯苓	朮	歸	芩
											黃	藥						
炙																		

2	3	各		各	各	各	各								1.5	各		3
枚	片	5		6	7	8	1								錢	2		錢
		分		分	分	分	錢											

●주치 및 효능

手麻木, 血液循環不良(虛證)

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

이 약은 虛弱한 자에 적당함. 단, 혈압이 높은 사람은 사용할 수 없음.

· 복용 중 피해야할 음식 : 냉한 음식, 냉수, 녹두, 무우

行氣萬金湯

甘	威	秦	當	川	陳	獨	牛	桂	細	防	羌	杜	續	白	蒼	薏	香	蘇
草	靈	朮	歸	芎	皮	活	膝	枝	辛	風	活	冲	斷	茯苓	朮	苡仁	附子	葉
各					各										各		各	
5					8										1.5		2	
分					分										錢		錢	

●주치 및 효능

手足麻木, 末梢麻痺, 末梢神經痛

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

風寒濕으로 인한 手足麻木(손발저림)에 효과가 있다. 수척한 사람보다는 비만한 사람이 이 증이 많다.

● 활투

刺痛甚 加 穿山甲 全蝎 各5分

加味補中益氣湯

升 柴 桂 烏 防 大 生 羌 香 麥 木 甘 陳 白 當 人 黃
麻 胡 枝 藥 風 棗 薑 活 附 門 香 草 皮 朮 歸 蔘 芪
子 冬

各
5
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

手肢麻木(손, 손가락저림), 末梢麻痺 或氣虛性頭痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

氣虛로 인한 手肢麻木에 효과가 있다. 비만한 사람보다는 수척한 사람에게 이 증이 많다.

三氣飲加味方

威 獨 羌 木 加 甘 附 白 細 肉 白 白 枸 當 牛 杜 熟
靈 活 活 瓜 牛 草 子 芷 辛 桂 芍 茯 杞 歸 膝 冲 地
仙 膝 藥 苓 子 黃

炙 炮

去
絲

各
1
錢

3
錢

● 주치 및 효능

手足麻痺(손발이 저릴 때)

● 복용 용법·용량

2첩으로 1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 활동

附子는 體質에 따라 加減

太陰人 加 薏苡仁, 枸杞子, 杜冲 併 倍量

少陽人 換生甘草 去 附子

加味完手湯

甘草	陳皮	半夏	秦艽	羌活	防風	薏苡仁	桂枝	海桐皮	五加皮	蒼朮	白朮	雞屎藤
各1錢						各2錢						3錢

● 주치 및 효능

手顫症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

• **복음 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大補湯

甘草	鹿茸	附子	肉桂	木香	薏苡仁	木瓜	杜冲	防風	獨活	羌活	牛膝	烏藥	熟苧	白芍藥	肉苳蓉	黃芪	人蔘	當歸	白茯苓	白朮	川芎
							炒									蜜炙					
5分			各7.5分												各1.5錢			2錢			3錢

● 주치 및 효능

手足冷症，右癱左癱氣血大虛，產後手足痺證

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

●활투

- 1) 左癱(血虛) 加 桂枝, 白芍藥, 何首烏 各 2~3錢
- 2) 右癱(氣虛) 加 黃芪, 白朮 各2錢 半夏 1錢
- 3) 心悸, 不眠 合方 歸脾湯이나 溫膽湯
- 4) 消化不良 加 神麴, 砂仁, 麥芽, 山楂
- 5) 頭痛 加 天麻, 蔓荊子

益氣補血湯

薑 三 棗 二	紅 花	半 夏	甘 草	神 曲	白 茯 苓	陳 皮	香 附 子	山 查	桂 枝	枳 殼	牛 膝	川 芎	遠 志	麥 門 冬	白 芍 藥	當 歸	白 朮	黃 芪
	各 5 分			各 1 錢					各 1 錢									各 1.5 錢

●주치 및 효능

血行障礙로 인한 手足痺症, 麻木感, 眩暈

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

●주의 사항

發熱 또는 出血性 기질이 있는 환자는 주의 요함

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

약 100명 이상 경험있으며, 상기 증상 호전율이 좋음.

筋骨格系疾患 經驗方1

甘 草	麻 黃	羌 活	桂 枝	蒼 朮	白 芍 藥	當 歸	薏 苡 仁
各 2 錢				各 3 錢			5 錢

●주치 및 효능

四肢關節麻痛症

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

● 주의 사항

증상에 따라 3제 가량 복용.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

疎風活血湯加味方

紅 仙 桂 羌 蒼 南 黃 桃 木 牛 防 白 威 川 當 蒲 金
花 茅 枝 活 朮 星 柏 仁 瓜 膝 己 芷 靈 芎 歸 公 銀
仙 仙 英 花

炮

3 各
分 1
錢

各
三
錢

● 주치 및 효능

關節炎

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味二陳湯

薑 甘 香 貝 木 防 獨 蒼 防 枳 桂 烏 白 川 當 白 半 陳
草 附 母 香 風 活 朮 己 殼 皮 藥 芷 芎 歸 茯 夏 皮
子 苓 苓

3 各
片 等
分

● 주치 및 효능

歷節風 濕痰流注 肩背臂痛 腰脇痛 日夜不止 婦人殊效行步不得

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

虛弱人은 不可服用

疎風活血湯

生紅桂羌蒼南黃防白威川當
薑花枝活朮星柏己芷靈芎歸
仙

5 5 各
片 分 1
錢

● 주치 및 효능

류머티스 관절염. 일반 관절염에도 유효함

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 활투

手臂腫痛 倍桂枝 加 薏苡仁 3錢

脚痛 加 牛膝, 木瓜 1.5錢

痛甚 加 全蝎 5分

加味夏麻湯

薑甘黃乾梔黃竹澤遠天黃人枳神白麥酸白麥陳半元
三草柏薑子連茹瀉志麻芪蔘實麴茯門棗朮芽皮夏肉
棗
二
神冬仁

炒 炒

各 3 各 各
2 分 5 1
分 錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

神經性 全身痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

- ①大關節腫痛：大羌活湯
- ②小關節種痛：靈仙除痛飲
- ③大小關節腫痛：疎風活血湯
- ④無炎症性大小關節痛：烏藥順氣散

- 주치 및 효능
關節腫痛

筋骨格系疾患 經驗方2

桂 枝	烏 藥	甘 草	獨 活	羌 活	木 瓜	續 斷	杜 冲	白 茯 苓	元 肉	牛 膝	芡 仁	海 桐 皮	蒼 朮	薏 苡 仁
各 1 錢						各 1.5 錢				各 2 錢				

- 주치 및 효능
神經痛 關節炎
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.
- 주의 사항
·복용 중 피해야할 음식：鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

麻黃赤芍湯(方藥合編 靈仙除痛飲)

升 麻	當 歸 尾	甘 草	葛 根	川 芎	桔 梗	枳 實	片 苓	威 靈 仙	蒼 朮	白 芷	獨 活	羌 活	荊 芥	防 風	赤 芍 藥	麻 黃
								酒 炒								
各 3 分			各 5 分													各 1 錢

● 주치 및 효능

濕熱 流注 肢節痛(關節炎에도 效能良好)

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

심한 운동이나 활동, 냉수 샤워 금지

● 활투

下焦 加 酒黃柏

婦人 加 酒紅花

腫多 加 檳榔, 澤瀉

痛 加 乳香

瘀血 加 桃仁, 大黃

仙遺糧湯加減方

甘	蒼	木	金	防	威	木	薏	白	川	當	皂	土
草	朮	瓜	銀	風	靈	通	苡	鮮	芎	歸	莢	茯
			花		仙		仁	皮			子	苓
											切	
											片	
											微	
											炒	
2	各										7	1
分	5										分	兩
	分											

● 주치 및 효능

류머티스성 관절통, 全身神經痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

병이 오래된 자는 3개월 이상 복용

● 주의사항 : 土茯苓 減量不可

● 활투

氣虛者 加 人蔘

加味大防風湯

白 鹿 腎	紅 花 子	附 子	大 棗	生 薑	紅 花	甘 草	牛 膝	羌 活	人 蔘	川 芎	白 朮	杜 冲	防 風	黃 芪	熟 地 黃	芍 藥	當 歸
大 1 個	2 錢	5 分	1 錢		5 分	各 2 錢		1 錢	1 錢	1.5 錢	2.5 錢	各 2 錢			3 錢	各 2 錢	

● 주치 및 효능

慢性關節류머티스, 膝關節炎, 强直, 半身不遂, 脊髓炎, 産後脚氣 等

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 30분에 차게 해서 복용.

● 활투

痛症甚할 때 香附子 3錢 加入.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔, 熱食

疎經活血湯

草 龍 膽	白 芷	防 己	川 芎	防 風	茯 苓	羌 活	甘 草	威 靈 仙	桃 仁	陳 皮	牛 膝	蒼 朮	生 地 黃	白 芍 藥	當 歸
各 6 分		六 分			7 分	各 8 分			各 1 錢					各 1.5 錢	

● 주치 및 효능

痛風, 全身刺痛, 夜更甚者 또는 膝關節炎 初, 中期

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

이상의 용량은 當歸서부터 防風까지 5분씩 加하면 더욱 적당함

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 冷食, 綠豆

● 활투

痛甚者 加 乳香, 沒藥 各 8分

上身及臂痛者 加 肉桂 3分

下身及腿足痛者 加 黃柏, 木通, 薏苡仁 各 1錢

關節炎 加 南星 1錢

筋骨格系疾患 經驗方3

甘 紅 玄 香 五 當
草 花 胡 附 靈 歸
索 子 脂

各
1.5
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

走馬痰, 血痛, 手 혹은 脚이 甚히 따갑다 할 때, 이동하면서 아플 때

● 복용 용법·용량

酒水 각각 반으로 해서 달인 후, 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

便秘 加 大黃

加味歸鬚散

生 甘 桂 紅 桃 南 烏 蘇 赤 香 骨 川 乾 當
薑 草 心 花 仁 星 藥 木 芍 附 碎 芎 地 歸
藥 子 補 黃 尾

5
片

6
分

各
7
分

8
分

各
1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

打撲損傷, 瘀血, 骨折傷

● 복용 용법·용량

酒水 각각 반으로 해서 달인 후, 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

萬金湯

熟地 秦艽 獨活 川芎 甘草 川烏 草果 厚朴 人參 當歸 桂皮 細辛 牛膝 白茯苓 防風 杜仲 續斷

炮

各
5
分

各
1
錢

● 주치 및 효능

虛證의 좌골신경통, 관절염

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

關節炎 加 澤瀉 4g

清肝丸

全蝎 人參 柴胡 川芎 細辛 天麻 荊芥 防風 獨活 羌活 牛膽

南星
2.5
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

腰, 手, 足 捻挫. 打撲傷

● 복용 용법·용량

綠豆大糊丸하여 1일 1회에 5g씩 매 식후 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味腎氣湯

甘 草	肉 桂	香 附 子	牛 膝	川 芎	枸 杞 子	元 杜 冲	五 味 子	麥 門 冬	人 蔘	當 歸 身	白 芍 藥	牧 丹 皮	澤 瀉	白 茯 神	山 茱 萸	山 藥	白 朮	熟 地 黃
		鹽 炒								酒 炒							土 炒	九 蒸

各
1
錢

各
1.5
錢

各
1.25
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

元 黃
肉 芪

蜜
灸

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

腎虛症, 腰膝痠痛, 坐骨神經痛, 갱년기 장애

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30~40분에 따뜻하게 복용

● 환부

不妊 加 菟絲子, 覆盆子, 艾葉, 阿膠珠, 乾薑炮, 玄胡索, 吳茱萸 鹿茸 各1錢

消化障礙 加 神麴, 麥芽, 山楂, 乾薑炮, 梔子炒 各1錢

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

침구치료와 병행시 70~80% 이상 호전됨

筋骨格系疾患 經驗方4

甘 石 川 元 荊 木 肉 羌 威 烏 龜 白 玄 小 蒼 杜 續 牛 木
草 斛 芎 防 芥 香 桂 活 靈 藥 板 何 胡 茴 朮 冲 斷 膝 瓜
 風 仙 烏

去
油

酒
炒
去
絲

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

2.5
錢

全 細 川 草 桂
蝎 辛 烏 烏 枝

水
洗
去
鹽

各
5
分

7
分

1
錢

● 주치 및 효능

坐骨神經痛, 腰痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용.

1제면 통증과 좌골근이 부드러워지고 3제면 치료됨.

● 주의 사항

全蝎은 반드시 염기를 제거해야 함.

● 활투

痛甚者 加 沒藥, 乳香 1錢

當歸地黃湯

甘 山 肉 牛 當 枸 山 杜 熟
草 茱 桂 膝 歸 杞 藥 冲 地
萸 黃

炙

酒
洗

製

各
1
錢

1
~
2
錢

1.5
錢

各
2
錢

3
~
5
錢

● 주치 및 효능

腎虛腰痛, 腰痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

少陽人 加 黃柏 8分

下體虛寒 少陰人 加 附子 7分~2錢 또는 加 人蔘, 白朮

泄瀉 去 當歸, 帶濁 去 牛膝 加 金櫻子 2錢, 破故紙 1錢

手足痺癱 加 威靈仙 1錢

三氣飲加味方

細 甘 附 白 獨 肉 白 白 枸 當 大 烏 木 牛 杜 威 金 熟
辛 草 子 芷 活 桂 芍 茯 杞 歸 黃 藥 瓜 膝 冲 靈 雀 地
藥 苓 子 藥 茶 子

去
絲

7
分

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

坐骨神經痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

胃弱者는 주의할 것

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 蘿蔔

如神湯

薑	甘	桃	紅	蘇	小	木	香	陳	烏	赤	半	牛	川	乾	白	玄	杜	桂	當	土
三	草	仁	花	木	茴	香	附	皮	藥	茯	夏	膝	芎	地	芍	胡	冲	心	歸	續
棗					香		子			苓				黃	藥	索			尾	斷
二																				
	各													各						各
	1													1.5						3
	錢													錢						錢

● 주치 및 효능

挫閃瘀血腰痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味通經湯

薑	黃	知	羌	鹿	麥	烏	陳	秦	釣	防	木	續	地	牛	杜	白	白	當
三	柏	母	活	茸	門	藥	皮	朮	鉤	風	瓜	斷	黃	膝	冲	朮	芍	歸
棗					冬				藤									藥
二																		
	各					各												
	5					1												
	分					錢												

● 주치 및 효능

腰脚痛 및 四肢麻痺

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

2제 분량이면 치유됨.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵

● 활투

或加 五加皮 1錢, 紅花 6分

調榮活絡湯

小 茴 香	沒 藥	乳 香	桂 枝	羌 活	生 地 黃	紅 花	木 香	赤 芍 藥	川 芎	大 黃	桃 仁	當 歸	牛 膝
4 分	各 7 分		各 1 錢								1.5 錢	各 2 錢	

● 주치 및 효능

用力過度 腰脊閃痛 坐行不便 特效

● 복용 용법·용량

하루에 두 찻, 1일 3회, 식후 2시간 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

裏冷善泄者 去 大黃

加味當歸湯

杜 冲	蘇 木	香 附	牧 丹	紅 花	澤 瀉	烏 藥	桃 仁	川 芎	當 歸 尾
各 2 錢			各 3 錢						5 錢

● 주치 및 효능

瘀血腰痛

● 복용 용법·용량

酒水相半煎服으로 하고, 2찻으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 따뜻하게 복용.
10찻이면 효과 봄.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味五加皮地黃湯

半 夏	小 茴 香	白 芍 藥	川 芎	當 歸	白 朮	人 蔘	桑 寄 生	木 瓜	牛 膝	澤 瀉	白 茯苓	牧 丹 皮	山 茱 萸	山 藥	破 故 紙	杜 沖	五 加 皮	熟 地 黃 薑 砂 拌
法 製																		
各 1 錢													各 1.5 錢				各 2 錢	
生 薑	甘 草	威 靈 仙	砂 仁	玄 胡 索	續 斷	菟 絲 子	羌 活	獨 活	狗 脊	骨 碎 補	陳 皮							

3
片 各
1
錢

● 주치 및 효능

腎虛腰痛, 腰脚痛, 膝關節痛, 坐骨神經痛, 下體虛弱症, 行步難者 風寒濕因痛者

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔
身冷者, 年老者 加 肉桂, 附子 各 5分~1錢

加味桂枝湯

鹿 角	甘 草	大 腹 皮	百 合	燈 心	枸 杞 子	當 歸	肉 桂	桔 梗	薏 苡 仁	天 花 粉	白 茯苓	陳 皮	桂 枝
5 分	各 1 錢					各 1.5 錢					各 3 錢		4 錢

● 주치 및 효능

坐骨神經痛, 膝關節痛, 大腿後面引刺痛

●복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味立安散

紅 花	桃 仁	大 蜈 蚣	木 香	蘇 木	小 茴 香	杜 冲	玄 胡 索	肉 桂	當 歸	白 丑
		去 頭 炒 黃			炒	鹽 水 炒	炒			半 生 半 炒
各 2 兩		300 首	2.5 兩	各 5 兩						10 兩

●주치 및 효능

捻挫腰痛 氣滯脇引痛

●복용 용법·용량

이상을 산제로 하여 1일 3회 식사 전 30분에 2匙씩 물에 타(미숫가루처럼) 복용하고
적량의 술을 첨복함

●주의 사항

노약 또는 심한 운동은 삼가고 되도록 안정을 요함

大防風湯

大 棗	生 薑	人 蔘	威 靈 仙	蒸 炮 附 子	紅 花	續 斷	茴 香	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	木 瓜	防 風	黃 芪	當 歸	甘 草	白 朮	牛 膝
2 個	5 片	各 7 分						各 8 分			各 1 錢				1.2 錢	各 1.5 錢	

●주치 및 효능

디스크, 坐骨神經痛, 下肢無力症, 關節炎(퇴행성)

●복용 용법·용량

1일 2~3회로 식사 1시간 전 또는 식후 1시간에 복용

●주의 사항

감기환자(독감포함)는 절대 금함

●활투

氣血虛者 黃芪 倍加, 鹿角 加1~2錢

六子甘草湯

甘 楮 地 覆 決 蛇 菟
草 實 膚 盆 明 床 絲
子 子 子 子 子 子

各 各
2.5 3.8
錢 分

●주치 및 효능

腰痛, 坐骨神經痛, 下肢引痛 男性用. 女性 則 加味五積散有效

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

무리한 운동 및 노역을 삼감.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四六湯加味方

續 小 破 桃 木 牛 玄 肉 杜 白 川 當 澤 牧 白 何 山 山 熟
斷 茴 古 仁 瓜 膝 胡 桂 冲 芍 芎 歸 瀉 丹 茯 首 茱 藥 地
香 紙 索 藥 皮 苓 烏 萸 黃

酒 酒 酒
炒 炒 炒

薑
汁
炒

各
2
兩

各
3
兩

各
4
兩

甘 木 砂 獨 五
草 香 仁 活 加
皮

炒

3 1 1.4 各
兩 兩 兩 2
兩

● 주치 및 효능

腰痛

● 복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로 (재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

5제 가량 복용하면 쾌유됨.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菓

杜續湯

甘	威	骨	玄	白	防	桂	獨	羌	木	白	川	當	熟	菟	狗	牛	破	五	續	杜
草	靈	碎	胡	芷	己	枝	活	活	瓜	芍	芎	歸	地	絲	脊	膝	故	加	斷	冲
	仙	補	索							藥			黃	子			紙	皮		
5	各												各					各		
分	1												1.5					2		
	錢												錢					錢		

● 주치 및 효능

腰脚痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菓

加減三氣飲

烏 骨 雞	葱	生 薑	防 風	草 烏	紅 花	白 朮	五 加 皮	甘 草	羌 活	獨 活	肉 桂	白 芍 藥	白 茯 苓	枸 杞 子	當 歸	牛 膝	杜 沖	乾 地 黃
																		炒

1 首	3 本	1.5 錢	1 錢	3 錢	各 1 錢			1.3 錢	各 1 錢									3 錢
--------	--------	----------	--------	--------	-------------	--	--	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

● 주치 및 효능

無熱性關節炎, 慢性寒濕性 神經痛, 坐骨神經痛, 頸項痛, 肩臂痛 等

● 복용 용법·용량

烏骨雞(或은 鷄足 1kg)는 1제 분량. 위의 약을 24시간 이상 달여서 60봉 정도 만들어 1일 3회 복용함.

본 처방은 장복해야 되는데 草烏가 다량 들어 있어서 이의 독성을 제거하기 위하여 24시간 이상 다려야 하는 번거로움이 있으므로 다음과 같은 방법으로 탕전함.

1) 먼저 草烏 2kg, 甘草 900g, 防風 750g, 生薑 1kg, 참파(조선파. 대파는 아님) 1.5kg, 燒酒 10 l (대병 1개), 닭발 10kg 이상 준비

2) 이를 큰 가스 솥에 넣고 김을 자주 빼면서 24시간 이상 달임.

3) 압축하지 않고 팩으로 포장

4) 약찌꺼기는 乾燥시켜서 本方 1제 다릴 때 湯液과 찌꺼기를 1/10씩 넣고 3-4시간 다려서 복용함

● 주의 사항

고혈압환자 열성체질자도 부작용은 없었으나 주의를 요함

十全大補湯

砂 威 山 陳 牛 山 狗 續 紅 杜 如 十
仁 靈 查 皮 膝 茱 脊 斷 花 冲 五 全
仙 麥 萸 子 皮 補
湯
本
方

炒

各
7
分

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

腎虛腰痛 및 디스크, 무리한 노력으로 허리가 약해 거동이 불편할 때

● 복용 용법·용량

위 처방은 腎虛腰痛이나 디스크 수술 후, 회복이 잘 되지 않을시 복용하면 효과가 크다.

● 주의 사항

소꼬리를 넣어 달이면 더욱 효과 증가

五積散加味方

蘇 生 牧 桃 玄 甘 桂 半 白 當 川 茯 白 乾 枳 桔 厚 陳 蒼 香
木 薑 丹 仁 胡 草 皮 夏 芷 歸 芎 苓 芍 薑 殼 梗 朴 皮 朮 附
皮 索 各 2 各 1.5 各 2 藥 子
各 1.2 各 17 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩 兩
甘 桂 半 白 川 白 白
草 皮 夏 芷 芎 茯 芍
各 7
分

● 주치 및 효능

腰痛症, 坐骨神經痛

● 복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 활투

關節炎 加 金銀花 5錢

筋骨格系疾患 經驗方5

五 紅 陳 肉 當 續 杜
加 花 皮 桂 歸 斷 冲
皮

7	各	3	各
分	2	錢	5
	錢		錢

● 주치 및 효능

捻挫腰痛, 瘀血性腰痛

● 복용 용법·용량

酒水相半煎으로 하여 2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味檳蘇散

薑 甘 乳 陳 蘇 香 檳 威 羌 白 川 當 熟 杜 木 牛 五 蒼
草 香 皮 葉 附 榔 靈 活 芍 芎 歸 地 冲 瓜 膝 加 朮
子 仙 藥 黃 皮

3	各		各					各									各
片	5		1					1.2					1.5				2
	分		錢					錢					錢				錢

● 주치 및 효능

腰痛, 坐骨神經痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味如神湯

砂 仁	陳 皮	五 加 皮	續 斷	破 故 紙	牛 膝	菟 絲 子	山 茱 萸	小 茴 香	桃 仁	蘇 木	烏 藥	川 芎	乾 地 黃	赤 茯 苓	杜 沖	玄 胡 索	桂 皮	當 歸
各 1 錢															各 1.5 錢			
甘 草	青 皮	白 芥 子	木 香	羌 活	紅 花	木 瓜	山 查											
各 5 分				各 8 分		各 1 錢												

● 주치 및 효능

腰痛, 瘀血腰痛(神經痛)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

약 복용 후 배가 부글부글 거리거나 설사나면 1일 2회 줄여서 복용

加味疎風活血湯

薑 三 棗 二	甘 草	陳 皮	香 附 子	鬱 金	蒼 朮	骨 碎 補	防 風	獨 活	羌 活	五 加 皮	烏 藥	皂 角 刺	榆 根 白 皮	金 銀 花	薏 苡 仁	南 星	川 芎	當 歸
各 1.25 錢															各 3 錢			

● 주치 및 효능

四肢百節流注作痛 神經痛 關節炎 腰痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

獨活寄生湯

薑	鹿	甘	桂	防	細	秦	海	狗	骨	五	木	杜	牛	白	人	續	獨	熟	白	川	當
茸	草	皮	風	辛	朮	朮	桐	脊	擔	加	瓜	冲	膝	茯	苓	斷	活	地	芍	芎	歸
							皮		草	皮				苓				黃	藥		
3 片	1 錢	各 5 分					各 8 分											各 1.5 錢			

● 주치 및 효능

坐骨神經痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 2회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔, 콩나물, 두부, 숙주나물

筋骨格系疾患 經驗方6

甘	肉	防	細	生	秦	杜	牛	白	人	川	熟	續	桑	白	當	獨	附	木	木
草	桂	風	辛	薑	朮	冲	膝	茯	苓	芎	地	斷	寄	芍	歸	活	子	瓜	通
								苓			黃		生	藥					
各 5 分			各 1 錢									各 1.5 錢							

● 주치 및 효능

腰脚痛, 추간판탈출증, 좌골신경통

● 복용 용법·용량

1일 3회 빈속에 복용

15일분에 치료가 가능하고 수술을 요하는 환자는 2개월 정도 복용하고 완치도 가능함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

疎風活血湯加味方

細辛 白附子 川烏 紅花 桂枝 天南星 黃柏 澤瀉 赤茯苓 續斷 升麻 葛根 牛膝 元防風 威靈仙 川芎 羌活 蒼朮 當歸

法製

3分

各5分

各1錢

各2錢

● 주치 및 효능

腰痛, 坐骨神經痛, 臀部神經痛, 下肢神經痛, 項強痛, 肩痛, 膝關節炎, 顔面神經痛, 筋肉痛

● 복용 용법·용량

1첩 분량으로 1일 2첩을 煎하여 3회로 分服하되 식후 40분 후 복용

● 주의 사항

뜨겁게 먹지 말 것.

돼지기름, 닭고기기름, 고등어 등은 히스타민 성분이 있으므로 피하는 것이 좋음

● 참고사항

특히 좌골신경통, 요통, 둔부신경통, 하지신경통 등은 척추맞사지운동을 아침·저녁으로 10~20회 정도하면서 복용하면 효과가 높음.

* 척추맞사지 운동-갈개를 깔지 않은 방바닥에 앉되 손을 각지 긴 채 양발목 복숭아뼈 발목을 끌어안는다. 발목을 끌어 안은 상태에서 머리쪽, 발쪽으로 10~20회 굴린다.

加味雙和湯

木瓜 牛膝 神麴 蘇葉 甘草 桂皮 黃芪 川芎 當歸 熟地 山茱 枸杞 杜冲 續斷 白芍 藥

酒炒

各1錢

2.5錢

● 주치 및 효능

척추디스크, 坐骨神經痛

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

3~5제면 효과 봄.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

筋骨格系疾患 經驗方6

附 肉 補 山 杜 山 白 熟
子 桂 骨 茱 冲 藥 朮 地
脂 萸 黃

鹽
水
炒

各
5
分

1
錢

1.5
錢

各
2.5
錢

5
錢

●주치 및 효능

腎虛腰痛

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

加味如神湯

甘 黃 紅 獨 桃 牛 桂 杜 當 玄
草 柏 花 活 仁 膝 心 冲 歸 胡
索

炒

各
1
錢

各
1.5
錢

●주치 및 효능

挫閃腰痛 舉重及勞傷腰痛

●복용 용법·용량

酒水相半煎 1일 3회 식사 전 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

葱 白	薑 香	乳 仁	砂 草	甘 皮	陳 葉	蘇 附 子	香 櫛 子	威 靈 仙	羌 活	白 芍 藥	川 芎	當 歸	熟 地 黃	杜 冲	木 瓜	牛 膝	蒼 朮	五 加 皮
														鹽 水 炒		酒 洗		
3 莖	3 片	5 分	各 1 錢							各 1.25 錢				各 1.5 錢			各 2 錢	

●주치 및 효능

坐骨神經痛

●복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

●활투

汗多者는 去 葱白, 蘇葉 加 南星炮 一錢

加味大防風湯

黃 柏	知 母	鹿 角 上	當 歸	木 瓜	牛 膝	防 風	小 茴 香	破 故 紙	元 杜 冲	白 芍 藥	黃 芪	熟 地 黃	桑 寄 生	烏 藥	陳 皮	蒼 朮	海 桐 皮	續 斷
								酒 炒										
各 5 分		各 1 錢										各 1.2 錢						1.8 錢

紅甘附 花草子

3 各
分 5
分

● 주치 및 효능

腰痛 및 腎虛腰痛, 坐骨神經痛 症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

심한 환자라도 2~3제 복용하면 효과 봄

● 주의 사항

특히 冷한 飲食, 鷄, 猪, 酒(맥주), 음료수, 生鮮, 커피, 맵고 짠 음식 等を 禁함.

특히 神經성인 것이 있거나 消化력이 약한 자는 熟地黃을 빼고, 龍眼肉이나 法黃精을 가함.

疎經活血湯加味方

甘 紅 木 木 龍 香 天 白 白 防 羌 川 陳 威 桃 牛 蒼 乾 當 白
草 花 瓜 通 膽 附 南 茯 芷 風 活 芎 皮 靈 仁 膝 朮 地 歸 芍
草 子 星 苓 仙 黃 藥
炒

5 8 各
分 分 1
錢

各
1.5
錢

2.5 3
錢 錢

黃
柏

5
分

● 주치 및 효능

腰腿痛症

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

建中湯加味方

乳 附 杜 牛 細 桂 甘 白
香 子 冲 膝 辛 枝 草 芍
藥

各 各 1.5 各 5
5 1 錢 2 錢
分 錢

● 주치 및 효능

坐骨神經痛

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

順氣湯

甘 白 桂 川 紅 乾 枳 桔 厚 陳 白 白 當 防 五 木 牛 杜 續 蒼
草 芷 皮 芎 花 薑 殼 梗 朴 皮 茯 芍 歸 風 加 瓜 膝 冲 斷 朮
苓 藥 皮

炒

各 各 各 2
8 1 1.5 錢
分 錢 錢

● 주치 및 효능

腰痛 및 下肢神經痛(瘀血로 인한 諸般痛症)

● 복용 용법·용량

1일 3회, 1회 1첩

● 활투

腰痛 下肢痛(저림증 포함)甚 加 蒼朮, 續斷, 杜冲(炒), 牛膝, 木瓜 各1錢, 紅花 5分

加味通順散

神	木	甘	枳	蘿	杜	桂	當	烏	小	白	白	木	赤	續
麴	香	草	殼	菴	冲	皮	歸	藥	茴	何	芷	通	芍	斷
				子					香	首			藥	
									烏					
炒				炒	炒									酒炒

各
8
分

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

腰痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 빈속에 따뜻하게 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減六味地黃湯

紅	枳	枸	厚	陳	木	白	白	肉	黃	甘	白	人	乾	澤	牧	山	山	熟
花	殼	杞	朴	皮	瓜	茯	芍	桂	芪	草	朮	蔘	薑	瀉	丹	茱	藥	地
		子				苓	藥								皮	萸		黃
5 分	各 1 錢																	3 錢

● 주치 및 효능

坐骨神經痛, 10種 腰痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

1제 ~ 3제 복용

●주의 사항

과로를 피하고 과도한 성생활을 절제해야 됨

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

수백명의 치료 경험이 있으며, 치료율이 좋은 편.

白芍木瓜湯

蜈蚣	全沒	乳香	甘草	木瓜	牛膝	杜冲	鷄血藤	續斷	威靈仙	白芍藥
各 8 分	各 1.2 錢	各 3 錢					各 3.8 錢			15 錢

●주치 및 효능

요통, 추간판탈출증

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

최소 1제 ~ 9제(평균 3제) 복용으로 효과 봄.

●주의 사항

복용 후 泄瀉시 加 白朮 3.8錢, 白茯苓 2.5錢

如神養營湯加味方

大棗	生薑	甘草	小茴香	砂仁	枸杞子	桂皮	玄胡索	續斷	陳皮	破故紙	川芎	川牛膝	杜冲	白芍藥	當歸	白朮	熟地黃
										鹽水炒			炒				
2 枚	3 片	5 分	各 7 分		各 1 錢							各 1.5 錢				各 2 錢	

●주치 및 효능

挫閃 및 筋肉虛弱性 腰痛 (오래 앉아 있으면 나타나는 통증)

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●활투

痰結 加 二陳湯

腰背引痛 加 枳殼, 桔梗 各 1錢

痛症甚 加 乳香, 沒藥 各 7分~1錢, 獨活, 羌活 1錢

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

허리의 통증에 이전에는 五積散 또는 檳蘇散 계통을 多用했으나, 오래 앓아서 나타나는 통증에는 이 처방이 효과가 좋음. 60~70%정도 유효했음.

加味四物湯

甘 草	乳 香	陳 皮	蘇 葉	香 附 子	檳 榔	威 靈 仙	羌 活	白 芍 藥	川 芎	當 歸	熟 地 黃	杜 冲	木 瓜	牛 膝	蒼 朮	細 辛	五 加 皮
各 5 分		各 8 分										各 1 錢			各 1.5 錢		

●주치 및 효능

坐骨神經痛. 腰推異常으로 인한 下肢引痛

●주의 사항

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

이 처방을 사용하여 좌골신경통 환자를 치료한 경험 많으며, 肥滿한 자에게 효과 많음.
복용자의 80%이상이 1제 정도에 효과를 보았음.

加味三氣飲

甘 草	白 芷	獨 活	白 芍 藥	白 朮	枸 杞 子	當 歸	烏 藥	木 瓜	續 斷	牛 膝	威 靈 仙	山 茱 萸	山 藥	巴 戟	熟 地 黃
各 7 分		各 1 錢		各 1.2 錢								各 1.5 錢		2 錢	3 錢

●주치 및 효능

腰痛, L-추간판탈출증

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

2~3個月 복용

● 주의 사항

소화장애가 있는 환자는 신중히 사용해야 함.

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

거의 모든 환자에게서 상당히 양호한 치료효과를 보였으며, 수술을 안하고도 통증없이 생활가능한 경우가 50%이상임.

加味五積散

葱 薑 甘 桂 半 白 川 白 白 乾 當 枳 桔 厚 陳 麻 蒼
 白 草 皮 夏 芷 芎 苳 薑 歸 殼 梗 朴 皮 黃 朮
 苓 藥

薑
製

酒
炒

3
本
以
上

3
片

6
分

各
7
分

各
8
分

各
1
錢

2
錢

+

● 주치 및 효능

坐骨神經痛, 風, 寒, 濕 腰脚痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 환투

(1) 外傷으로 인하여 본병으로 轉移되었을 경우에는 本方 去麻黃 加 桃仁, 紅花酒洗,

玄胡索, 小茴香炒, 杜冲酒炒, 續斷, 牛膝, 木瓜, 防風, 各1錢 全蝎粉末 三分

(2) 風, 寒, 濕으로 인하여 본병이 되었을 경우에는 本方에 加 杜冲, 續斷, 牛膝, 木瓜,

防風, 獨活, 小茴香炒, 狗脊, 石斛 各1錢, 全蝎 粉末 3分

(3) 퇴행성 변화로 인한 노약자에게는 三氣飲, 大防風湯 등에 가감한다.

加味舒經湯

薑 附 官 威 天 獨 半 南 川 當 防 羌 桂
子 桂 靈 麻 活 夏 星 芎 歸 風 活 枝
仙

3
片

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

● 주치 및 효능

老人肩臂痛 手不舉氣血凝滯

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 차게 해서 복용.

● 주의 사항

附子, 南星, 半夏는 필히 法製하여서 사용하며 극히 허약한 사람이나 胃腸病이 있는 자는 금함.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味開結舒經湯

生 附 木 甘 半 南 羌 蒼 川 當 烏 香 陳 蘇 牛 威 桂
薑 子 瓜 草 夏 星 活 朮 芎 歸 藥 附 皮 葉 膝 靈 枝
子

炮 炒

薑 炒
法
製

酒
炒

3
片

3
分

各
5
分

各
1
錢

1.5
錢

● 주치 및 효능

肩臂痛

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

20~60첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減逍遙散

附子 生薑 甘草 連翹 金銀花 熟地黃 白芥子 半夏 陳皮 柴胡 桑枝 桂枝 秦艽 白芍藥 當歸

炮 九蒸 製 酒洗

3分 各1錢 各1.5~2錢 各1.5錢 各2錢

●주치 및 효능

肩關節炎으로 인한 疼痛 (어깨가 쭈시면서 아리는 통증)

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

환자당 10첩 ~ 30첩 사용

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

환자수 80명 이상으로 높은 치료율을 보임

葛根加附子地黃湯

大澤茯炮麻蒼麥甘生芍桂熟葛
棗瀉苓附黃朮門草薑藥枝地根
子 冬 黃

炙

3개 3분 8분 各1.5錢 2.2錢 3錢

●주치 및 효능

肩臂痛, 項強, 背痛, 口眼喎斜, 鼻塞

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 차게 복용

● 주의 사항

內熱이 있는 자는 복용 후, 口乾 호소(附子로 인해)

導痰除濕湯

生 甘 白 玄 黃 木 香 南 枳 青 陳 白 半 川 獨 羌
薑 草 朮 胡 柏 瓜 附 星 殼 皮 皮 茯 夏 芎 活 活
索 子 苓 茶

5 各 各 各
片 5 1 1.5
分 分 錢 錢

● 주치 및 효능

- ① 肩痛, 背痛(寒濕性) 或 腰部와 脇部로의 流注痛
- ② 祛風濕 而 舒筋活絡

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

20첩 ~ 40첩 내외로 복용 권유

● 활투

· 平素 胃虛者 : 白屈菜와 消導之劑 併用

白芥子, 竹瀝, 威靈仙, 桂枝, 白芍藥 등 隨意加減

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

현재 정확한 사용횟수는 알 수 없지만(자세히 추적해 본 바 없음) 만성적인 어깨결림 환자나 특히 운전을 많이 하는 자가 복용시에는 좋은 효과를 보인다.

連翹湯

防 甘 薄 黃 皂 防 蘇 赤 木 威 桔 枳 前 柴 獨 羌 金 連 蒼
己 草 荷 芩 角 風 葉 茯 瓜 靈 梗 殼 胡 胡 活 活 銀 翹 朮
刺 苓 茶 仙 花 2 3
各 各 錢 錢 錢
5 1
分 錢

● 주치 및 효능

膝腫浮(무릎 붓고 무릎 관절염)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

5~10제 복용으로 치료

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味八珍湯

大 生 木 覆 獨 五 牛 甘 白 白 白 黃 何 杜 熟 白 川 當
 棗 薑 瓜 盆 活 加 膝 草 朮 朮 朮 芪 首 冲 地 芍 芎 歸
 子 皮 茶 烏 黃 藥

炒

炒 酒
炒

炒

炒 酒
炒

炒

2 3 5 各
枚 片 分 1
錢

各
1.5
錢

●주치 및 효능

全身關節諸筋의 急症과 筋痙攣, 諸筋引縮 等症

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 2회 식사 후 2시간에 복용.

3~5제 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

·복용하면 좋은 음식 : 소, 돼지뼈곰탕

·복약과 겹해서 할 운동 : 슬관절통증의 경중에 따라 매일 걷기운동을 2~3차례 할 것

加減大補湯

香砂陳五大木威牛肉黃甘龍白白白川當木薏桂
附仁皮加腹通靈膝桂芪草眼茯朮芍芎歸瓜苡枝
子皮皮仙

或熟地黃

各
2
錢

各
3
錢

大生附沒玄鹿紅枸山乳杜澤
棗薑子藥胡角花杞藥香冲瀉
索子

2
枚

3
片

各
1
錢

各
1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

膝痛, 下肢腫痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 차게 해서 복용.

● 주의 사항

發熱, 頭痛이 있는 자는 먼저 발열두통의 원인을 치료하고난 후 본 처방을 이용해야 함.

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

월 20명 이상 치료하고 있으며, 대상자마다 1~3제 복용 시 70%이상 호전을 보이고 있음.

加味四物湯

生 薑	甘 草	木 瓜	防 己	威 靈 仙	神 麴	山 查	檳 榔	杜 冲	破 故 紙	骨 碎 補	白 芷	白 芍 藥	川 芎	當 歸	金 銀 花	牛 膝
5 片	各 8 分				各 1 錢							各 1.5 錢			2 錢	3 錢

● 주치 및 효능

右膝部 腫痛 (부으면서 疼痛이 있거나 소리가 나고 아무 이유 없이 아플 때)

● 복용 용법·용량

煎湯 或 糊丸하여 1일 3회 1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

위산이 많거나 위장치료를 받았던 환자는 속이 쓰릴 수 있으니 이때는 환약 으로 해서 치료함

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

우측 무릎 아픈 환자분들 치료시 애용하는 처방으로 200명 이상 중 150명 정도. 75%정도의 치료율을 갖고 있다.

金液丹

● 주치 및 효능

骨髓炎

● 제조방법

硫黃 數斤을 무쇠솥에 끓여 액체가 된 후에 淸冷水에 부어 고체가 된 후에 물기를 건조한 후에 다시 끓여 위와 같이 반복 7차한다. 이것을 대강 搗碎하여 알맞은 항아리에 넣어 黃土로 새끼줄과 반죽하여 덮개 막은 공간을 새끼줄로 여러 번 뒤감은 다음 왕겨에 불을 피워 一晝夜에 걸쳐 항아리 속 硫黃을 녹인 다음 다시 고체가 될 때 까지 식힌 다음 그것을 黃土 땅에 일주일간 파묻어 두었다가 꺼낸 후 세말하여 糊丸梧子大한다.

● 복용 용법·용량

1회에 30-40丸씩 복용

解濕湯

甘 車 附 肉 木 牛 杜 白 芡 薏
草 前 子 桂 瓜 膝 冲 朮 仁 苡
子

各
1
錢

各
2
錢

各
5
錢

● 주치 및 효능

腰脚痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

十六味流氣飲加味方

桔 甘 木 枳 白 檳 烏 防 白 厚 官 川 當 黃 人 蘇 牛 金
梗 草 香 殼 芍 榔 藥 風 芷 朴 桂 芎 歸 芪 蔘 葉 蒡 銀
藥 子 花

3
分

各
5
分

各
1
錢

1.5
錢

2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

骨膜炎

● 복용 용법·용량

처음에 6첩을 복용시키면 身熱이 덜해지고 환자에게 생기가 생긴다.

중기가 완전히 化膿하도록 지속적으로 복용하여 표피가 황색으로 되면 刺鍼하여 膿血을 짜내고 膏藥을 매일 갈아붙이고 소독하여 치료한다.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

① 筋骨格系疾患 經驗方8 ② 加味不換金正氣散

※ 祛風, 去痰, 氣血 촉진하는 처방

葱 薑 甘 川 細 白 半 桂 防 薑 海
白 草 烏 辛 殭 夏 枝 風 黃 桐
蠶 皮

湯
泡

2 5 各 各 1.5 各 3 5
本 片 5 1 錢 2 錢 錢 錢
分 錢

※ 위장이 약한 분이 手陽明經絡으로 동통이 있는데 사용하는 처방

大 薑 甘 半 藿 陳 厚 蒼 薑 桂
棗 草 夏 香 皮 朴 朮 黃 枝

2 3 5 各 各
個 片 分 1 2
錢 錢

● 주치 및 효능

肩臂痛

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

承長湯

升 滑 石 赤 獨 羌 細 蔓 知 川 蒼 赤 防 桂 柴
麻 石 膏 茯 活 活 辛 荊 母 芎 朮 芍 風 枝 胡
苓 茶 子

2 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各 各
分 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 錢

● 주치 및 효능

骨髓炎(附骨疽) 諸病腫毒

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

二十二味飛步湯

海 土 川 防 蒼 獨 五 小 破 威 牧 烏 白 木 土 杜 牛 骨 金
 桐 半 芎 風 朮 活 加 茴 古 靈 丹 藥 茯 瓜 續 冲 膝 碎 毛
 皮 夏 皮 香 紙 仙 皮 苓 斷 補 脊

鹽 酒
 酒 浸
 炒 乾

各
 1
 錢

2
 錢

棗 薑 甘 白 何
 草 芷 首
 烏

3 3 5 各
 枚 片 分 1
 錢

●주치 및 효능

腰脚痛-虛損 腰脚酸軟疼痛 并 風寒濕氣 麻木不仁 及 打撲跌損 行步困難, 坐骨神經痛,
 腰脚疼痛麻痺, 關節炎

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

과중한 勞役, 夫婦關係를 피해야 함.

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味通順散

生 甘 穿 黃 連 半 南 白 獨 木 山 當 金
薑 草 山 芪 翹 夏 星 芷 活 通 赤 歸 銀
 甲 芍 花
 藥

醋
炒

5 5分 各
片 1 錢

5
錢

● 주치 및 효능

骨髓炎

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

僧庵白麴湯

神 當
麴 歸

各
1 兩

● 주치 및 효능

落傷瘀血 全身不遂

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

5첩내에 효과 봄.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

加味八珍湯

砂 丹 南 蒼 木 厚 當 川 白 熟 甘 白 白 人 桂 牛
仁 蔘 星 朮 瓜 朴 歸 芎 芍 地 草 茯 朮 蔘 枝 膝
藥 黃 苓

炮

各
1
錢

各
1.5
錢

1.5
~
3
錢

2
~
3
錢

● 주치 및 효능

轉筋

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 전 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

杜冲湯

破 白 熟 元
古 朮 地 杜
紙 黃 冲
5 各 5
分 2.5 錢

● 주치 및 효능

小兒下肢 偏麻痺

· 소아 : 16~17세에서 아침에 잠을 깨고 나서 편마비로 특이한 병증 없고, 인체도 실한데, 四肢無力한 경우

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

3일정도 복약

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

제13장 피부 및 피하질환

1. 피부질환

大柴胡湯

半	枳	芍	黃	柴	生
夏	實	藥	苓	胡	地
					黃
1	1.5	各		各	
錢	錢	2.5		4	
		錢		錢	

● 주치 및 효능

面浮似癰瘡(不可以皮風治)

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

피부로 치료하면 안 됨

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

升麻胃風湯

甘	薄	黃	梔	荊	犀	黃	石	蒼	當	白	防	天	金	桔	升	葛	陳	香	玄
草	荷	連	子	芥	角	芩	膏	朮	歸	芷	風	花	銀	梗	麻	根	皮	附	蔘
					鎊							粉	花					子	
各						各									各				
5						1									1.7				
分						錢									錢				

● 주치 및 효능

顔面, 胃風面腫(여드름증)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒. 특히 자극성 飮食, 짠 것, 커피, 생선 등

荊芥三白湯

甘 草	薄 荷	地 骨 皮	白 茯 苓	白 朮	柴 胡	木 通	連 翹	白 芍 藥	當 歸	荊 芥
各 1 錢			各 1.5 錢							

- 주치 및 효능
手掌發癬(손바닥버짐), 手掌皮膚脫皮症
- 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味消風湯

連 翹	甘 草	木 通	知 母	石 膏	牛 蒡 子	胡 麻 子	蟬 退	蒼 朮	苦 蔘	生 地 黃	當 歸	防 風	荊 芥
				炒	炒 研	炒 研		炒					

- | | | |
|--------|-------------|-------------|
| 1
錢 | 各
5
分 | 各
1
錢 |
|--------|-------------|-------------|
- 주치 및 효능
皮膚搔痒症 (皮風)
 - 복용 용법·용량
2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.
 - 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

加減益氣湯

黃 連	枳 實	柴 胡	升 麻	陳 皮	檳 榔	山 查	牛 蒡 子	蟬 退	玄 蔘	防 風	甘 草	連 翹	白 朮	黃 芪	當 歸	金 銀 花
各 5 分				各 1 錢									各 1.5 錢			2 錢

● 주치 및 효능

소아 아토피성 皮膚질환, 皮膚搔痒症

● 복용 용법·용량

수시로 조금씩 조금씩 자주 먹인다.

5세 미만은 하루에 팩 2개 정도, 7세 이상은 팩 3개

● 주의 사항

鷄, 猪, 라면, 우유, 과일, 음료수 등 금함.

잘 때 약 찌꺼기를 환부에 발라주면 아주 좋다.

加味八物湯

黃 柏	黃 連	草 豆	枳 實	柴 胡	防 風	甘 草	白 茯 苓	山 查	陳 皮	藿 香	益 母 草	香 附 子	白 朮	熟 地 黃	白 芍 藥	川 芎	當 歸	連 翹	金 銀 花
各 5 分		各 1 錢									各 1.5 錢								3 錢

● 주치 및 효능

女性皮膚搔痒症, 두드러기, 여드름(面疱)

● 복용 용법·용량

食間服用

● 주의 사항

鷄, 猪, 酒, 麵과 우유, 과일, 음료수 등등 금함.

약 찌꺼기를 밤에 잘 때 환부에 발라주면 아주 좋다.

加味連翹飲

白 蒺 藜 連 翹 當 歸 川 芎 赤 芍 藥 乾 地 黃 荊 芥 防 風 牛 蒡 子 炒 黃 芩 瞿 麥 木 通 白 芷 天 花 粉 麥 門 冬 甘 草 燈 心

10 莖	各 7 分
---------	-------------

2
錢

● 주치 및 효능

治婦人全身瘙癢 又如松葉刺痛 又治產後風熱瘡癩

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

• **복용 중 피해야 할 음식** : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

加味消風散

枳實	熟地黃	乾地黃	牛蒡子	白鮮皮	石膏	白朮	樺皮	玄蔘	荊芥	甘草	赤茯苓	防風	升麻	黃芩	白芷	桔梗
3錢								各2錢								各1錢

麥門冬	柴胡	梔子	白殭蠶	厚朴	陳皮	浮萍草	紅花	蟬退
						各1錢		各5分

● 주치 및 효능

건선 및 알레르기성 피부염, 두드러기

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

중증 3제 이상 복용, 경증 1제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔, 생선(등푸른 생선, 굴, 낙지, 오징어, 문어, 게, 생선회일체)

洗皮散

石 石
硫 雄
黃 黃
二 一
錢 兩

● 주치 및 효능

皮膚病, 白斑症

● 복용 용법·용량

각 분말하여 혼합.

오전 9시경에 先酒一盃飲酒後 患部에 醋로 麻布로써 擦之後 粉末藥을 발라준다.

1일 1회 3일간 발라주고 나면 15일 후에 보면 없어진다.

● 주의 사항

신약을 발라 피부가 타서 벗겨져도 그 밑에 또 白斑症이 생기나 이 약을 사용하면 된다.

加味犀角升麻湯

生	甘	牛	乳	枳	蟬	犀	荊	黃	白	當	升	葛
薑	草	蒡	香	實	退	角	芥	芩	芍	歸	麻	根
		子				鎊			藥			
3 片	各 5 分			各 1 錢		各 1.5 錢					各 二 錢	

● 주치 및 효능

癰疹, 瘙痒

● 복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味荊敗散(湯)

薑 三 棗 二	地 骨 皮	甘 草	薄 荷	天 麻	赤 茯 苓	川 芎	桔 梗	枳 殼	獨 活	羌 活	前 胡	柴 胡	黃 芩	白 芷	金 銀 花	連 翹	防 風	荊 芥	魚 腥 草
	1 兩	各 2 兩													各 4 兩				6 兩

●주치 및 효능

諸皮膚病 癢痒 久不愈

●복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

아래 丸藥과 함께 복용하면 더 효과있음.

防 風	豨 薟	白 蔞	苦 參	荊 芥	白 何 首 烏
各 半		各 1 斤			2 斤

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 一切 脂肪飮食

何金湯

薄 荷	蔓 荊 子	熟 地 黃	甘 草	紅 花	木 瓜	厚 朴	澤 瀉	蒼 朮	白 朮	金 銀 花	葛 根	五 味 子	何 首 烏
各 2 錢										各 4 錢			

●주치 및 효능

癰疹

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔, 脂肪質

加味敗毒散

生 穿 蜜 竹 梔 黃 薄 甘 赤 川 桔 枳 獨 羌 前 柴 芒 大 連 金
 薑 山 葉 子 芩 荷 草 茯 芎 梗 殼 活 活 胡 胡 硝 黃 翹 銀
 甲
 炒

各
3
片

少
許

7
片

各
5
分

各
1
錢

2
錢

5
錢

● 주치 및 효능

丹毒, 帶狀疱疹, 溫熱胸腫

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

3~5첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 - 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

浮萍湯

甘 麻 荊 赤 川 當 浮
 草 黃 芥 芍 芎 歸 萍
 穗 藥

各
2.5
錢

● 주치 및 효능

白癬

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

3제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味防風通聖散

梔 子	白 朮	荊 芥	芒 硝	連 翹	薄 荷	麻 黃	大 黃	赤 芍	川 芎	當 歸	桔 梗	黃 芩	石 膏	五 加 皮	金 銀 花	玄 蔘	樺 皮	白 鮮 皮	牛 蒡 子	甘 草	滑 石
各 5 分								藥			各 8 分			各 1 錢						1.5 錢	2 錢

●주치 및 효능

象皮症(皮膚가 象皮狀을 띄는 병), 諸皮膚病

●복용 용법·용량

分作 20帖. 2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

皮膚科疾患 經驗方1

防 風	白 蛇 瘡	艾 葉	檳 榔	五 倍 子	地 榆 子	蒼 耳 子
	子			子	子	子
各 等 分						

●주치 및 효능

一切 皮膚病

●복용 용법·용량

煎水를 1일 2회 朝夕으로 皮膚에 바름(外用)

●주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

枳通飲

玄 蔘	樺 皮	防 風	荊 芥	木 通	地 膚 子	枳 實
					子	
各 1 錢				3 錢	5 錢	1 兩

●주치 및 효능

癰疹

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

약 복용하면 더 발생했다 치료됨

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清血除濕補皮散

薑 甘 薄 白 地 蒼 當 連 防 皂 枇 金 豨 魚 蒼 牛 熟 蒼 薏 玄 榆
 三 草 荷 鮮 榆 朮 歸 翹 風 角 杷 銀 萆 腥 耳 莠 地 耳 苡 蓼 根
 棗 皮 子 葉 花 草 子 子 黃 子 仁 白
 二 皮

炒

各
1
錢

各
1.2
錢

各
2
錢

各
2.5
錢

3.7
錢

●주치 및 효능

急慢性 濕疹, 아토피

●복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

●주의 사항

복약 중 술, 지방질 있는 음식 특히 豚肉을 금함.

하절기는 땀이 많이 나므로 피부관리에 유의함.

●참고

※ 丸제方

薏苡仁 3錢 苦蓼 1.2錢 榆根白皮 玄蓼 蒼朮 麥芽 甘草 各1錢

爲末糊丸 五味子大

·복용법 : 1일 2~3회, 1회 30~40개 식사 전 빈속에 복용. 환약은 물약을 복용하면서
 복용하면 약효가 빠르며 위의 탕약이 끝난 후, 환약을 장복하면 근본치료에 좋은 약임

清風湯

甘 木 胡 蟬 蒼 苦 生 當 防 荊 知 石 牛
草 通 麻 退 朮 蔘 地 歸 風 芥 母 膏 蒡
 仁 黃 子
 炒 煨 研

各
5
分

各
2
錢

3.5
錢

● 주치 및 효능

身痒難忍 或 如虫行 搔把見血 或 風熱痒疹 皮膚紅白痒症 或 顆成片

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

5~7첩 복용케 하며, 심한 자는 그 이상 복용.

● 주의 사항

허약한 자는 복용에 신중을 기해야 함.

胡麻散加味方

天 犀 樺 連 玄 桔 升 葛 蟬 薄 白 甘 枳 石 防 威 荊 苦 胡
麻 角 皮 翹 蔘 梗 麻 根 退 荷 蒺 菊 實 菖 風 靈 芥 蔘 麻
 藜 蒲 仙

各
1
錢

2.5
錢

黃 梔 皂 麥 天 牛 黃 江 白
芪 子 角 門 門 蒡 芩 芍 殭
 刺 冬 冬 子 藥 蠶

各
1
錢

● 주치 및 효능

全身瘙痒, 아토피성 피부염

● 복용 용법·용량

소아는 양을 줄이고 3세-5세는 1첩용 3-5일에 복용.

장기간의 복용은 금하며, 소양증이 소실되면 복용을 중지한다.

● 주의 사항

기름에 튀긴 음식, 닭튀김, 핫도그, 자장면, 돼지고기, 고등어, 콜라, 커피, 아이스크림
금함. 된장국, 야채, 나물을 많이 먹을 것. 肝熱이 있는 자는 금한다.

加味四物湯

荊	地	白	熟	川	當	生
芥	榆	芍	地	芎	歸	地
		藥	黃			黃
炒	炒					
黑	黑					

各	2
1	錢
錢	

● 주치 및 효능

紫斑性 出血病. 血熱로 인한 紫斑

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 전 빈속에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

● 활투

숙지황을 빼고 쓸 수도 있으며, 有熱에는 더욱이 그렇게 하는 것이 좋다.

加味升葛湯

玄	連	防	荊	甘	赤	升	葛	牛	樺
蔘	翹	風	芥	草	芍	麻	根	蒡	皮
					藥			子	
各								3	5
1								錢	錢
錢									

● 주치 및 효능

癰疹

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

2~3제 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

無樺皮 代金銀花 3錢

● 참고

다른 유효처방

- 荊防敗毒散 加天麻, 薄荷, 蟬退 各 1錢(清肌散), 浮萍草 各 5錢

溫清飲(四物湯 合 黃連解毒湯)

黃 連	黃 柏	梔 子	黃 芩	川 芎	白 芍	熟 地	當 歸
各 8 分		1 錢	各 1.5 錢			各 2 錢	

● 주치 및 효능

皮膚癢痒症, 濕疹, 面疱, 口瘡

● 복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

만성질환에는 40첩 이상 복용하면 양호

● 주의 사항

위 처방은 만성피부질환에 잘 듣는다. 피부혈열로 인하여 피부가 건조하고 황갈색을 띠며 긁으면 출혈이 잘 되고 癢痒이甚하며 上氣가 잘 되는 체질에 적합하며 안면이 창백하고 貧血虛冷한 者나 농이 많이 배출되는 滲出性 피부염에는 적당하지 않다.

凉膈散火湯

防 風	荊 芥	知 母	石 膏	薄 荷	梔 子	連 翹	忍 冬	生 地 黃
各 1.5 錢							各 3 錢	

● 주치 및 효능

各種 皮膚疾患

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味當歸飲子(湯)

蟬 退	人 蔘	黃 芩	五 味 子	牛 蒡 子	麥 門 冬	桔 梗	甘 草	白 鮮 皮	芍 藥	黃 芪	陳 皮	茯 苓	元 肉	白 朮	熟 地 黃	川 芎	當 歸
			酒 炒				炙		酒 炒								
2 分	各 5 分			5 ~ 8 分	各 8 分				各 1 錢								各 1.5 錢

●주치 및 효능

潤澤皮膚, 아토피 皮膚炎

●복용 용법·용량

2첩으로 (재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

便滑者は 1일 2회 복용하고, 當歸의 양을 감한다.

●주의 사항

식이요법- 유제품 或 계란, 닭고기 등을 피함.

●상기 환자의 경험 및 치료 실적

100명 이상의 치료경험이 있으며, 80%이상에서 양호 결과를 얻었음.

生血清涼湯

滑 石	胡 麻 子	蒼 耳 子	豨 薟 皮	白 鮮 皮	蟬 退	陳 皮	白 朮	蛇 床 子	梔 子	赤 芍 藥	荊 芥	土 防 風	黃 芩	連 翹	苦 蔘
各 1 錢														2 錢	

白 附 子	沒 藥	甘 草	白 蒺 藜
各 5 分			各 1 錢

● 주치 및 효능

皮膚疾患一切 - 濕疹, 白癬, 아토피성 皮膚炎, 面疱

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味養胃湯

白 豆 蔻	甘 草	草 果	砂 仁	木 香	神 麴	白 茯苓	半 夏	厚 朴	陳 皮	香 附 子	山 查	蒼 朮
各 8 分					各 1 錢					1.5 錢	各 2 錢	

● 주치 및 효능

소화기의 虛弱으로 인한 胎熱(아토피 피부염)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

發熱時 加 葛根 2錢

搔痒 加 蟬退 或 樺皮 1~2錢 浮萍草 2錢

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

한 제 먹고 1년 후 완치된 경우와 한 제 먹은 후 호전된 경우도 많았음. 빠른 아이들은 2~3제로 완치된 경우도 있고, 치료율은 60~70% 정도로 봄.

排紅四物湯

白 赤 當 紅 桃 五 烏 荊 防 柴
 殭 芍 歸 花 仁 味 梅 芥 風 胡
 蠶 藥 子

各
 1.2
 錢

● 주치 및 효능

癰疹, 慢性癰疹, 風熱及瘀血性 蕁麻疹

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

犀角消毒飲

甘 赤 黃 連 金 眞 防 荊 牛
 草 芍 芩 翹 銀 犀 風 芥 蒡
 藥 花 角 子

5
 分

各
 1
 錢

1.5
 錢

各
 2
 錢

4
 錢

● 주치 및 효능

皮膚斑疹, 瘙癢

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 참고

天水散을 겸용하면 더욱 좋음. 天水散은 티스푼 한 스푼 정도로 1일 2회 오전 11시와 오후 5시에 복용

加味地黃湯

大 生 甘 澤 牧 白 山 山 何 淫 五 熟
 棗 薑 草 瀉 丹 茯 茱 藥 首 羊 味 地
 苓 萸 莢 烏 藿 子 黃

2
 個

3
 片

各
 3
 分

各
 5
 分

1
 錢

● 주치 및 효능

남자 年少者 圓形脫毛症

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

皮膚科疾患 經驗方2

沒 乳 月 大
藥 香 石 楓
(礪 子
砂)

去
油

各 4 0.5
2 兩 斤
兩

● 주치 및 효능

癩病

● 복용 용법·용량

粉末作丸(每兩當 10丸作)하여 1일 3회 1회 1환씩 복용.

눈썹, 피부재생

● 주의 사항

大楓子是 去油하지 않으면 頭痛이 유발됨.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

皮膚科疾患 經驗方3

甘 貝 黃 梔 桑 荊 苦 連 白 川 黃
草 母 芩 子 白 芥 蔘 翹 芷 芎 連
皮

各
1
錢

●주치 및 효능

粉刺症(中高生 여드름)

●복용 용법·용량

水煎服. 完快까지 連服

●주의 사항

服藥中 補藥이나 六味 等を 禁食. 體質이 虛弱하거나 腹冷者는 禁.

十味敗毒散加味方

生 甘 荊 川 桔 連 防 樺 獨 柴 茯
薑 草 芥 芎 梗 翹 風 皮 活 胡 苓

各
3
分

各
8
分

1
錢

●주치 및 효능

봄 환절기 피부병

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

皮膚科疾患 經驗方4

甘 大 甘 白 肉 玄 蒼 白 赤 牧 川 大 柏 蓮 白 薏 何
草 腹 菊 附 桂 蔘 朮 殭 芍 丹 芎 薊 子 苳 苡 首
皮 子 蠶 藥 皮 仁 肉 神 仁 烏

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

●주치 및 효능

面上瘡癤

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

3개월가량 복용하면 효과보임.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

皮膚科疾患 經驗方5

附 紫 草 防 葛 白 川 大 赤 乾 桂 橘 蒼 黃 尾 白
子 草 果 風 根 芷 芎 薊 芍 薑 枝 皮 朮 芪 蔘 茯苓

炮

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

寒冷性 allergy

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 차게 하여 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

五封散

砒 艾 白 硫 水
霜 葉 礬 黃 銀

2 0.5 0.5 1 4
兩 斤 斤 斤 兩

● 주치 및 효능

疹瘡, 頭瘡濕疹

● 복용 용법·용량

외용으로 환부에 도포함.

● 제조법

硫黃-細末 和上記水銀同研 色變爲靑黑,

白礬-上記 銀黃에 均和作末

砒霜-爲細末 艾葉層層에 散之

右銀반 黃末에 食醋 適宜注入하여 泥塗于甕器하고 이 웅기를 艾葉上에 덮고 艾葉에 點火하여 웅기상의 泥塗한 은반황이 마르는 것을 刮取 細末함.

眞油에 調製하여 患處에 塗함

蒙首散

信	密	胡	石	五	枯
石	他	椒	硫	倍	白
	僧		黃	子	礬
3	5	1	2	3	4
分	分	錢	錢	錢	錢

- 주치 및 효능

疥瘡

- 복용 용법·용량

가루로 내어 참기름(또는 들기름) 一鍾에 달여서 전신에 다 바름

神化飲

連	牛	防	骨	當	玄	黃	金
翹	膝	己	碎	歸	蔘	芪	銀
			補				花
各			3	各			1
2			錢	5			兩
錢				錢			

- 주치 및 효능

走馬痰(骨膜炎) 惡瘡不愈

- 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

- 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味四物湯

甘	金	牛	連	黃	紅	玄	黃	當	白	川	熟
草	銀	蒡	翹	芩	花	蔘	芪	歸	芍	芎	地
	花	子							藥		黃
各						各		3	各		5
1						2		錢	2.5		錢
錢						錢			錢		

- 주치 및 효능

濕疹

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

密陀僧散

密
陀
僧
10
兩

●주치 및 효능

腋臭症

●복용 용법·용량

쌀가루로 빵떡을 만들어 찌어(蒸)가지고 쌀떡에 密陀僧末을 담뿍 묻혀서 腋臭症에 하루동안 붙여둠. 약 4~5회 반복하면 근절됨

胡麻散

甘	白	蔓	甘	牛	石	防	威	白	荊	苦	胡
草	蒺	荊	菊	蒴	菖	風	靈	何	芥	蔘	麻
	藜	子		子	蒲		仙	首			
								烏			
	炒			炒							

各
7
分

●주치 및 효능

皮膚病, 滲出性濕疹 癢痒 瘡疥及 紫白癬風

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

5일이면 효과 나타남.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

清熱瀉心湯

藁 白 牛 連 生 青 石 赤 麥 甘 黃 黃
 本 芷 蒨 翹 地 皮 菖 茯 門 草 連 芩
 子 黃 蒲 苓 冬
 去
 心

各
8
分

各
1
錢

- 주치 및 효능
顔面濕疹
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

養胃飲

甘 唐 貢 澤 陳 蒼 唐 枳
 草 木 砂 瀉 皮 朮 山 實
 香 仁 査
 各 2 5 1
 1 錢 錢 兩
 錢

- 주치 및 효능
傷食으로 인한 癰疹
- 복용 용법·용량
2첩으로 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
3첩 복용
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味荊翹湯

甘 秦 石 細 桔 白 山 黃 枳 柴 白 川 當 防 連 荊
 草 朮 菖 辛 梗 芷 梔 芩 殼 胡 芍 芩 歸 風 翹 芥
 蒲

5 各
 分 1
 錢

● 주치 및 효능

耳部腫痛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

제14장 중독, 처치에 의한 특정 질환

1. 火傷 湯火傷 諸解毒

大黃赤石脂散

赤 大
石 黃
脂
各
等
分

● 주치 및 효능

湯火傷

● 복용 용법·용량

大黃과 赤石脂를 各等分하여 細末한다. 가루를 환처에 뿌리는데 湯火傷 즉시 뿌리면 가장 좋다. 물기가 없으면 바세린을 바르고 뿌려 놓으면 화독이 없어지고 딱지가 생겨서 떨어지면 흉터없이 치료 되는 약

● 주의 사항

딱지가 생겼을 때 떼지 않고 약을 계속 뿌림

消丹飲

甘	桔	黃	升	生	麥	玄
草	梗	芩	麻	地	門	蔘
				黃	冬	
1	各			各		2
錢	2			1		兩
	錢			兩		

● 주치 및 효능

화상 및 蛇毒, 각종 虫毒

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

重症일 경우, 수시로 복용, 1제 ~ 3제까지 복용

보통 1제로 치유 가능함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔, 육식, 생선(등푸른 생선, 굴, 낙지, 오징어, 문어, 게, 생선회일체)

좋은 야채 및 과일음식 -미나리, 양파, 수박, 토마토, 참외.

神聖膏

大 斑 沒 乳 全 瓜 寶 附 肉 白 白 川 草												
戟 猫 藥 香 蝎 蕒 豆 子 桂 薸 芫 烏 烏												
					仁							
各					各						1	2
2.5					5						兩	兩
錢					錢							

● 주치 및 효능

金刀傷 腫瘡 疔瘡 發際瘡 背瘡 無名腫瘡 等

● 복용 용법·용량

주로 종기에 붙이는 고약임

上藥眞油一升浸 一宿後煎至烏色 去滓入黃丹十二兩 以柳棍槐棍不住水 滴水成珠後 去火 毒用之若用內腫 此藥入綠豆末相和爲丸 服之卽差

加味解毒湯

柴 升 陳 當 甘 白 人 梔 黃 黃 黃 黃												
胡 麻 皮 歸 草 朮 蔘 子 柏 芩 連 芪												
			身									
各		各		各			各				1.5	
3		5		1			1.25				錢	
分		分		錢			錢					

● 주치 및 효능

漆毒

● 복용 용법·용량

이 약을 달여서 먹을 때 계란 노른자 1개를 약에 타서 복용하면 잘 낫는다.

大黃	1兩
계란흰자	2介

● 주치 및 효능

火傷 및 湯傷, 金刃傷 등

火毒 및 瘡毒등을 제거하고 이들로 痛症을 완화 또는 없애고 정상적인 皮肉을 생기게 하여 흉터없이 치료함. 통증의 완화는 도포한지 10분이내에 나타나면 3도 화상인 경우 (부위가 크지 않으면) 2주안에 상처 치유됨

● 복용 용법·용량

大黃을 부드러운 가루로 만든 후, 계란 흰자로 반죽하여 상처부위에 2mm두께로 도포한 다음 붓대로 감아줌. 약 2시간 간격으로 약제가 건조해지면 깨끗한 물로 씻어내고 갈아 다시 도포하여 상처가 완전히 아물고 흉터가 없어질 때까지 계속한다. 계란 흰자는 피부를 통해 흡수 될 수 있는 크림제로 대용이 가능하다.

● 주의 사항

오랜 병이나 출산 또는 본래 기력이 허약한 자는 상처가 아물지 않고 진물이흐를 염려가 있으므로 되도록 피함.

加味葛花解酲湯

葛根 葛花 人蔘或紅蔘 白朮 砂仁 白豆蔻 神麴 良薑 澤瀉 陳皮 白茯苓 木香 白扁豆 青皮 甘草 草果

炙

各8分

各1錢

各3錢

● 주치 및 효능

酒毒

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 2회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

葛花解酲湯

猪 甘 木 赤 澤 神 青 陳 砂 白 白 人 葛
 苓 草 香 茯 瀉 曲 皮 皮 仁 豆 朮 蔘 花
 苓
 炒

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

3
錢

●주치 및 효능

酒滯, 酒毒, 脂肪肝

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味對金飲子

甘 麥 神 砂 草 山 良 厚 葛 陳 蒼
 草 芽 曲 仁 荳 查 薑 朴 根 皮 朮
 蔻
 炒 炒

各
1
錢

各
2
錢

各
3
錢

4
錢

●주치 및 효능

酒毒

解酒毒 健胃 消化

●복용 용법·용량

1일3회 식후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

人蔘養胃湯加味方

大	生	炙	草	人	藿	赤	半	厚	陳	蒼	葛	良
棗	薑	甘	果	蔘	香	茯	夏	朴	皮	朮	根	薑
		草				苓						
2	3	5		各		各				1.5	各	
個	片	分		1		1.2				錢	2	
				錢		錢					錢	

●주치 및 효능

酒傷(속이 불편하고 회복이 안 될 때)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方1

처방1)

片 附 人 薑
鹿 子 蔘

1.5 1 1 1
兩 兩 兩 마
리

처방2)

苦 生 熟
蔘 地 地
黃 黃

各
4
錢

● 주치 및 효능

蛇咬傷，全身骨節柔軟，無氣力

● 복용 용법·용량

처방1로 원기를 회복시킨 후, 처방2를 6첩가량 복용시킴.

六和湯

香薷	厚朴	赤茯苓	藿香	白扁豆	木瓜	砂仁	半夏	杏仁	人蔘	甘草	麥門冬	天門冬	桔梗
	各15錢				各1錢								各7分

● 주치 및 효능

全身水疱(농약중독, 직사광선)

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味對金飲子

甘草	蒼朮	厚朴	元砂仁	赤茯苓	神麴	葛根	陳皮
					炒		

8 分	各 1 錢			2 錢	3 錢
--------	-------------	--	--	--------	--------

● 주치 및 효능

酒傷

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

이 약을 복용시에 百草霜분말 5分가량을 함께 복용.

10 ~ 20첩 복용

火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方2

甘	白	白	金
草	礬	芷	銀
			花
2	3	5	3
錢	錢	錢	兩

● 주치 및 효능

毒蛇蛇咬傷

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 1시간에 복용

3~9일 복용하면 전신에 만연된 독기가 풀림을 알 수 있음.

● 주의 사항

白礬은 분말로 하지 않으면 효과없음.

毒血을 제거한다고 수술이나 침술을 하는 것은 해로우니 약만 쓸 것. 발

제15장 孕期에 기원한 특정 질환

1. 新生兒疾

沆瀣丹

枳 薄 檳 赤 連 滑 黑 黃 黃 大 川
殼 荷 榔 芍 翹 石 丑 柏 芩 黃 芎
藥

酒
蒸

各
4.5
錢

各
6
錢

各
9
錢

● 처방의 출전

幼幼集成方

● 주치 및 효능

胎病, 胎毒, 胎熱

● 복용 용법·용량

各爲細末調均蜜丸 芡實大月內兒一丸 乳汁或茶清化下
1歲兒 1丸~2丸, 2歲兒 1日 2~3丸

● 주의 사항

열이 없는 冷症, 虛弱兒, 久病에는 금기함

加味甲己湯

陳 神 忍 釣 天 青 灸 白
皮 麴 冬 鉤 麻 皮 甘 芍
藤 藤 草 藥

5
分

各
1
錢

2
錢

4
錢

● 주치 및 효능

小兒 諸證(小兒 熱多 筋肉硬直 則驚氣 消化不良....)

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 후 30분에 복용

소아의 연령에 따라 용량 조절.

● 환투

兼感冒 加 葛根 2錢, 蘇葉 1錢, 黃芩 0.5-1.0錢

제16장 건강 상태 및 관리

1. 건강관리

健康管理 經驗方1

牛膝	石菖蒲	遠志	土川芎	覆盆子	枸杞子	車前子	土山茱	巴戟天	唐木香	柏子仁	生山藥	肉蓯蓉	栗白茯苓
酒浸乾燥		薑製去骨	去油				黃酒浸蒸	酒浸去心				酒浸蒸乾燥	
1.4兩	各2兩			各4兩				各6兩					8兩

● 주치 및 효능

補陰, 補陽, 潤心肺, 血壓降下

● 복용 용법·용량

1일 2회 식사 후 30알 ~ 40알씩 복용

약 6개월이상 복용함

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味六味地黃湯

甘 五 麥 陳 半 柏 酸 石 遠 川 當 澤 白 牧 山 山 熟
草 味 門 皮 夏 子 棗 菖 志 芎 歸 瀉 茯 丹 茱 藥 地
子 冬 仁 仁 蒲 苓 皮 萸 黃
炒

各
5
分

各
1
錢

各
1.5
錢

各
2
錢

4
錢

● 주치 및 효능

記憶力 補強 특히 受験生 心不安症

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菓

清心補養湯

或 甘 黃 紅 升 藁 獨 白 防 桂 澤 白 香 陳 白
加 草 柏 花 麻 本 活 芷 風 枝 瀉 茯 附 皮 朮
鹿 苓 子 芩 薈
茸

鹽
水
炒

5
分

各
5
分

各
7
分

各
1
錢

2
錢

● 주치 및 효능

高三者 頭不清 四肢疲勞 飲食失節 氣虛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

● 활투

便秘 加 檳榔, 榆根白皮 各1錢

運氣學에 少陰君火體나 太陰濕土體, 厥陰風木體質은 人蔘 1錢 加하면 더 좋음

加味聰明湯

菖蒲	遠志	木香	貢砂仁	甘草	肉桂	人參	黃芪	白芍藥	川芎	當歸	白朮	陳皮	白茯苓	香附子	山藥	元肉
各5分				各1錢										各1.5錢		2錢

● 주치 및 효능

受驗生의 頭不清 四肢疲勞 飲食失節 氣虛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加減雙補湯

枸杞子	甘草	肉桂	杜冲	人參	黃芪	車前子	覆盆子	菟絲子	白朮	白芍藥	川芎	當歸	澤瀉	牡丹	白茯苓	山茱萸	山藥	元肉
各1錢																		2錢

● 주치 및 효능

成人 元氣不足

● 복용 용법·용량

식후 1시간

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

健康管理 經驗方2

陽起石	川芎	菟絲子	白朮	鹿角膠	龜板膠	人參	巴戟	杜冲	牛膝	牡丹皮	白茯苓	山茱萸	山藥	肉蓯蓉	枸杞子	虎骨	當歸	熟地黃	白芍藥
醋煨九次必																		酒製	

各3兩																		4兩	6兩
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----

麝香	川椒	木香	肉荳蔻	乾薑	砂仁	丁香	草果	遠志	石菖蒲	肉桂	附子	柏子仁	澤瀉	毛磁石	車前子	覆盆子	破故紙	麥門冬	天門冬
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5錢	1兩	各1.4兩		各2兩
----	----	-------	--	-----

●주치 및 효능

陽虛者

補陽氣百倍 陰陽氣不足 新陳代謝秘法

●복용 용법·용량

末作蜜丸 梧子大하여 1일 3회 50丸씩 빈속에 복용

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

八物湯加味方

益母草	白朮	砂仁	枸杞子	甘草	鹿茸	陳皮	香附子	黃芪	白茯苓	白朮	人蔘	元肉	白芍藥	川芎	當歸
5分		各7分	各1錢												

● 주치 및 효능

小兒虛弱

● 복용 용법·용량

나이를 고려하여 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

大補湯加味方

附子	鹿茸	鹿角	仙茅	楮實	枳實	陳皮	香附子	山藥	肉桂	黃芪	甘草	白茯苓	白朮	人蔘	熟地黃	白芍藥	川芎	當歸
5分																		

● 주치 및 효능

陰陽俱虛 元陽不足

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

1제 정도 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿蔔

● 활투

胃弱 加 砂仁, 山查, 神曲, 麥芽, 熟地黃 換 元肉

加味十全大補湯

鹿茸	黃芪	砂仁	麥芽	枸杞子	山藥	肉桂	大棗	生薑	龍眼肉	芍藥	川芎	當歸	甘草	茯苓	白朮	人蔘
各1錢								1.5錢	女1.5錢 / 男1錢				男1.5錢 / 女1錢			

● 주치 및 효능

陰陽俱虛

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

20첩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

加味大補湯

五味子	虎脛骨	杜冲	鹿茸	大附子	巴戟	山茱萸	山藥	牛膝	元肉	肉桂	人蔘	白茯苓	白朮	黃芪	熟地黃	白芍藥	川芎	當歸身
	乳炙	薑炒	乳炙					酒浸					炒	鹽炒	酒浸	酒炒		酒洗
						各2兩			各3兩									3.5兩
甘草	貢砂仁	豨薟	唐木香	紅靈砂	黃精	石菖蒲	淫羊藿	陽起石	肉苁蓉	陳皮	覆盆子	枸杞子	龜板	菟絲子	破故紙			
					酒洗								乳炙	酒浸	鹽炒			
各8錢						各1兩												

● 주치 및 효능

陰陽俱虛

● 복용 용법·용량

蜜丸 梧子大하여 1회 50丸씩 복용

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菈

清腦聰明元

甘	貢	人	石	遠	酸	龍	當	白	白
草	砂	蔘	菖	志	棗	眼	歸	茯	朮
	仁		蒲		仁	肉		神	
			土						

炙

去 炒
骨

去
油

各
2
兩

8
兩

● 주치 및 효능

高3 및 고시생의 頭不清 四肢疲勞 飲食失節 氣虛

● 복용 용법·용량

蜜丸 梧子大하여 1일 3회 1회에 40丸씩 食遠服

2제 분량.

加味雙和湯

甘	乾	桂	五	菟	川	當	黃	熟	鹿	人	白
草	薑	皮	味	絲	芎	歸	芪	地	角	蔘	芍
			子	子				黃			藥
				法							
				製							

各
5
分

各
1.5
錢

各
2
錢

2.5
錢

● 주치 및 효능

氣血俱傷 疲勞가 甚할때

● 복용 용법·용량

1일 3회 식사 전 빈속에 복용.

● 활투

1) 胃潰瘍, 氣血共虛 合 不換金正氣散(한방내과학)加 砂仁, 白芫荽, 木香, 人蔘

2) 피로가 극도로 심할 때 增 甘草 1錢 5分-2錢

3) 肩臂痛, 四肢關節痛 加 羌活, 防風

4) 陽痿, 精力不足 加 枸杞子 5錢 何首烏 3錢

5) 消化不良 去 熟地黃 加 元肉, 山查, 白朮, 陳皮, 砂仁

6) 酒色傷 精力不足 倍雙和湯 加 淫羊藿 5錢, 附子 1錢

加味補中益氣湯 合 生脈散

柴	升	甘	五	陳	當	白	人	麥	黃
胡	麻	草	味	皮	歸	朮	蔘	門	芪
			子					冬	
								去	
								心	

各
8
分

各
1
錢

各
2
錢

3
錢

● 주치 및 효능

治虛勞太甚, 飲食失節, 各種病前後虛弱

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 주의 사항

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

陰陽雙補湯

杜 蓮 車 覆 菟 枸 五 澤 牧 山 山 黃 白 白 白 當 川 黃 元
 冲 肉 前 盆 絲 杞 味 瀉 丹 茱 藥 柏 朮 茯 芍 歸 芎 芪 肉
 子 子 子 子 子 子 子 皮 萸 藥 苓 藥 芎 肉

鹽
炒

各
1
錢

鹿 甘 人 桂
 茸 草 蔘 皮

各
1
錢

- 주치 및 효능
虛勞
- 복용 용법·용량
2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.
- 주의 사항
· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆

四物加葛根解肌湯

大 甘 生 桔 白 升 石 羌 赤 黃 柴 葛 熟 白 川 當
 棗 草 薑 梗 芷 麻 膏 活 芍 芩 胡 根 地 芍 芎 歸
 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥 藥

2 8 1 各
 個 分 錢 1.5
 錢

各
2
錢

- 주치 및 효능
全身痛症, 疲勞, 倦怠

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 30분에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

十全大補湯

大 棗	生 薑	甘 草	玄 胡 索	茸	乾 薑	肉 桂	香 附 子	茯 苓	白 朮	人 參	川 芎	白 芍 藥	大 薊	當 歸	熟 地 黃	黃 芪
2 個	3 片	各 5 分		各 1 錢				各 1.5 錢								2 錢

●주치 및 효능

왜소하면서 허약, 감기 잘 걸리고, 산후, 유산후 팔다리 관절 시리며
消化器 不良한 사람의 두통, 어지러움, 편두통

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

제17장 기타 질환

1. 기타 질환

加味歸脾湯

桂 威 杜 木 巴 牛 遠 酸 防 地 升 當 白 香 黃 人 熟 荊 白
 枝 靈 冲 瓜 戟 膝 志 棗 風 榆 麻 歸 茯 附 芪 蔘 地 芥 朮
 仙

各
1.5
錢

3 各
錢 7 錢

大 生 甘 木 鹿 桑 蓮 甘 蘿 乾
 棗 薑 草 香 茸 螵 子 草 菹 薑
 蛸 肉 子
 炒 炒

2
個

3
片

各
8
分

1
錢

各
4
~
5
個

各
1.5
錢

●주치 및 효능

不安, 不眠, 過敏, 胸痞, 眩氣, 肝炎, 嘔斜, 手顫, 顔面振,
 小兒驚氣, 小兒麻痺, 言語不正, 癡呆, 半身不遂

●복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菹

金銀花湯

鷄	山	赤	白	天	甘	牧	大	皂	當	紅	草	金
	梔	芍	芍	花	草	丹	黃	角	歸	花	烏	銀
	子	藥	藥	粉		皮		刺	尾			花
1 마 리	各 3 錢				各 5 錢			各 7 錢			各 1 兩	

● 주치 및 효능

瘀血性 疾患

● 복용 용법·용량

닭 1마리 배속에다 金銀花湯 1침만 넣고 달여서(물을 15~20사발 정도) 2~3 사발 정도로 달인 약을 처음 복용 시 커피 잔으로 1/2잔, 그 다음부터는 1잔씩 1일 3~4회 복용

● 주의 사항

- 1) 술을 만취상태에서 복용치 말 것
- 2) 너무 뜨겁게 하여 복용치 말 것
- 3) 임의대로 다른 약재를 가미하지 말 것

加味五積散

甘	乾	桂	半	白	川	枳	桔	白	白	當	厚	陳	山	香	蒼
草	薑	皮	夏	芷	芎	殼	梗	茯	苓	歸	朴	皮	查	附	朮
								苓	藥				肉	子	
各 7 分								各 1 錢					各 1.5 錢		

● 주치 및 효능

胃腸炎, 子宮虛弱冷症, 感傷寒, 腰痛, 慢性 心臟病

● 복용 용법·용량

2침으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 환투

感傷寒 加 麻黃 1錢, 白葱 2本(소화불량이나 감기가 오래 가는 증)

挫閃 瘀血疼痛 加 茴香 檳榔 桃仁 紅花 各1錢

胃腸과 子宮虛弱者腰痛 加 杜沖 續斷 牛膝 茴香 各1錢, 破古紙 7分 紅花 3~5分

腎虛腰痛 加 熟地黃 枸杞子 杜沖 各1錢, 破古紙 7分

經來小腹痛 加 蒲黃 玄胡索 牡丹皮 各1錢

加味四物湯

當 歸	川 芎	白 芍	熟 地	紫 檀 香
各 2.5 錢				3 錢

● 주치 및 효능

各種 出血의 止血제

諸般 止血作用

● 복용 용법·용량

2첩으로(제당포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

6첩분량 복용

● 활투

甚則 加紫 丹香 五錢

陰虛吐血 六味 加 玄蔘, 白芍藥, 麥門冬 各2錢, 地骨皮, 五味子 各1錢 尤效

吐血 四物湯 加 黃芪, 人蔘 3錢, 防風 1錢

衄血 四物 加 黃芪 5錢, 防風 5錢

經水過多不止 四物 加 白朮, 黃芩, 阿膠, 茯苓, 梔子, 地榆, 荊芥, 香附子, 甘草 各1錢

孕婦胎動不安下血不止 四物 加 艾葉, 黃芩, 阿膠 各1錢

便血無論前後 四物 加 黃芪, 砂仁, 杏仁 各1錢, 連翹, 黃芩 各5錢

肺腎受傷吐血 六味地黃湯 加 麥門冬 2錢, 阿膠 1.5錢

加味清熱瀉火湯

甘 草	黃 柏	知 母	梔 子	木 通	石 膏	柴 胡	毛 黃 連	黃 芩	川 芎	當 歸	赤 芍	生 地	麥 門 冬
													去 心
各 5 分			8 分		各 1 錢								2 錢

● 주치 및 효능

諸熱症.(특히 上焦熱)

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

·복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

九味羌活湯 加減方

生 甘 細 石 赤 陳 半 黃 生 白 川 防 羌 蒼
 薑 草 辛 膏 茯 皮 夏 芩 地 芷 芎 風 活 朮
 茶 黃
 炙

3 各 各 各 各 各 3
 片 5 1 1.2 1.7 2 錢
 分 錢 錢 錢 錢 錢

●주치 및 효능

上熱, 胸滿, 惡心, 眩暈 등의 諸般 火熱證에 痰飲증상이 있는 경우
 瀉火, 祛痰, 清熱

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

●주의 사항

實熱證에 사용하므로 虛證, 寒證에는 사용하지 않는다.

加味柴胡加龍骨牡蠣湯

大 生 黃 鈞 大 白 黃 白 桂 人 牡 龍 半 柴
 棗 薑 連 鉤 黃 芍 芩 茯 枝 蔘 蠣 骨 夏 胡
 藤 藥 苓 茶
 各 1.5 2.5
 錢 錢 錢

●주치 및 효능

心下有膨滿感, 寒熱往來, 煩悶易驚, 小兒夜啼症, 痙攣症, 神經性 心悸亢進症, 便秘, 高血
 壓, 動脈硬化症, 頭痛, 眩暈

●복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

有熱上氣 去 人蔘

煩悶易驚 加 朱砂 5分 兼服

頭痛眩暈 加倍 釣鉤藤

便秘 加 草決明 2錢, 大麻仁 1錢

● 상기 환자의 경험 및 치료 실적

상기 증상에 執症을 잘 하여 투여하면 효과가 좋다. 요즘 스트레스가 누적되어 일어나는 신경질환을 치료하는데 적합한 처방이고 기효율이 70% 이상인 거 같다.

柴胡桂枝湯

甘 大 生 芍 人 黃 桂 半 柴
草 棗 薑 藥 蔘 苓 枝 夏 胡

5 各
分 1
錢

各
2
錢

● 주치 및 효능

感氣, 關節炎, 急性腎盂炎, 急性膽囊炎, 急性膽石症, 胃痙攣, 脾臟炎

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 2시간에 복용.

● 활투

膽囊腫大 痛症 甚 加 金銀花, 梔子 各 7分

胃痙攣時 去人蔘,

心下 惡心 痙攣 甚 加 枳實, 芍藥 各 1錢

疎風神佑丸

龍腦 浮萍 白僵蠶 川芎 草烏 川烏 麻黃 赤芍藥 檳榔 使君子 雷丸 蕪荑 天麻 全蝎 甘草 大楓子
去油

各
1
兩

各
1.2
兩

1.5
兩

3
兩

30
兩

白芥子 雀舌 當歸 續斷 秦艽 白蒺藜 石雄黃 白芷 薄荷 蒼朮 胡麻子 威靈仙 羌活 蟬退

各
7
錢

各
8
錢

皂角刺 何首烏 枸杞子 荊芥 細桂枝 白附子 苦參

3
錢

各
4
錢

6
錢

●주치 및 효능

痔疾, 神經痛 結核性關節炎 慢性皮膚病

●복용 용법·용량

· 제법 : 研末大靑粉糊爲丸

단, 大風子は 연말하여 기름짜는 기계로 기름을 제거하면 편리함. 川烏는 炮하여 썰.
草烏는 童便浸하여 충분히 除毒하여야 한다.

· 용량 : 성인 1회 30환씩 하루 2회 복용함.

단 시간은 오전 10시와 오후 10시경에 가장 적합함.

即食後와 空服時를 避하여 食間服으로함.

(※ 痔疾에는 10日 ~ 30日간 복용함.

기타 慢性癩疾에는 3개월 ~ 2년간 장기복용 할 수 있음)

古庵心腎湯

甘 牧 黃 牛 龜 枸 山 黃 澤 當 鹿 白 山 生 熟
 草 丹 連 膝 板 杞 茱 柏 瀉 歸 茸 茯 藥 地 地
 皮 子 萸 神 黃 黃

鹽
水
炒

各
5
分

各
8
分

1
錢

各
1.5
錢

● 주치 및 효능

腎虛有熱, 怔忡, 盜汗, 遺精, 婦人産後, 感氣後虛汗, 惡寒, 手足冷, 齒根痛, 齒出血

● 복용 용법·용량

2첩으로(재탕포함) 1일 3회 식사 후 1시간에 복용.

● 주의 사항

본 처방은 약을 湯할 때 진하게 달여야 한다.

· 복용 중 피해야할 음식 : 鷄, 猪, 酒, 麵, 綠豆, 蘿菔

처방명 색인

----- 가 -----

加減丹粉丸	10
加減大補湯	396
加減三氣飲	378
加減蔘蘇飲	97
加減小柴胡湯	212
加減逍遙散	393
加減柴胡湯	240
加減雙補湯	437
加減雙和湯	192
加減五積散	272
加減六味地黃湯	250, 388
加減益氣湯	406
加減調經湯	282
加減種玉湯	305
加減增味二陳湯	157
加減地黃湯	218, 265, 357
加減八物湯	72
加減八味帶下方	290
加減敗毒散	96
加減香蘇散	98
加減荊防敗毒散	46
加味葛花解酲湯	428
加味甘桔湯	90, 97
加味甲己湯	433
加味開結舒經湯	392
加味祛風散	29
加味祛風湯	63
加味健脾湯(蔘朮健脾湯 加減方)	174
加味健胃湯	148
加味桂芍湯(桂枝防風湯 加減方)	80
加味桂枝湯	374
加味藿正散	108
加味藿香正氣散	2, 161
加味交加散	106

加味君子湯	18
加味芎歸湯 1	347
加味芎歸湯 2	347
加味歸脾湯	17, 151, 244, 445
加味歸鬚散	367
加味歸茸湯	34
加味橘皮飲	326
加味起枕散	339, 345
加味金沸草散	75
加味金仙飲	129
加味金水六君煎	118
加味丹皮散	187
加味當歸飲子(湯)	416
加味當歸湯	373
加味大羌活湯	60
加味對金飲子	225, 429, 431
加味大防風湯	366, 385
加味大補湯	62, 123, 360, 440
加味大柴胡湯	213, 236, 239
加味大柴胡湯1	215
加味大柴胡湯2	220
加味導痰湯	56
加味苓香湯	244
加味六味地黃湯1	270
加味蟠葱散	273, 280, 298
加味防風通聖散	411
加味白朮散	173
加味白朮湯	173
加味白虎湯	180
加味保生湯	328
加味補腎湯	262
加味補益湯	128, 135
加味補中益氣湯 合 生脈散	442
加味補中益氣湯	241, 313, 359

加味補肺湯	100	加味逍遙散	22, 32, 277, 321, 322, 323
加味補虛湯	346, 349	加味消煎湯	234
加味補血催孕湯	306	加味小調經湯	330
加味補血湯	332	加味消脹湯	229
加味茯苓湯	158	加味小青龍湯	116
加味附益八物湯	312	加味消風散	405, 407
加味秘元煎	297	加味疎風活血湯	381
加味檳蘇散	380	加味續斷湯	62
加味四物調經湯	353	加味順肝湯	327
加味四物湯	15, 33, 38, 70, 68, 178, 246, 281, 291, 293, 307, 329, 336, 350, 352, 385, 390, 397, 291, 414, 422, 447	加味升葛湯	77, 414
加味瀉白散	120	加味升葛敗毒散	94
加味瀉濕湯	302	加味升麻葛根湯	208
加味四六湯	104	加味升陽益胃湯	293
加味三交湯	5	加味升陽湯	287
加味三氣飲	390	加味柴苓湯	206
加味蓼芩湯	262, 263, 264	加味柴平湯	114, 207
加味蓼蘇飲	119	加味柴胡加龍骨牡蠣湯	448
加味三和湯	267	加味柴胡養胃湯	216
加味生肝健脾湯	211	加味腎氣湯	369
加味生肝湯	228	加味腎氣丸	260
加味生薑橘皮湯	200	加味十六味流氣飲	267
加味生血潤膚飲	404	加味十二味地黃湯	257
加味生化湯	348	加味十全大補湯	440
加味生黃湯	69	加味雙金湯	217
加味犀角升麻湯	408	加味雙敗湯	110
加味犀角湯	69	加味雙和湯	130, 179, 383, 441
加味舒經湯	392	加味安中散(湯)	156
加味仙方活命飲1	223	加味涼膈散火湯	240
加味仙方活命飲2	223	加味養心湯	13
加味疎肝湯	236	加味養胃湯	146, 417
加味小建中湯	73	加味良枳湯	235
加味消毒飲	197	加味養血湯	355
加味小柴胡五苓湯	206	加味如神湯	381, 384
加味小柴胡湯	5, 226	加味麗通湯	80
		加味連翹飲	407
		加味連翹敗毒散	78
		加味鹽田湯	215

加味五加皮地黃湯374
 加味五苓散203, 266, 268
 加味五積散285, 292, 297, 391, 446
 加味溫膽湯16, 313, 321
 加味溫膽湯合六鬱湯25
 加味完手湯360
 加味六君子湯148
 加味毓麟煎309
 加味六味元263
 加味六味地黃湯66
 加味六味地黃湯9, 436
 加味六味地黃丸256
 加味六味湯3, 7, 254
 加味六脾湯17
 加味潤腸湯181
 加味潤燥湯63
 加味異功散174
 加味理陰煎188
 加味理中湯163, 166
 加味二陳湯23, 83, 164, 362
 加味益胃升陽湯286
 加味忍葛湯112
 加味人養湯221
 加味茵陳五苓散216
 加味茵陳湯202, 234
 加味茵陳化瘀湯221
 加味溢經湯306
 加味立安散375
 加味滋陰健脾湯23
 加味磁朱丸44
 加味芍藥甘草湯273
 加味芍藥湯91
 加味轉陽湯356
 加味正氣散185, 186, 237
 加味正氣湯122
 加味正元散170
 加味定喘化痰湯119

加味除濕湯302
 加味調經種玉湯304, 311
 加味調經湯286, 307
 加味調胃散159
 加味調胃升清湯245
 加味調血湯282
 加味種玉湯310
 加味芷貝湯277
 加味地黃飲67
 加味地黃湯49
 加味地黃湯47, 105, 113, 133, 247,
 248, 274, 250, 251, 252, 253, 254,
 270, 276, 357, 418
 加味秦艽蒼朮湯195
 加味清肝消氣湯210
 加味清肝湯205, 213, 231
 加味清冷散92
 加味清上蠲痛散34
 加味清上蠲痛湯35, 36
 加味清心蓮子飲257
 加味清心湯52
 加味清熱瀉火湯447
 加味清腸止血散195
 加味清肺湯111, 120
 加味聰明湯437
 加味治中湯201
 加味澤蘭湯345
 加味通經湯280, 283, 372
 加味通聖散56
 加味通順散388, 401
 加味通乳湯355
 加味八物湯202, 406
 加味八味元271
 加味八仙湯358
 加味八珍湯258, 395, 402
 加味敗毒散88, 410
 加味平肝消癥湯198

加味平胃內消散	147
加味平胃散	2, 139, 160
加味夏麻湯	363
加味解毒湯	427
加味解勞散	230
加味杏蘇湯	100
加味香砂六君煎	147
加味香砂平胃散	155, 156
加味香蘇散	42, 93
加味玄蔘湯	183
加味荊翹湯	425
加味荊敗散(湯)	409
加味化癌湯	278
加味厚朴湯	266
加味稀葛湯	57
加慈陰降湯	322
肝臟 膽囊疾患 經驗方1	203
肝臟 膽囊疾患 經驗方2	207
肝臟 膽囊疾患 經驗方3	208
肝臟 膽囊疾患 經驗方5	229
肝臟 膽囊疾患 經驗方6	233
肝臟 膽囊疾患 經驗方7	242
葛根加附子地黃湯	84, 393
葛根當歸湯	256
葛根湯	99
葛根解肌湯	54
葛花解酲湯	429
甘麥大棗湯	20
去星散	27
舉元煎	296
祛風散	28
健康管理 經驗方1	435
健康管理 經驗方2	438
建理湯加味方	154
健脾軟肝湯	220
健脾丸	145
建中湯加味方	339, 387
桂薑養胃湯	152

桂丹何首湯	43
桂芍湯	41
枯礬丸加味方	150
固本湯	316
古庵心腎湯	451
高血壓 經驗方1	58
拱辰龜板丸	320
瓜貝散	109
藿香正氣散	242
藿香正氣散加味方	238, 327
膠朮安胎飲	340
交腸散	184
九味羌活湯 加減方	448
九味羌活湯加味方(靈神解毒湯)	93
口眼喎斜 痼疾 痙攣 經驗方1	42
口齒 經驗方1	132
口齒 經驗方2	134
口齒 經驗方3	134
芎歸調血湯加味方	337
歸芪補血湯	334
歸脾湯加味方	19, 78
歸溫湯	18
歸朮保產湯	336
歸朮破癥湯加味方	342
筋骨格系疾患 經驗方1	361
筋骨格系疾患 經驗方2	364
筋骨格系疾患 經驗方3	367
筋骨格系疾患 經驗方4	370
筋骨格系疾患 經驗方5	380
筋骨格系疾患 經驗方6	384
金藿飲子	331
金石五苓散	275
金水六君煎加味方	117
金液丹	397
金銀牧丹湯	190
金銀花治肝湯	224
金銀花湯	446

----- 나 -----

南蒺湯	200
內分泌疾患 經驗方1	245
內消散	159
衄血(鼻出血) 經驗方1	66
衄血(鼻出血) 經驗方2	73

----- 다 -----

丹蔘補血湯	163
貓肉方	197
當歸芍藥散	71, 353
當歸地黃湯	371
當歸退黃湯	226
當歸黃芪湯加味方	303
糖尿病 經驗方1	248
糖尿病 經驗方2	248
糖尿丸	260
大防風湯	375
大補湯加味方	439
大分清飲加味方	268
大柴胡湯	403
大柴胡湯加減方	235
大柴胡湯加味方	241
大營煎加味	316
大溫經湯	309
大銀花煎	129
大秦芎湯加味方	64
大黃牡丹皮湯	189, 191
大黃赤石脂散	426
導痰除濕湯	394
陶氏平胃散	140
獨活寄生湯	382
杜續湯	377
杜冲湯	402
頭痛 眩暈 經驗方1	31, 33

----- 라 -----

涼血飲	201
麗澤通氣湯加減方	82

----- 마 -----

麻黃赤芍湯(方藥合編 靈仙除痛飲)	364
萬金湯	368
梅核氣 其他 經驗方1	25
蒙首散	422
無間生肝湯	218
無間胡荽湯	271
戊己丸	154
民間仙方	253

----- 바 -----

斑猫散	8
蟠蔥散加味方	190
蟠蔥散	193, 304
半夏白朮天麻湯	76, 138
防風通聖散加味方	75
防風通順散	79
排紅四物湯	418
白芍木瓜湯	389
白朮異香散	348
白黃散	86
番瀉葉湯	219
補肝湯	318
補肝湯(一名 涼肝丸)	28
寶命丸	8
補母止嗽湯	112
保胃湯	141
補胃散	151
補中益氣湯	137
補中益氣湯加味方	135
保胎飲	324

補肺散	4
補肺通乳散	352
保胞養血飲	325
補血歸經湯	301
保化湯	3
茯澤石膏湯	43
本草院二神散	274
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方1	288
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方2	289
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方3	290
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方4	296
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方5	298
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方6	299
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方7	300
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方8	300
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方9	301
婦人門 月經 崩漏 帶下 經驗方10	303
不妊症 經驗方1	311
不妊症 經驗方2	315
不妊症 經驗方3	317
不妊症 經驗方4	317
附子理中湯	284
浮萍湯	410
分清飲	265
佛手散	341
佛手散加味方	329
泌尿系疾患 經驗方1	263
泌尿系疾患 經驗方2	264
泌尿系疾患 經驗方3	267
鼻淵 鼻炎 經驗方1	77
脾臟 脾臟疾患 經驗方1	199

----- 사 -----

莎芎散	71
四苓對金飲子	209
四物加葛根解肌湯	443

四物安胃湯	168
四物湯加減方	351
四物湯加味方	186, 278, 284, 292, 314, 341
四物合歸脾湯	20
瀉心湯	74
四六湯	97
四六湯加減方	55
四六湯加味方	21, 79, 376
散腫潰堅湯	124
產後補元湯	335
三氣飲加味方	359, 371
三白湯 加減方	175
蔘蘇飲加減方	108
蔘蘇飲加味方	121
蔘朮健脾湯	157
傷暑 經驗方1	103
生肝健脾湯	212, 232, 233
生血潤膚飲	404
生血清涼湯	416
生活湯	185
犀角消毒飲	418
犀角地黃湯加味方	70
暑門香葛湯	102
石膏湯	133
石隱補遺方	26
仙遺糧湯加減方	365
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方1	178
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方2	179
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方3	180
泄瀉 痢疾 便秘 其他 經驗方4	181
洗皮散	408
疎經活血湯	366
疎經活血湯加味方	386
消丹飲	426
小半夏湯	139
小柴胡湯加味方	243
小柴胡湯合香蘇散	48

小柴胡合內消散	227
逍遙散	14
逍遙散加味方	22
少陰人 芎歸香蘇散合川芎桂枝湯	109
少陰人 十全大補湯 加減	82
蘇子導痰降氣湯	115
消積正元散	224
消痔丸	194
消風散	53
疎風神佑丸	450
疎風湯	58, 65
疎風活血湯	363
疎風活血湯加味方	362, 383
蘇紅芎歸湯	342
消化丸	153
消火膏	428
消黃湯	204
收汗煎	130
順氣湯	387
順血湯	354
循環系疾患 經驗方1	51
循環系疾患 經驗方2	52
升舉大補湯	288
升麻胃風湯	403
升麻芍藥湯	68
僧庵白朮湯	401
承長湯	399
升堤歸芪湯	330
升陷湯	122
柴胡桂枝湯	111, 449
柴胡桂枝湯加味方	19
柴胡瀉肝湯	205
柴胡四物湯	351
柴胡疎肝散	232
柴胡抑肝湯	14
柴胡芍藥湯	114
柴胡湯	210

柴和飲	126
神經系疾患 手顫症 經驗方1	29
神聖膏	427
慎言育精湯	315
神化飲	422
心和散	167
十味敗毒散加味方	420
十神湯加味方	101
十六味流氣飲加味方	398
十二味寬中湯	149
十全大補湯	379, 444
十全大補湯加味	128
十全大補湯加味方	51, 144
十全五子湯	318
雙補丸	259
雙和湯 合 對金飲子 合 消滯丸方	146

----- 아 -----

安心湯	166
涼膈散火湯	415
養腎湯	343
養胃飲	424
養胃湯	165
養肺湯	4
呃逆 胃腸疾患 經驗方1	141
呃逆 胃腸疾患 經驗方2	143
呃逆 胃腸疾患 經驗方3	145
呃逆 胃腸疾患 經驗方4	149
呃逆 胃腸疾患 經驗方5	161
呃逆 胃腸疾患 經驗方6	162
呃逆 胃腸疾患 經驗方7	167
呃逆 胃腸疾患 經驗方8	169
呃逆 胃腸疾患 經驗方9	170
如神養營湯加味方	389
如神湯	372
連翹湯	394

連翹敗毒散	46
然惜紅煎	289
然安胎飲	325
然調經種玉湯	308
五苓散	1
五苓散加味方	136
烏梅一味煎	235
五封散	421
吳茱萸湯	283
烏藥順氣散加味方	57
烏藥順氣湯	59
五積散加減	310
五積散加減方	92, 285, 335, 379
蜈香丸	123
玉露散	337
溫經湯	287
溫痰散	95
溫中下積散	199
溫清飲(四物湯 合 黃連解毒湯)	415
溫肺散	94
王氏解毒湯	115
옹소단	159
禹水湯	182
越脾加朮湯	44
胃苓湯	175
乳房疾患 經驗方1	279
乳房疾患 經驗方2	279
遺精 夢遺 不眠 經驗方1	15
六味地黃湯加味方	54
六子甘草湯	376
六和湯	431
銀花湯	7
陰陽雙補湯	443
耳科疾患 經驗方1	47
理氣祛風散加味	38
二十二味飛步湯	400
理中湯(附子理中湯)	176

二陳湯加減方	138
二陳湯加味方	32, 164
二香散	103
益氣補血湯	361
益胃升陽湯	294
人參養榮湯	140
人蔘鹿茸湯	333
人蔘達生散	326
人蔘麥門冬湯	331
人蔘茯苓散	259
人蔘養胃湯	150
人蔘養胃湯加味	171
人蔘養胃湯加味方	430
人蔘朮陳湯	176
人蔘敗毒散加減方	81
引精止血湯加減方	317
茵陳五苓散	203
茵陳胃苓湯	218
茵陳湯	231
咽喉 經驗方1	90
妊娠 出產 產育 經驗方1	332
妊娠 出產 產育 經驗方2	333
妊娠 出產 產育 經驗方3	338
妊娠 出產 產育 經驗方4	344
妊娠 出產 產育 經驗方5	349
妊娠 出產 產育 經驗方7	356
淋疾 梅毒 其他 經驗方1	11
立志散	124

----- 자 -----

滋腎湯(雙和湯加味)	319
滋陰降火湯加味方	6, 49
芍藥黃連湯	193
腸癰(盲腸炎) 經驗方1	182
腸癰(盲腸炎) 經驗方2	183
腸癰(盲腸炎) 經驗方3	184

腸癰(盲腸炎) 經驗方4	187
腸癰(盲腸炎) 經驗方5	188
腸癰(盲腸炎) 經驗方6	191
腸癰(盲腸炎) 經驗方7	192
赤茯苓湯	131
前胡地黃湯	107
絕瘡丸	198
定癰丸	40
正氣丹	142
正氣天香湯	50, 194
定喘湯	121
正喎湯	39
除濕牛桂飲	343
調經種玉湯	305, 314
調經種玉湯加減方	312
調榮活絡湯	373
調血湯	334
中風 經驗方1	61
中風 經驗方2	65
增味導赤散	275
增味五苓散	269
止衄湯	67
知母湯	340
地榆四物湯	295
枳通飲	411
地黃苦蓼湯	255
地黃飲子加味方	64
真陰蓮子湯	258
秦艽蒼朮湯加味方	196

----- 차 -----

蒼橘湯	60
蒼朮地榆湯	196
川芎茶調散加味方	85
千金文武湯	255
千金湯	37, 188

鐵掃散	24
清肝健脾湯	225
清肝補肝湯	214
清肝湯	222
清肝解鬱湯	209
清肝丸	230, 368
清宮湯	295
清腦聰明元	441
清痰湯	96
清上鐳痛湯	35, 37, 55
清上補下湯	91
清暑二香散	177
清暑益氣湯	102
清心補養湯	436
清心溫膽湯	40
清熱瀉心湯	424
清肺湯	72, 95
清風湯	53, 413
清血除濕補皮散	412
清和飲	89
清和湯	127
清火補陰湯	104
清火湯	87
草白湯	74
逐露飲	346
吹喉散	89
治肝湯	222
治囊湯	239
治肋湯	126
治疸湯	228
治糖丸	260
治星湯	61
治淋方	9
治中湯	168
治風湯	27

----- 타 -----

泰山盤石散	324
通關飲	88
通竅湯 加味	85
通竅湯	84
通乳湯	328
通治丸	39
退黃飲	204
透風鎮火清氣湯	117

----- 파 -----

八物湯加味方	439
八味地黃湯加味方	319
八正蟠葱散	272
八正散加味方	10
八珍湯加味方	130
敗毒散加味方	99
敗醬散	217
平肝湯	211
平安安神湯	16
平胃散加味方	350
皮膚科疾患 經驗方1	411
皮膚科疾患 經驗方2	419
皮膚科疾患 經驗方3	419
皮膚科疾患 經驗方4	420
皮膚科疾患 經驗方5	421

----- 하 -----

何金湯	409
勃起不全湯	320
沆瀣丹	433
解毒湯	237
海桐皮湯	338
咳嗽 喘息 經驗方1	106
咳嗽 喘息 經驗方2	113

咳嗽 喘息 經驗方3	116
解濕湯	398
咳喘神奇湯	118
行氣萬金湯	358
杏蘇散	101
杏蘇清氣湯	107
香芎湯	36
香附肉桂丸	226
香砂六君子湯加味方	136, 143
香砂平胃散加味方	155
香蘇散加味方	344
香八湯	137
血糖定丸	249
脇痛 肋膜炎 經驗方1	125
脇痛 肋膜炎 經驗方2	125
荊芥三白湯	405
胡麻散	423
胡麻散加味方	413
火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方1	430
火傷 湯火傷 諸解毒 經驗方2	432
和中湯	169
滑石散	276
活血湯	281
黃芩洗肺湯	76
黃芩芍藥湯	177
黃芩猪苓湯	269
黃芩湯	24
黃芪健中湯加味方	142
黃芪湯	127
黃連清心飲	13
蛔膽湯	238
回生丹	1
回首散加減方	41
回春涼膈散合升麻葛根湯	132