漢 方 治 療 法 審 查
收錄集

1977年度

保 建 社 會 部

『한방치료법 심사 수록집』을 다시 출간하면서

1977년 보건사회부는 동양의학 육성을 위한 목표사업 중 세부 사업으로 대한한의사협회 회원들의 협조를 받아, 효과를 경험한 한약처방 수집 사업을 수행하였다. 이 사업의 목표는 '비공개된 우수 한방치료법의 체계화를 위하여, 우수치료법을 발굴 실험 분석하는 방향에서 집대성하여 한의학의 임상 효능도를 증진한다'이다. 이 사업을 통하여 『한방치료법 심사 수록집』을 발간하였고, 2003년에 한의학연구원이 복간하였다.

수록집은 필사본으로 복간 작업 시 원문에 충실하였고, 낡아서 보이지 않는 글자는 □로 처리하고, 오기나 비표준어라고 생각되는 부분도 수정하지 않고 그대로 두었다.

지난 수천 년 동안 전통의학 치료 효과를 공개적으로 알 수 있는 길은 개인 경험을 발표한'의안(醫案)'뿐이었다. 과학 문명이 발달한 오늘날에도 한의계는 개인적 관찰에 의한 '경험'을 매우 중요시하고 있다. '경험'은 과학에서 중요한 관찰 수단 중 하나이지만, 객관성이 낮아 효과를 검정하기에는 한계가 있는 관찰 방법이다. 따라서 45년 전에도 이 수록집 서두에 "여기에 수록된 처방에 대해서는 실험 연구 등이 보완이 따라야 할 자료에 불과한 것임을 알려드립니다" 라고 밝히고 있다.

하지만 45년이 지난 오늘 현재 여전히 한의계의 임상 효과는 경험담 위주이며, 또 한의계 누구도 이를 논리적으로 의심하지 않고 믿음으로 받아들이는 환경이다. 한의학이 치료의학으로 근거를 굳건히 하기 위해서는 신뢰도가 높은 의약품 임상시험 지침에 따른 안전성 유효성 자료가 생산되고 발표되어야 할 것이다.

2023년 12월 22일

한국한의학연구원 신현규

頭 文

이 『漢方治療法 審査收錄集』은 보건사회부가 동양의학개발육성사업의 일환으로, 대한한의사협회의 협조를 얻어 전국 개업 한의사 및 한방교육·연구기관으로부터 제출된 100건의 한방치요법을 한의학계 인사로 구성된 5개 분과(내과, 소아과, 부인과, 침구과, 신경정신과) 심사위원회에서 각 처방마다 병명, 진단, 증상, 치료법, 응용, 용법, 약리, 금기·부작용 등으로 가급적 체계적으로 분류 보완심사한 것을 수록한 것입니다.

앞으로 동 치료법 등에 대하여는 전문연구기관의 임상실험과 연구를 거쳐서 임상치료에 활용할 수 있도록 할 계획입니다.

이 심사수록집은 앞으로 실험연구 등 보완이 따라야 할 자료에 불과한 것임을 여기 알려 둡니다.

◇ 심 사 인 사 ◇

○ 내과분야: 박헌제, 김영만, 이종형
○ 소아과분야: 구본홍, 유지윤, 김영기
○ 부인과분야: 송병기, 배문홍, 이형찬
○ 침구과분야: 최용태, 이창빈, 임종국
○ 신경정신과분야: 김상효, 이성래, 이동건

<내 과>

1. 肝硬變症 治療法

△提出者 : 慶北 大邱 재단법인 제한동의학술원 변 정 환

1. 傷 病 名 : 肝硬變症
2. 主要症狀 : 食慾不振, 胃部膨滿, 惡心, 便秘, 下痢
3. 治療實績 : 肝硬變 고유의 諸症狀을 용이하게 감소시키며, 全身循環에 장애를 주는 腹水를 예방 또는 치유시킨다.
4. 副作用·禁忌 : 자극성 있는 飮食物과 지방분 섭취를 금할 것. 副作用 거의 없음.
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   治疽湯 - 桂皮 1.875g, 葛根 1.875g, 當歸, 川芎, 熟地黃, 白芍藥, 砂仁(炒), 神曲(炒), 麥芽(炒), 各 3.75g, 檳榔 2.625g, 甘草 1.875g
6. 加減活用(修治法 또는 技法) :

   간디스토마 - 花椒 3.75g

   간경화 - 漆木灰 1.875g

   간경변성 복막염 - 白茯苓 3.75g, 大卜皮 2.625g

   간염 - 茵蔯 7.5g, 草果 1.875g
7. 服用方法 : 食后 1時間 湯服 井華水煎湯
8. 學術的 根據 : 本 疾患의 成因을 適切히 解消시키므로 証에 따르는 治方의 妙를 기대할 수 있다.
9. 秘藏된 來歷 : 家伝方

[審査內容]

1. 傷病名 : 肝硬變症
2. 診 斷 : 右腹季肋部에 壓痛과 鈍感 혹은 腫塊를 触知할 수 있으며 上

腹部 또는 胸部에 蜘蛛網狀의 靜脈怒張을 볼 수 있고 重症인 경우는 腹脹 혹은 腹水를 수반한다. 臥位轉換에 따라 打診에서 鼓音과 濁音의 境界가 變動됨을 認知할 수 있다.

3. 症　狀 : 顔色沈黑, 食慾減退와 上腹部 壓迫感이 있으며 鼓脹, 便秘 또는 下痢 등의 증상이 있다. 末期에는 肝腫大와 門脉壓의 上昇으로 腹水, 浮腫이 일어나고, 或은 大吐血을 하는 수도 있다.

4. 治療法 : 治疽湯 - 當歸, 川芎, 熟地黃, 白芍藥, 砂仁炒, 神曲(炒), 麥芽炒 各 3.75gm, 檳榔 2.625gm, 葛根, 桂皮, 甘草 各 1.975gm

5. 應　用 : 肝硬變性 腹膜炎에 加 白茯苓 3.75gm, 大卜皮 2.625gm
肝炎에 加 茵蔯 7.5gm, 草果 1.875gm
肝硬化에 加 漆木灰 1.875gm
간디스토마에 加 花椒 3.75gm

6. 用　法 : 合爲1貼. 淸水煎湯去渣. 食後 1時間 湯服, 1日 2貼 合再湯 3回服

7. 藥　理 : 補血劑인 四物湯(當歸, 熟地黃, 白芍藥, 川芎)에 消導劑인 神曲, 麥芽, 檳榔, 砂仁을 加하고 다시 補津液으로 葛根과 機能促進으로 桂皮를 加하여 補血 消導와 機能强化의 作用이 있을 것으로 추리됨

8. 禁忌 및 副作用 : 刺戟性 飮食物과 脂肪質의 取食을 禁하여야 하며 服藥上 副作用은 거의 없을 것이나 熟地黃의 消化여부를 勘案할 필요가 있겠음

[評價와 意見]

1. 處方內容이 補劑 및 消導劑인 藥物들이므로 多分히 虛證性인 경우에 應用 可能한 治療法으로 사료됨
2. 1회 服用量(1貼分)이 불과 34gm 정도이므로 藥力이 微弱할 것으로 보여짐
3. 本處方 內容을 主劑로 他藥을 加味 혹은 增量(應用項 參照)하여 虛性肝硬變症에 長期 投與하는데 適當할 것으로 보여짐

2. 肝硬變症(血路性, 膽路性 共用) 治療法

△提出者 : 全南 麗水市 張漢醫院 張 奉 均

1. 傷 病 名 : 肝硬變症(血路性, 膽路性 共用)
2. 主要症狀 : 肝腫大, 潛在性黃疸, 腹水, 腹部靜脉露張, 門脉壓上昇
3. 治療實績 :

效果 / 區分	効		果	
	完 治	顯 著	好 轉	未 祥
302 總 數	40 13%	85 28%	87 29%	90 30%
日 數	120	60	30	20

4. 効能効果 : 體溫調節, 消化利水, 腹部弛緩, 大便黃調, 肝硬柔軟, 顔色紅調, 腹水 減少 등 順으로 發効함
5. 副作用・禁忌 : 服藥中 淺瀉를 하던지 痛症이 甚하면 用量을 減少하고 禁忌는 刺戟性 食物과 脂肪質임
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   柴胡 15.0g, 白芍藥, 靑皮, 貝母 各 7.5g, 蒲公英, 蒼朮, 茵蔯 各5.625g, 防己, 三稜, 逢朮, 山査, 枳實, 白芥子炒, 白蒺藜炒, 草龍膽, 赤茯苓, 車前子, 半夏 各 3.75g, 沒藥, 梔子, 黃芩, 牧丹皮, 甘草 各 1.875g, 生薑 3片, 大棗 2介
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 치료 기간중 每10日마다 再診하여 治療成果에 對하여 適宜하게 加減 또는 分量을 調節할 것
8. 服用方法 : ① 一般 漢藥 湯煎法에 依함
   ② 1日 2貼씩 再湯까지 함
   ③ 一般的으로 1회분을 2・3회 分服함

9. 學術的 根據 : 小柴胡湯(東宝方), 加味消遙散(景岳方), 淸肝解盍湯(東宝方), 柴胡淸肝湯(東宝方), 淸積正元散(東宝方), 瀉肝湯(入門方) 等을 參照할 것

10. 學術會 등 發表與否 : ① 漢醫師 治療寶鑑 B. 38項
② 東西醫學硏究會記念論文集 421項
③ 第26回 日本東洋醫學會總會

11. 秘藏된 來歷 : 恩師 竹破 金宰圭先生의 經驗方에 自家 經驗으로 調節한 것임

12. 其他事項 : ※參考로 急性肝炎의 處方을 公開함.

加減柴胡淸肝湯 :

柴胡 15.0g, 金銀花, 黃芩, 貝母 各 7.5g, 山査, 白茯苓, 瓜各 5.625g, 半夏, 當歸, 川芎, 芍藥, 靑皮, 草龍膽, 蒲公英, 羌活, 木通, 澤瀉, 車前子, 玄蔘, 檳榔, 甘草 各 3.75g, 生薑 3片, 大棗 2介

[審査內容]

1. 傷病名 : 肝癰
2. 診 斷 : 右季肋部 즉 肝臟部位에 鈍壓感을 느끼며 腫塊를 触知할 수 있고 胸腹部에 靜脉怒張이 나타나며 肝臟腫大, 腹脹 또는 腹水를 認診할 수 있다.
3. 症 狀 : 顔色沈黑, 食慾減退, 嘔氣, 疲勞가 심해지며 發熱 혹은 微熱往來, 潛在性 黃疸, 肝部鈍痛 등이 있고 重症인 경우는 腹水, 浮腫 등이 나타난다.
4. 治療法 : 加味柴胡湯~柴胡 15.0gm, 白芍藥, 靑皮, 貝母 각 7.5gm, 蒲公英, 蒼朮, 茵蔯 各 5.625gm, 防己, 三稜, 逢朮, 山査, 枳實, 白芥子炒, 白蒺呂炒, 草龍膽, 赤茯苓, 車前子, 半夏 各 3.75gm, 沒藥, 梔子, 黃芩, 牧丹皮, 甘草 各 1.875gm, 生干 3片, 大棗 2枚
5. 應 用 : 膽路性 또는 血路性 肝硬變症에 모두 應用할 수 있음
6. 用 法 : 合爲 1貼, 淸水煎湯去渣, 食後 1~2時間服.
1貼 分量을 2~3回分服. 1日 2貼服(4~6回服)

7. 藥　理 :

漢方의 淸肝 및 理肝劑인 小柴胡湯, 淸肝解盉湯, 加味消遙散, 柴胡淸肝湯, 消積正元散, 瀉肝湯등의 柴胡劑와 蒲公英, 茵蔯, 草龍膽등의 利膽劑, 三稜, 逢朮, 枳實등의 破積, 山査, 茯笭, 蒼朮등의 消導作用을 應用하여 構成한 것으로 體溫調節, 消化利尿, 腹部弛緩, 大便順調, 肝硬柔軟, 顔色紅潮, 腹水減少등의 効果가 있는 것으로 추측된다.

8. 禁忌 및 副作用 : 刺戟性 飮食物과 脂肪質의 取食을 禁하며 服藥中 泄瀉 또는 痛症이 甚하면 用量을 減少하여야 한다.

9. 其他

治療實績

구분 / 환자수	효과			
	完　治	현저한 효과	증세호전	미　상
환자총수 (302명)	40명 (13%)	85명 (28%)	87명 (29%)	90명 (30%)
치료일 수	120일	60일	30일	20일

[評價 및 意見]

1. 處方內容의 總量이 100gm 이상으로 1回 服用量으로는 過多한 듯 하며 分服 (2~3回) 하는 것이 妥當할 것 같음
2. 藥物內容이 主로 淸利劑로써 대개 實証性患者에 適當할 것으로 보여짐
3. 旣成方中 治肝, 淸熱劑인 柴胡劑를 廣範圍하게 取擇한 点이 注目되며, 좀 더 加減의 餘地가 있지 않나 생각됨

3. 肝臟癰疽(肝炎) 治療法

△提出者 : 서울 鐘路區 大元堂漢醫院 朴 泳 夏

1. 傷 病 名 : 肝臟癰疽(肝炎)
2. 主要症狀 : 脇痛, 腹脹, 寒熱往來
3. 治療實績 : 永登浦區 新道林洞 143番地 男37才 金○和
   肝炎, 黃疸, 腹水者 外 男拾數名, 女若干名, 累試皆効
   ※或隨症 兼用他補充方
4. 效能效果 : 可期完全
5. 副作用・禁忌 : 全無, 忌酒麵
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 救肝敗毒至聖湯(岐尺師方)
   金銀花 1兩, 當歸, 白芍藥 各 3錢, 梔子炒里 生甘草 各 1錢
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 上記 本方 修治法 多有 複雜, 故便利, 上拾等分 調製 分服 適宜
8. 學術的 根據 : (岐天師方) 『漢醫學大辭典』 627項 參照
   ※學理: 淸肝解盉, 消毒, 當歸入肝臟血, 白芍藥入肝脾能收能, 金銀除熱消毒 梔子解盉除煩
9. 學術會등 發表與否 : 處女發表
10. 秘藏된 來歷 : 余習性好酒浸飮積年宿醉傷肝 故頻試百方不効中用此漸快矣厥後累試 男女患 수 십명이 別無損失也
11. 其他事項 : 但虛冷善泄者 感量分服頻頻度似好. 勿論臨械對症之策不拘泥於此一方而兼用柴胡. 淸肝湯 淸膽湯抑肝湯等等有名方事理之當然也
    ※ 補助處方例(其1)
    淸膽湯
    敗醬根, 滑石, 神麴, 各 3錢. 當歸, 白芍, 半夏, 竹茹, 川楝子, 赤茯苓, 沒藥 各 2錢. 枳角, 陳皮 各 1錢5分. 三稜, 蓬朮, 甘草 各 5分
    ※ 寒熱加柴胡 3錢, 黃芩 1錢, 疸加 茵蔯 5錢, 便宜上減半 調製 可

參考 大韓漢醫學會誌 登錄号 다203号70項

例(其2)

柴胡淸肝湯

柴胡 2錢, 梔子 1錢半, 黃芩 1蔘 川芎 桔梗 各1錢. 靑皮 連交 各8分

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 肝癰
2. 診 斷 : 肝臟腫大, 肝臟部壓迫感이 있으며 顔色沈黃, 黃疸 혹은 無黃疸, 肝腫과 함께 脾臟腫大 또는 下顎淋巴腺腫을 隨伴한다.
3. 症 狀 : 惡寒發熱, 脇痛, 腹脹, 食慾減退, 嘔氣, 頭痛등이 일어나며, 肝臟部에서 軟腫이 触知한다.
4. 治 療 法 : 救肝敗毒至神湯 - 金銀花 37.0gm, 當歸 7.5gm, 白芍藥 11.25gm, 梔子炒黑, 甘草 各 3.75gm
5. 應 用 : 肝硬變症 化膿性 肝臟炎에도 應用할 수 있음
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣 午前, 午後 1貼式 服用. 2貼渣를 合하여 再湯 夕服 或은 1貼을 水煎하여 2回 分服(1日)
7. 藥 理 : 淸肝, 解盉, 消毒의 作用이 있으며 金銀花는 除熱解毒, 當歸는 入肝臟血, 白芍藥은 入肝脾能收能補, 梔子는 解盉除煩하는 効가 있다고 봄. (『石室秘錄』肝癰方으로 登載되어 있음)
8. 禁忌 및 副作用 : 酒麵 및 刺戟性飮食物을 禁해야 하며 服藥中 副作用은 별로 없을 것이나 万若 泄瀉를 일으키는 者는 藥量을 減하여 자주 分服할 것
9. 其 他 : 本 治療法은 提出者 本人(서울 朴永夏)이 肝臟炎으로 苦生中 完治한 經驗方이며 경우에 따라서는 下記 處方을 兼用하는 수도 있다.

◎淸膽湯 -敗醬根, 滑石, 神曲 各 11.25gm, 當歸, 白芍藥, 半夏, 竹茹, 川練子, 赤茯苓, 沒藥 各 7.5gm, 枳殼, 陳皮 各 5.625gm, 三稜, 蓬朮, 甘草 各 1.875gm 寒熱加 柴胡 11.25gm, 黃芩 3.75gm. 疸加 茵蔯 18.75gm

◎柴胡淸肝湯～柴胡 7.5gm, 梔子 5.625gm, 黃芩, 人蔘, 川芎, 桔梗 各 3.75gm, 靑皮, 連交 各 2.79gm

[評價 및 意見]

1. 肝臟癰에 金銀花(治癰劑)를 使用하여 卓效가 있다는 臨床界의 擧論이 나오는 것으로 보아 妥當性이 있는 治療法으로 보여짐
2. 實驗硏究로써 效果를 確認해 볼만한 治療法으로 思料됨

4. 化膿性 肝臟炎 治療法

△提出者 : 慶南 馬山市 東洋漢醫院 裵 賢 贊

1. 傷病名 : 化膿性肝臟炎
2. 主要症狀 : 肝臟肥大, 疼痛, 體溫上昇
3. 治療實績 : 優秀 90% 完治
4. 効能效果 : 1, 2日分으로 증세 호전, 10~30日分으로 完治
5. 副作用, 禁忌 : 共히 無함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   金銀花 37.5g, 白芍藥 11.25g, 當歸 7.5g, 梔子炒, 甘草 各 3.75g 作1貼
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 下痢(설사)가 有할 時는 減量
8. 服用方法 : 午前, 午後에 1貼式 水煎服하고, 2貼 渣를 再煎 夕后服
9. 學術的 根據 : 『石室秘錄』 第1卷 4페이지 內治法 第三行 肝癰方
10. 學術會등 發表 여부 : 無
11. 秘藏된 來歷 : 古方 中 選擇
12. 其他事項 : 累試累驗으로 最優秀方이라고 自認함

[審査內容]

1. 傷病名 : 肝炎, 急性
2. 診斷 : (前章 參照)
3. 症狀 : (前章 參照)
4. 治療法 : 加減柴胡淸肝湯

   柴胡 15.0gm, 金銀花, 黃芩, 貝母 各 7.5gm, 山査, 白茯苓, 瓜婁仁 各 5.625gm, 半夏, 當歸, 川芎, 芍藥, 靑皮, 草龍膽, 蒲公英, 羌活, 木通, 澤瀉, 車前子, 玄蔘, 檳榔, 甘草 各 3.75gm, 生干 3片, 大棗 2個
5. 應用 : 肝硬化症, 化膿性 肝炎에 應用도 可함
6. 用法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食間服, 1日2貼 合再湯 3回服

7. 藥理 : 淸肝, 補血, 消炎, 利水의 藥理作用이 있는 것으로 추측됨

8. 禁忌 및 副作用 : 脂肪質 및 刺戟性飮食物을 禁하며 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 淸肝, 消炎劑로서 理想的인듯 하며 藥量이 過多하여 數回로 分服하여야 할 것임

2. 흔히 臨床界에서 試用해볼만한 治療法이라고 思料됨

5. 急慢性胃炎 食道炎 心下痞滿症 治療法

△提出者 : 慶北 大邱市 재단법인제한동의학술원(제한한방병원) 변정환

1. 傷 病 名 : 急慢性胃炎 食道炎 心下痞滿症
2. 主要症狀 : 面色萎黃 或噯氣嘔吐 腹中雷鳴 下痢
3. 治療實績 : 消化器疾患에 應用範圍가 넓다. 따라서 豫防에도 速效를 期待할 수 있다.
4. 効能効果 : 胃擴張, 胃酸過多症, 胃潰瘍, 蛔虫痛, 가슴앓이에 卓效
5. 副作用, 禁忌 : 생냉물을 피하고 지방성 식물을 금한다.
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 半夏瀉心湯
   半夏 11.25g, 黃芩, 乾干, 人蔘, 甘草 5.626g, 黃連 3g, (干5片, 棗4個)
   小茴香(酒炒) 5.625g, 檳榔, 玄胡索 各 3.75g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 便秘加 大黃 各 3.75g, 泄瀉 加 牡蠣粉 5.625g, 龍骨 1.875g
8. 服用方法 : 1日 3回, 食後 30分~1時間, 溫服 水煎湯
9. 學術的 根據 : 『傷寒論』, 『金匱要略』
10. 其他事項 : 心下痞硬이 있고 嘔而腸鳴을 目標로 하는 胃腸疾患에 多用한다.

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 急慢性 胃炎
2. 診　　斷 : 胃部 壓迫感 및 壓痛, 顔色萎黃, 口乾, 舌苔 등이 있다.
3. 症　　狀 : 胃痛, 嘔氣或吐, 噯酸, 腹中雷鳴, 便秘 혹은 下痢, 頭痛, 倦怠感이 일어나며 食慾減退, 消化不良
4. 治 療 法 : 半夏瀉心湯~半夏 11.25gm, 黃芩, 乾干, 人蔘, 甘草, 小茴香 酒炒 各 5.625gm, 檳榔, 玄胡索 各 3.75gm, 黃連 3.0gm, 干5片, 棗 4個

5. 應　　用 : 消化器疾患에 應用範圍가 넓으며 豫防에도 優秀함
心下痞硬, 嘔而腸鳴을 目標로 胃腸疾患에 多方面으로 應用됨 便秘 加 大黃 3.75gm, 泄瀉加 牡蠣粉 5.625gm, 龍骨 1.875gm

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣 1日3貼 每食後 30分~1時間 溫服

7. 藥　　理 : 胃液의 中和(半夏), 消炎, 淸熱(黃芩, 黃連), 溫胃(乾干, 人蔘), 鎭痛(小茴香, 玄胡索, 檳榔, 甘草) 등의 効果가 있는 것으로 추측된다.

8. 禁忌 및 副作用 : 生冷飮食 및 脂肪性飮食物을 禁忌하며 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 胃腸疾患에 漢方古來로부터 많이 應用되어 온 治療法임
2. 半夏가 不適한 體質에는 그 副作用도 考慮하여야 할 것임 (半夏를 薑製함이 좋을 것임)
3. 實驗硏究를 해봄직한 優秀한 治療法으로 思料됨

6. 腸癰 蟲垂炎 盲腸炎 盲腸周圍炎 蟲垂突起炎 治療法

△提出者 : 京畿 楊洲 東昌漢醫院 朴 東 浩

1. 傷 病 名 : 腸癰, 蟲垂炎, 盲腸炎, 盲腸周圍炎, 蟲垂突起炎
2. 主要症狀 : 右腸骨窩部의 卒然疼痛, 口吐, 有熱, 盲腸部腫瘍을 觸知
3. 治療實績 : 多有(治病 1例 患者 - 南錫賢 1952年 8月上旬傾 發病現在 東丘女商 敎務主任으로 勤務함 至于今 20餘年 經過 無再發 健在)
4. 効能効果 : 良好함
5. 副作用, 禁忌 : 生冷硬物飮食은 禁止
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 千金牧丹皮湯 治大小腸癰處方
   薏苡仁 通牧丹皮 各 18.75그람(5錢) 瓜婁仁去殼研 5.625그람(1錢)
   桃仁 12介(去皮炎 研) 水煎空心服 便閉加 當歸 11.25그람(3錢),
   大黃 5.625그람
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 但 痛處에 氷囊貼付하고 栗米飮만 給食케 하면 3,5일~1週日 經過하여 完治됨. 非手術 無再發 經驗有
8. 服用方法 : 上記 湯劑를 水一碗煎至 7分空心服 1日 2, 3회
9. 學術的 根據 : 漢方處方集 『增補東西醫學要義』661-2頁 臨床 40年間에 施療한 經驗 많음
10. 秘藏된 來歷 : 秘藏된 傳受받은 來歷없이 硏究經驗에 依하였음
11. 其他事項 : 受胎調節方과 人生保健長壽에 弘益되는 早服法을 後面에 紀錄하여 參考에 提出함

※ 受胎調節方 凡性交는 夫婦 沐浴淸潔하고 撫戱快感直前에 臥位를 女上男下하고 首尾를 相接하여 尤先女爲 口吮男精하여 與男唼服하고 男爲舌舐女液하여 男女虛弱한 者가 相互 飮服한 則 是謂早服從事라 不性家族計劃을 百分 完遂요 夫婦生活健康에도 最大補藥이라 故로 東西古今識者는 秘此不言也라.

中國 宋時에 朱夫子 早服不爲後悔書에 日此身이 未有衰損而加以儉養하는 것이 是謂早服而重積德이라 早服者는 早覺未衰而嗇之也라 如某此身은 已衰耗가 如破屋相似하며 雖欲修養이나 亦何 能有益耶아 泄精早服이 長生久親道.

解說 : 精液을 蚤服하다는 文獻은「東醫寶鑑」 內景篇一卷十七張(項) 攝養 要訣 太乙眞人七禁文日一者는 小言語하여 養內氣하여 二者는 戒色欲 養精氣하며 三者는 溥滋味養血氣하며 四者는 燕精液養藏氣하며 五者는 莫瞋怒養肝氣하며 六者 美飮食養胃氣하며 七者는 小思慮養心氣하라 此文中 四者는 精液을 삼켜서 藏氣를 기르라 하였다.

또 藏氣는 무엇인가 하면 同篇十二張에 腦爲髓海上丹田은 藏氣之府也하였다. 그런즉 精液을 삼켜서 上丹田(藏氣) 즉 腦髓를 補養한다는 뜻이 됨. 又云 神生於氣 氣生於精

(朱子書出文은 全秉薰著 「精神學通篇」上卷 12張에 記載되었음)

* 人口調節子副方(「扁鵲心書」五六張)

婦人이 血旺氣衰則多子하고 氣旺血衰則無子라 若髮黑, 面色光潤하며 肌膚滑澤하며 月液隱毛稀하면 乃氣衰血旺也라. 主多子하고 若髮黃 面無光彩하며 肌肉이 粗澁하며 月夜隱毛多하면 乃氣旺血衰也라 主無子라 若交合時에 女液이 先至하고 男精이 後衝者는 乃至開衰精也니 主成男하고 若男精이 先至하고 女液이 後來者는 乃精開衰血也 主成女라 若男女精液 不齊至者는 不成胎라 함

1貼服用則 絓後第3日이 되나 水約往後 60時間內에 交媾하면 主成男也라 其後 姙娠 2個月 約 8週內에 加減也 黃湯12貼을 9日間空心服用하면 轉女爲男也라.

* 處方 調經種玉湯

九蒸熟地黃 香附子炒各 5.25그람 當歸酒洗, 吳茱萸湯泡, 川芎 各 3.75그람 白芍藥, 白茯苓, 陳皮, 玄胡索, 牧丹皮, 乾干炒 各 3.0그람 官柱 熟艾炒黑 各 1.875그람 治婦人 無子經不調 空心服 待經至之日하여 服之

하며 間日1貼 藥書交媾라 함

* 處方 加減地黃湯 九蒸熟地黃 15그람 生山藥, 山草萸 11.25그람, 白芷 7.5그람, 白茯苓 3.75그람, 香附子 2.25그람, 人蔘 1.875그람, 紅花 0.375그람(1인分) 12貼 經書 2個月後日 2回 再湯까지 9時間 空心服則 轉女爲男也라.

* 牟衡奎傳方을 試用効果有 3人에 有效 結論, 上記 諸論은 本人이 開業 40餘年間 淺薄한 經驗이나 諸賢께 硏究할 參考 資料로 提供함

* 避妊家族計劃 政府豫算 34億원이라 하며 補藥으로서 鹿茸이 들면 20貼에 14~5萬원이라 하는데 上記 受胎調節方 人口調節子副方을 實踐躬行하면 國家經濟와 保健長壽에 弘益된가 思料 添記함.

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 腸癰
2. 診 斷 : 回盲部에 壓痛点을 認知할 수 있고 特히 左側臥位에서 顯著함 反射性腹筋緊張 張蠕動減弱 回盲部에 硬結觸知 脈搏細小頻數 白血球 增多등을 認知할 수 있다.
3. 症 狀 : 突然 上腹部 및 臍右側腹脹 惡心嘔氣 體溫上昇 右下肢伸展難 便秘 혹은 下痢등 症이 일어난다. 下痢者 中에는 重篤한 경우도 있으므로 注意를 要한다.
4. 治 療 法 : 千金牧丹皮湯~薏苡仁, 通牧丹皮 各 18.75gm, 瓜婁仁去殼 硏 5.625gm, 桃仁去皮尖硏 12個
5. 應 用 : 便閉 加 當歸 11.25gm, 大黃 5.625gm. 盲腸周圍炎 腸閉塞 등에도 응용할 수 있다
6. 用 法 : 合爲 1貼, 淸水 1碗, 煎至 7分, 去渣空心服 1日 2~3回服 痛處에 氷囊貼付하고 粟米飮만을 給食시키며 安靜을 要한다.
7. 藥 理 : 破瘀(桃仁, 牧丹皮), 疏通(薏苡仁), 潤腸(瓜婁仁)의 効가 있

는 것으로 보여진다.

8. 禁忌 및 副作用 : 生冷物 및 其他 飮食物을 全的으로 禁하며 粟米粥만을 給食케 하여야 함. 副作用은 별로 發見치 못하였음

[評價 및 意見]

1. 漢方古典에 腸癰治療方으로 記錄되어 있어 臨床界에서 흔히 腸癰治療에 應用되는 治療法임
2. 急性인 경우 만약 本治療法이 得效치 못할 경우를 對備하여 卽時 手術할 수 있는 與件下에서 使用하여 봄이 安全할 것으로 思料됨

7. 맹장염(급만성) 治療法

△提出者 : 慶北 大邱 제한한방병원 변 정 환

1. 傷 病 名 : 맹장염(급만성)
2. 主要症狀 : 右下腹疼痛, 右下肢引痛, 心下部壓痛, 惡寒發熱
3. 副作用, 禁忌 : 과격한 운동을 피하고 지방성 음식을 금한다.
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : (淸腸湯) 茵蔯, 橘皮 各 7~5g, 吳茱萸, 枳實, 澤瀉, 黃芩 各 3.75g, 金銀花, 蒲公英, 小茴香, 檳榔. 唐木香 各 1.875g, 甘草 1.875g, 或加 白茯苓
5. 加減活用(修治法 또는 技法) :
   小便不利- 白茯苓 3.75g, 牧丹皮 2.625g, 便秘 - 大黃 3.75g~7.5g, 急性 맹장염 - 大黃 9.375g, 桃仁, 瓜婁仁 各 3.75g, 慢性 맹장염 - 薏苡仁 18.75g, 敗醬 7.5g
6. 服用方法 : 隨時服 食間溫服(4~6時間) 水煎湯
7. 學術的 根據 : 장의 활동을 조장하고 消炎作用하므로 충양돌기와 하복부 염증성 질환을 제거함
8. 秘藏된 來歷 : 家傳秘方

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 盲腸炎
2. 診 斷 : 腹痛과 함께 回盲部에서 壓痛点을 認診할 수 있고 反射性 腹筋緊張 右下肢索引痛, 白血球增多 등이 診査된다.
3. 症 狀 : 惡心, 惡寒發熱, 上腹部 및 臍右腹疼痛, 右下肢難展, 便秘 혹은 下痢 (但 下痢者는 重症인 경우가 많음)
4. 治 療 法 : 淸腸湯 - 茵蔯, 橘皮 各 7.0~5.0gm, 吳茱萸, 枳實, 澤瀉, 黃芩 各 3.75gm, 金銀花, 蒲公英, 小茴香, 檳榔, 唐木香, 甘草 各 1.875gm

5. 應　　用 : 小便不利 加 白茯苓 3.75gm, 牧丹皮 2.625gm
便秘 加 大黃 3.75~7.5gm
急性盲腸炎 加 大黃 9.375gm, 桃仁, 瓜婁仁 各 3.75gm
慢性盲腸炎 加 薏苡仁 18.75gm, 敗醬 7.5gm
6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食間 隨時(4-6時間) 溫服
7. 藥　　理 : 消炎劑로서 腸의 機能을 助長하며 虫垂突起와 腸筋의 炎症性疾患을 除去시키는 効가 있는 것으로 추측된다.
8. 禁忌 및 副作用 : 地方性飮食物과 生冷硬堅食物을 禁하며 安靜을 要함 服藥上의 副作用은 별로 發見치 못 하였음

[評價 및 意見]

1. 主로 腹腔內 炎症性疼痛에 廣範圍하게 應用될 수 있는 治療法으로 보여짐
2. 盲腸炎에 있어서는 이 處方을 基本的으로 하여 急性 또는 慢性에 따라 加味 應用하는 것이 좋을 것 같음(應用欄 參照)
3. 肝臟疾患, 腎臟疾患에도 應用될 수 있을 것임

8. 膽石症 治療法

△提出者 : 慶北 大邱 濟韓漢方病阮 高 庸 碩

1. 傷 病 名 : 膽石症
2. 主要症狀 : 治脾胃虛冷 心腹攻刺連胸脇膀胱小腸腎氣作痛
3. 治療實績 : X-Ray 特殊촬영후 정확한 膽石, 結石이 있는 환자 10名을 完治
4. 效能効果 : 重症이라도 大略 100貼 程度로 完快
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   葱莖 1g, 靑皮 1g, 玄胡索 1g, 檳榔 1g, 白豆久 1g, 乾干 1g, 肉桂 1g, 丁香皮 1g, 甘草 2g, 蒼朮 2g, 逢朮 2g, 三稜 2g, 白茯苓 3g, 當歸 5g, 小茴香 5g, 加味蟠葱散
6. 服用方法 : 水煎 食後 3時間服 1日 2回式 60日間

[審査內容]

1. 傷病名 : 膽石症
2. 診 斷 : 右季肋部에 突然 激痛이 發作되며 右上腹部의 腹壁緊張 혹은 腫脹壓痛을 認診할 수 있고 一過性 혹은 輕度의 黃疸을 隨伴한다.
   女子가 男子보다 3~5倍 罹患率이 높다고 한다.
3. 症 狀 : 通常 右季肋部 또는 心窩部에서 激痛이 發作하여 背部右肩 右上肢部에 까지 放散되고 發熱, 惡心, 嘔吐, 黃疸 등 症이 일어난다.
   脾胃虛冷, 心腹攻刺痛, 連胸脇, 膀胱, 小腸, 腎氣作痛
4. 治療法 : 加味蟠葱散~當歸, 小茴香 各 1.875gm, 白茯苓 11.25gm, 三稜, 逢朮, 蒼朮, 炙甘草 各 7.5gm, 丁香皮 5.625gm, 乾干, 肉桂, 白豆久, 檳榔, 玄胡索, 靑皮, 葱莖 各 3.75gm
5. 應 用 : 定型性 膽石症 發作時뿐만 아니라 潛在性 膽石症에도 長期間 (1個月 이상) 治療로서 完治될 수 있으며 重病이라도 約 100貼 程度로

完快된 例가 있었음

本治療法은 胃痙攣, 腸疝痛, 其他 腹腔內 發作性 疝痛에도 應用할 수 있음

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食後 3時間, 1日2回服
7. 藥　理 : 破積(當歸, 三稜, 蓬朮), 疏通(靑皮, 檳榔, 蒼朮, 白茯苓), 鎭靜, 鎭痛(玄胡索, 丁香皮, 小茴香, 炙甘草, 白豆久), 機能亢進(肉桂, 乾干, 葱莖) 등의 效能을 具備하였으며 機能閉塞으로 因한 發作性疼痛의 緩和, 鎭靜　作用이 있는 것으로 간주됨
8. 禁忌 및 副作用 : 脂肪質, 澱粉 등의 難消化飮食物을 禁하며 流動食의 攝取를 要함, 服藥中 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 漢方臨床界에서 腹部 發作性疼痛의 治療方으로 많이 應用되고 있는 處方임
2. 鎭痛效果가 顯著하다는 醫界報告가 있었음
3. 可能하다면 實驗硏究가 要求되는 優秀한 治療法임

9. 脹滿（腹膜炎）治療法

△提出者 : 全南 莞島 光州漢醫院 劉 光 男

1. 傷病名 : 脹滿(腹膜炎)
2. 主要症狀 : 面目手足不浮而腹脹, 呼吸及大小便不利
3. 副作用, 禁忌 : 鷄 彳者 酒 麵
4. 處方內容 및 鍼灸療法 : 半夏厚朴湯加減

半夏 1錢, 厚朴 8分, 神曲, 升麻 5分, 三稜, 蓬朮, 猪苓, 澤瀉, 赤茯苓, 車前子, 肉桂 1錢, 柴胡, 陳皮, 敗醬, 蒼朮, 草豆久, 木香, 靑皮, 吳茱萸, 生干, 大卜皮, 草果, 乃服子

5. 加減活用 (修治法 또는 技法) : 飮食物겸용 必守 下記 大麥大豆炒散
6. 服用方法 : 午前 7時, 正午 12時, 午後 5時 每空心服, 午前 1時, 正午 1時, 5時 2貼合 再煎服
7. 學術的 根據 : 大麥飮(大豆를 불에 볶아서 細粉末하여 每食事時에 麥飮 1合이면 콩가루도 1合等分하여 混食할 것이 第一重要藥임)
8. 秘藏된 來歷 : 祖父님께서 傳受. 兄님은 日政時 漢醫生
9. 其他事項 : 上記 處方中 大麥飮과 콩가루 兩物이 필요하오니 每食事時 半半 混合 服用하시도록 합니다.

부식물은 조구, 식음초. 注意 다른 음식은 一切 服用치 마시고 全的으로 每日 3時로 麥飮, 콩가루를 混合하여야 합니다. (腹部가 脹滿氣가 없어지고 腹部가 홀쭉하다.)

※ 惡性腫瘡, 癰疽, 關節炎에 對하여

草烏 8兩, 南星, 半夏, 很毒, 大黃, 何首烏, 宝豆, 川椒, 霹歷花 각 2兩, 右藥을 粉末하여 麥飮爲泥하여 煙茶 또는 피마자茶에 싸서 瘡口 또는 患部에 添塗함. 各 化膿性 또는 骨髓炎에도 良好함

※ 精神病, 動脈硬化症 服用法

石古2錢, 人蔘2錢, 麥門冬2錢, 半夏1錢5分 黃連1錢 梔子1錢, 山棗仁 1錢, 甘草1錢, 生干5, 右藥은 每食後에 服用. 午前 8時 1服, 午後 1時 1服, 午後 5時 2貼 再湯煎服

[審査內容]

1. 傷病名 : 脹滿(腹膜炎)
2. 診 斷 : 腹部脹滿 및 腹壁緊張이 認知되며 胸式呼吸 혹은 吃逆을 發하고 脈搏은 軟數하다.
3. 症 狀 : 食慾不振, 腹痛, 鼓腸, 嘔吐, 喘滿등 症이 있고 극히 沈衰狀의 顔貌를 程하여 四肢冷, 糞汁物 같은 吐物을 내며 大小便이 不利하다.
4. 治療法 : 加減 半夏厚朴湯~半夏, 三稜, 蓬朮, 豬苓, 澤瀉, 赤茯苓, 車前子, 肉桂 各 4.75gm, 厚朴 3.0gm, 神曲, 升麻, 柴胡, 陳皮, 敗醬, 蒼朮, 草豆久, 木香, 靑皮, 吳茱萸, 大腹皮, 草果, 乃卜子, 生干 各 1.875gm
5. 應 用 : 上記 藥과 食事로서 治療하면 2週內에 大小便이 正常으로 되며 消化 良好. 腹皮가 皺壁을 나타내며 回服됨을 볼 수 있음
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食前 1日3回 空心服 2貼合 再湯

◎ 兼 用 : 大麥豆飯~大豆炒 1合, 大麥飮 1合, 泥合하여 每日 朝晝夕 3時를 이것만을 食事할 것

副食은 조기(石魚)와 시금치만으로 制限하여야 함

7. 藥 理 : 利水, 消導, 破積劑로서 構成되었으므로 腹水, 鼓腸등 症에 利濕, 治積의 効果가 있을 것으로 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵의 飮食物을 禁하며 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 期待만큼의 効果가 있을는지 疑心스러우나 治療法上으로는 可用해 볼 만한 處方이라고 思料됨

2. 利水, 消導, 破積劑의 藥物로 構成되기는 하였으나 藥物이 不必要하게 雜多한 것 같으며 좀 더 主力이 作用할 수 있도록 加減되어야 할 것 같음
3. 大麥豆飯의 兼用이 좀 特異하므로 試驗的인 硏究를 해 볼 만 하다고 思料됨

10. 直腸炎 治療法

△提出者 : 京畿 始興郡 부곡한의원 金 象 日

1. 傷 病 名 : 直腸炎
2. 主要症狀 : 1日 10數回의 暴瀉官性下痢及 粘液便
3. 治療實績 : 血液便, 濃性分泌物을 混合함
4. 効能効果 : 100% 完治
5. 副作用, 禁忌 : 無함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 楮白皮 37g, 甘草 18g, 黑小豆 1중(約37瓦), 麥芽炒半중(約18瓦)
7. 加減活用(修治法 및 技法) : 金銀花 5錢, 夏苦草 3錢을 加하여 細菌性痢疾에 應用 特効함
8. 服用方法 : 輕症에 1첩을 1日 2回分服. 重症엔 2, 3첩을 2日分服
9. 學術的 根據 :
   (1) 楮白皮는『木草備要』 澀腸燥濕 治泄瀉久痢
   (2) 黑豆『本草備要』는 利水下氣, 消腫止痛, 活血, 解百藥毒
10. 學術會등 發表與否 : 없음
11. 秘藏된 來歷 : 本 方은 平北 寧邊郡 南薪峴洞 農夫인 族祖 金 應 鶴 으로부터 傳受받아 40年間 상용인데 無效通報를 接한 例는 1件도 없음

[審査內容]

1. 傷病名 : 直腸炎
2. 診 斷 : 粘液 및 膿性血液 混合의 大便排泄 左下腹部 壓痛이 있음
3. 症 狀 : 1日 數10回의 後重性下劑痢가 일어나며 粘液 및 血便의 膿性分泌物이 排泄됨
4. 治療法

楮根白皮, 黑小豆 各 37.0gm, 麥芽, 甘草 各 18.0g

5. 應　用 : 細菌性痢疾 加 金銀花 18.75gm, 夏苦草 11.25gm

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣하여 輕症時는 2回分服(1日), 重症時는 1日 2~3 貼服

7. 藥　理 : 『本草備要』에 의하면 楮根白皮는 瀉腸燥濕 治泄瀉久痢라고 하였고 黑小豆는 利水下氣, 消腫止痛, 活血, 解百藥毒이라 하였으므로 本方은 止瀉, 整腸緩和作用이 있는 것으로 추측됨

8. 禁忌 및 副作用 : 별로 없음

9. 其他 : 本方은 平北 寧邊地方에서 民間藥으로 使用되어 왔으며 本人이 約 40年間 應用한 바 優秀한 効果를 얻어온 治療法임

[評價 및 意見]

1. 楮根白皮의 止瀉整腸作用을 應用한 治療法으로 安價的이며 大衆的인 療法이라고 思料됨

2. 앞으로 追試를 通하여 그 効果를 確認한 후 널리 大衆的으로 普及하였으면 좋을 것 같음

11. 腹膜炎 治療法

△提出者 : 釜山 東區 普春漢醫院 趙 鳳 淵

1. 傷 病 名 : 腹膜炎
2. 主要症狀 : 熱往來(40°~ 38°間往來), 頭痛, 腹部膨滿, 腹部 腫痛甚
3. 治療實績 : 30名 治療
4. 効能効果 : 30名 全癒함
5. 副作用, 禁忌 : 鷄猪 酒麵 其他 肉類
6. 處方內容 또는 鍼灸療法
   (1) 敗醬 19g
   (2) 紫花地丁(大薊) 엉거꾸뿌리 15g
   (3) 澤瀉, 赤茯苓, 豬苓 各 6g
   (4) 靑皮, 木通, 車前子, 牛膝 各 7.5g
   (5) 大卜皮 3.75g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 1日 2貼, 食前服用, 再湯 3服.
   10貼 或 20貼 完治
8. 學術的 根據 : 消炎, 鎭痛, 利尿로 萬無一失
9. 學術會등 發表與否 : 無
10. 秘藏된 來歷 : 親戚 漢醫로부터 傳受 받음. 眞實로 잘 나은 處方입니다.
11. 其他事項 : 累試累驗 皆癒

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 腹膜炎
2. 診 斷 : 腹部膨滿 및 腹壁緊張이 認知되며 脈搏軟數, 呼吸喘滿, 때로는 吃逆을 일으킨다.
3. 症 狀 : 腹部腫痛, 高熱(40~38℃)의 往來가 있고 脹滿 및 鼓脹,

때로는 激痛을 發하며 顔貌沈衰, 食慾不振, 噯氣, 嘔吐 喘急등 症이 있다.

4. 治 療 法 : 敗醬 19.0gm, 紫花地丁(大薊, 엉겅퀴뿌리) 15.0gm, 靑皮, 木通, 車前子, 牛膝 各 7.5gm, 澤瀉, 赤茯苓, 豬苓 各 6.0gm, 大腹皮 3.75gm
5. 應 用 : 腹脹, 腹水, 單腹鼓脹등에 利水, 消導劑로서 應用
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食前服, 1日2貼合再湯 3回服. 10~20貼 得效
7. 藥 理 : 消炎(敗醬, 紫花地丁), 利水(車前子, 木通, 澤瀉, 赤茯苓, 豬苓), 消導(靑皮, 牛膝, 大腹皮등)의 藥理作用이 있는 것으로 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵 및 脂肪質飮食物을 禁하며 服藥中 副作用은 별로 發見치 못하였음
9. 其 他 : 親戚 漢醫師로부터 傳受한 累試累驗의 經驗方임

[評價 및 意見]

1. 一般的으로 잘 쓰여지고 있는 利水消導方에 敗醬과 紫花地丁을 加入한 것이 特異하며 매우 試用해 볼만한 治療法으로 간주됨
2. 可能하며 實驗硏究를 하여 藥效를 確認하였으면 좋겠음

12. 肝硬化症 治療法

△提出者 : 慶南 忠武市 中和漢醫院 金 玉 柱

1. 傷 病 名 : 肝硬化
2. 主要症狀 :
3. 治療實績 : 累試累驗
4. 効能効果 :
5. 副作用, 禁忌 :
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   柴胡, 人蔘, 陳皮, 蘇葉, 黃芪 各 1錢, 當歸, 土川芎, 桂枝, 厚朴, 白芷, 防風, 烏藥, 檳榔, 枳角, 木香, 桔梗, 甘草, 麥芽, 砂仁, 山査肉 各 8分, 草龍膽, 黃芩 各 5分
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 酒毒加 葛根 2錢
8. 服用方法 : 每日 2貼, 每回 1貼式, 水煎 溫服後 再湯服. 10貼 或 20貼에 完治됨
9. 學術的 根據 :
10. 學術會등 發表與否
11. 秘藏된 來歷
12. 其他事項

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 肝硬化症
2. 診 斷 : 右季肋部에 鈍壓痛 혹은 腫塊를 触知할 수 있고, 肝腫, 脾腫, 門脉壓上昇으로 因한 腹脹, 腹水, 靜脉怒張이 認知된다.
3. 症 狀 : 顔色沈黃, 食慾減退, 疲勞感, 嘔氣등 症이 發하여 發熱 혹은 微熱往來, 潛在性 黃疸이 있고 점차 腹水, 腹脹, 肝部의 鈍痛이 심해진다.

4. 治 療 法 : 柴胡, 人蔘, 陳皮, 蘇葉, 黃芪 各 3.75gm, 當歸, 土川芎, 桂枝, 厚朴, 白芷, 防風, 烏藥, 檳榔, 枳殼, 木香, 甘草, 桔梗, 麥芽, 砂仁, 山査肉 各 3.0gm, 草龍膽, 黃芩 各 1.875gm

5. 應 用 : 酒毒 加 葛根 7.5gm
肝臟炎 또는 一般 脇痛에도 應用할 수 있음

6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食間服 1日 2貼 合再湯 1日 3回服

7. 藥 理 : 淸熱, 順氣, 消導의 効果가 있는 것으로 추측됨

8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵과 脂肪質飮食物을 禁하며 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1) 一般的으로 흔히 쓰이는 順氣, 消導劑로서 處方內容의 藥性들이 매우 順坦하므로 特效方으로서의 特性이 없을 것 같음

2) 肝硬變症은 비교적 難治病에 속하는 病인데 과연 本處方으로 特效를 얻을 수 있을는지 疑問視됨

13. 肝臟病及 酒毒 治療法

△提出者 : 釜山市 東區 蔚山漢醫院 李 元 學

1. 傷 病 名 : 肝臟病及 酒毒
2. 主要症狀 : 알콜中毒으로 자고 나서 양치를 하든 用便을 보면 嘔吐, 腹痛이 있고 2, 3日 지나면 壓痛. 肝은 커지고 黃疸증세가 있으며 違和感, 貧血, 消化障碍가 隨伴된다.
   黃疸의 主症勢로서 惡寒, 惡心, 嘔吐, 輕熱을 나타내는 수가 많다.
   黃疸 몇 주일 혹은 몇 달 持續하면 徐徐히 없어진다
   肝은 腫大되며(脾臟이 觸診되는 수도 있다) 長期 經過中에 肝硬化를 招來케 하는 수도 있다. 本症은 多少 治療되었다가 또 再發되는 傾向이 많다
3. 治療實績 : 1966年 9月에 釜山市 龍塘洞 居住하며 직업은 漁夫이고 當年 40才가 된 男子가 內院하여 病 좀 고쳐 주십시오 하기에 問診과 腹診한 結果 右脇腹部가 腫大라 하니 患者의 말이 數年동안 過飮(燒酒) 後胸腹이 冷痛, 嘔吐, 消化不良이라 하여 此方 10貼을 投與하였던바 効果가 顯著하여 再次 藥 10貼을 投與하여 完快하였고, 그 후로 數名 罹病 上記와 같은 환자에게 治療하였는바 完快를 본 일이 있음
4. 副作用, 禁忌 : 飮酒及 刺戟性 飮食物을 忌함
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 處方 葛根解毒湯~葛根 11.25g, 白豆久, 貢砂仁 各 5.625g, 靑皮, 神曲炒, 澤瀉, 白朮, 人蔘, 白茯苓, 豬苓 各 3.75g, 唐木香 1.875g
6. 服用方法 : 水煎 1日2貼 食間服 再煎合3服
7. 學術的 根據 : 알콜 中毒, 肝臟解毒作用으로 葛根을 爲君하고, 消化不良, 嘔吐 鎭靜할 目的으로 白豆久, 貢砂仁 爲臣하고 人蔘, 白朮은 補脾胃하고 澤瀉, 豬苓은 肝臟腫大, 消腫, 利水하고 靑皮, 神曲, 木

香은 諸氣, 平肝, 下氣 目標로한 君臣佐使한 것이다

8. 脾臟된 來歷 : 서울 信一漢醫院 院長 尹完重先生 秘方集大成 19頁紙 日本東京 栗原愛□處方

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 肝臟病(酒毒性)
2. 診 斷 : 好酒 및 大酒家로 알콜 中毒 與否를 確認해야 하며 肝部 壓痛, 肝腫, 黃疸, 腹脹, 疲勞感이 심함
3. 症 狀 : 嘔吐易發 食慾不振 潛在性 黃疸 微惡寒 輕發熱 惡心 嘔吐, 肝腫등 症이 일어남
4. 治 療 法 : 葛根解毒湯~葛根 11.25gm, 白豆久, 貢砂仁 各 5.625gm, 靑皮, 神曲炒, 澤瀉, 白朮, 人蔘, 白茯苓, 豬苓 各 3.75gm, 唐木香 1.875gm
5. 應 用 : 酒傷性 胃腸病, 消化不振, 肝臟腫大, 浮腫 등에 應用할 수 있음
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食間服 1日2貼 合再湯 3回服
7. 藥 理 : 葛根의 解酒毒作用과 補脾, 消化, 利水, 消腫 및 平肝下氣의 藥理作用이 있는 것으로 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 禁酒를 철저히 하며 刺戟性飮食物을 忌함
   服藥上 副作用은 거의 없음

[評價 및 意見]

1) 漢方臨床界에서 酒傷에 一般的으로 쓰여지는 治療法으로 보여짐

2) 輕症이거나 虛症인 경우에 長期投與로 應用할 수 있으리라고 思料됨

14. 胃痙攣 治療法

△提出者 : 釜山 東區 李 元 學

1. 傷 病 名 : 胃痙攣
2. 主要症狀 : 突然히 胃部 極痛(刺痛)이 發作하며 疼痛은 下腹部胃部 放散한다. 발작 시간은 수분~수시간에 達하며 發作度數는 不定 하며 精神 興奮과 密接한 關係가 있다. 前驅症으로 頭重, 眩暈, 惡心, 胸間 등의 不快感이 招來된다

   그리고 痛症이 심한 때는 온 顔面蒼白, 四肢厥冷, 脉細不整과 人事 不省이 招來되고 患者는 胃部를 强壓하는 姿勢를 取하면서 平臥치 못한다. 그러나 生命에는 危險은 없고 發作이 鎭靜되면 곧 回復한다. 本病의 診斷에 있어서 胃潰瘍性 疼痛이며 膽石症, 腎石症, 肋間神經痛, 腸疝痛 鑑別을 통하여, 이중에서도 鑑別하기 困難한 胃潰瘍性 疼痛은 胃痙攣에 比해 持續的이며 症勢가 輕하고 食事와 關係가 있으며 胃出血과 胃性症候가 甚하며 持續的인 것이다.
3. 治療實績 : 積年동안
4. 効能効果 : 此 處方을 經驗한 結果 2~3貼에 効果있음
5. 副作用 또는 禁忌 : 熱腹痛에는 副作用이 有하오니 注意, 禁忌는 2~3日 硬物 飮食을 忌하고 一時的인 斷食 或은 미음을 少量 服用하고 鎭靜后 卽時 過飮食 則 病再發함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   人蔘 18.75g, 乾干炮, 桂枝 各 7.5g, 白朮, 白芍藥酒炒 各 3.75g, 草果去殼, 玄胡索, 五靈脂, 沒藥 各 1.875g
7. 加減活用 : 挾滯 加 山査肉, 神曲炒, 檳榔 各 3.75g,

   蚵歐 加 山査肉, 桂心 各 3.75g, 烏梅 1個, 花叔 30粒
8. 服用方法 : 水煎. 食間服 1日 2貼. 再煎合 3服
9. 學術的 根據 : 胸腹冷痛門 健理湯 本方과 九種心脾痛 手拈散과 合方

하였음. 熱胃痛과 寒胃痛으로 鑑別하여야 하며 通氣血 胃止痛 安蛔消食驅虫을 目標로 한 것이다.

10. 秘藏된 來歷 : 但臨床的으로 寒冷 腎腹上 冲疼痛에 恒時 使用하였으나 胃痙攣에 適當함을 思料하며 累試驗하였음

[審査內容]

1. 傷病名 : 胃痙攣
2. 診　斷 : 대개 七情(精神關係)과 有關하며 突然 發作性胃痛과 함께 苦痛으로 因하여 胴體를 彎曲하며 平臥가 不能하다. 極痛時는 顔面蒼白, 四肢厥冷, 脉細不整함이 特異하다.
   膽石症, 急性膵臟炎, 潰瘍性胃痛, 腸疝痛, 腸閉塞 등과의 鑑別을 要한다.
3. 症　狀 : 前驅症으로 頭重, 眩暈, 惡心, 胸部不快感이 있고 精神狀態가 不爽하다.
   發作時는 激痛으로 因한 苦痛때문에 室內를 轉側하며 四肢厥冷, 冷汗, 심한 경우 人事不省을 일으킨다. 發作時間은 數分～數時間에 達하며 發作頻度는 不足하다
4. 治療法 : 人蔘 18.75gm, 乾干炮, 桂枝 各 7.5gm, 白朮, 白芍藥酒炒 各 3.75gm, 草果去殼, 玄胡索, 五靈脂, 沒藥 各 1.875gm
5. 應　用 : 挾滯 加 山査肉, 神曲炒, 檳榔 合 3.75gm, 蛔歐 加 山査肉, 桂心 各 3.75gm, 烏梅 1個, 花椒 30粉
6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日2貼 合再湯 3回服
7. 藥　理 : 通氣血, 止胃痛, 安蛔馭虫 및 消食을 目標로 한 寒性胃痛에 適方이라고 할 수 있다.　胸腹冷痛의 治方인 建理湯과 九種心痛의 治方인 手拈散을 治方한 것이다.
8. 禁忌 및 副作用 : 固形食物을 禁하며 消化 잘 되는 流動飮食物이나 또는 斷食이 좋다. 熱性胃痛에 잘못 投與하면 副作用이 일어날 수 있으므로 注意를 要한다.

[評價 및 意見]

1) 寒冷性胃痛 및 痙攣性胃痛에 鎭靜, 鎭痙을 目的으로 可用할만 하나 좀더 七情解鬱에 必要한 藥을 加味하여야 좋은 治療方이 되지 않을까 思料됨 (例 香附子, 小茴香 등)

2) 熱性胃痛의 鑑別, 特히 潰瘍性胃痛의 嚴密한 鑑別이 要求되며 萬若 潰瘍性이나 熱性胃痛時에 人蔘, 乾干, 桂枝 등의 刺戟性으로 因한 副作用이 심할 적을 깊이 考慮하여야 할 것임

15. 胃潰瘍 治療法

△提出者 : 釜山 東區 정산한의원 安 鎬 律

1. 傷 病 名 : 胃潰瘍
2. 主要症狀 : 위염, 위산과다로 장기간 소화불량 후에 3대 증상으로 위통, 구토, 위출혈
3. 治療實績 :

효과 / 구분	효과			
	완 치	현저한 효과	증세 호전	미 상
치료환자 총 10명	30명 (50%)	5명 (5%)	7명 (12%)	18명 (30%)
완치 또는 증세호전시까지 소요된 평균 치료기간	25日	17日	10日	

4. 效能效果: 장기복용함으로써 胃가 기능을 완전 원상 회복된다.
5. 副作用, 禁忌 : 特別한 경우를 제외하고는 부작용 없음, 禁忌 鷄猪酒麵, 자극성물, 강고물
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 茯苓飮 - 白茯苓 11.25g, 人蔘, 當歸 各 5.625g, 麥芽 3.75g, 甘草 7.5g, 棗 2개
   (중량은 경우에 따라 가감도 가함)
7. 加減活用 : 加山査肉, 鷄內金, 牡蠣粉 5.625g, 修治 山査거핵, 牡蠣소위분, 鷄內金세정건조
   技法 : 8종의 약을 정제하여 조제. 전탕복하거나 丸散하여 복용
8. 服用方法 : 물 0.9ℓ 내지 1ℓ 가량 약탕에 주입하여 한시간여 자불하여 압착함. 양은 0.3ℓ 가량이 적량, 식후 한시간 전후에 미온복함
9. 學術的 根據 : 性은 溫하면서 胃粘膜에 刺戟性이 全無하므로 胃潰瘍

치료에 적이함. 此病治에는 一切 刺戟性약물은 삼가 한다.

10. 秘藏된 來歷 : 文獻에 기재 기장하였음. 선배 해산 종형호수로부터 이수

※ 양의학상으로는 현대병명이 명확하고 공통적이며 약물도 대개 병에 의하여 규정되어 있으나 한의학은 증후학으로서 병명도 체계가 없으며 약물처방도 복잡 다단하여 현대화에 노력할 것은 물론이요.

연이나 한의서는 유구한 역사를 통하여 순한학으로 의서가 편찬되었기로 양의 병명으로 위궤양을 상병명으로 명명하고 바꾸어 말하면 위궤양은 탐산위통이라고 병명하에 연관시켜 茯苓飮과 동시에 조사서를 작성하였음에 한의학 치료에 일조가 될까 합니다.

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 胃潰瘍
2. 診　　斷 : 食後에 胃痛이 심하게 일어나며 上腹部 一定處에 壓痛点이 있고 혹은 背部(12胸椎 ~ 2腰椎間)에 壓痛点이 있음. 重症인 경우 吐血 또는 大便出血은 認知할 수 있다.
3. 症　　狀 : 胃痞, 呑酸, 嘈囃등이 있어오다가 점차 胃痛, 嘔吐, 胃出血 등이 일어나며 매우 神經質的인 性格이 되고 營養狀態가 不良해진다.
4. 治 療 法 : 茯苓飮 - 白茯苓 11.25gm, 人蔘, 當歸 各 5.625gm, 麥芽 3.75gm, 甘草 7.5gm, 大棗 2個(重量은 경우에 따라 增感함)
5. 應　　用 : 대개 上記處方에 加 山査肉去枳 鷄內金, 牡蠣粉炒紛 各 5.625gm하여 應用하며 혹은 丸劑, 散劑로 하여 服用해도 무방하다
6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食後 1時間 溫服 1日 2貼 合再湯 3回復
7. 藥　　理 : 藥性이 溫和하여 胃粘膜에 刺戟을 주지 않으므로 潰瘍治療에 適合하다고 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵 및 刺戟性飮食物을 禁하며 服藥上

副作用은 별로 발견치 못하였음

9. 其他 治療實績

효과 / 구분	완 치	현 저	호 전	미 상
총 환자수 60명	30명 (50%)	5명 (8%)	7명 (12%)	18명 (30%)
치료기간	25일	17일	10일	

[評價 및 意見]

1) 胃液過多 治療劑로 應用되는 古方 茯苓飮을 變方한 것으로 潰瘍治療에도 適 應할 것으로 생각되며, 鷄內金, 牡蠣粉등의 加味가 優秀하다고 보여짐

2) 實驗硏究로써 効能에 確認을 하여 봄이 좋을만한 治療法임

16. 嘔吐症 治療法

△提出者 : 釜山 南區 濟衆漢醫院 朴 耀 翰

1. 傷 病 名 : 嘔吐症
2. 主要症狀 : 尤甚者는 飮水도 吐함
3. 治療實績 : 相當數 累經驗
4. 効能効果 : 効驗良好함
5. 副作用, 禁忌 : 副作用 없음. 服藥重에는 죽, 간장 以外 禁忌
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   溫胃飮 : 人蔘 2錢, 白朮炒 5錢, 白片豆 2錢, 陳皮 2錢, 甘草灸 1錢,
   當歸 1錢(泄瀉者)

   灸 : 中脘穴, 章門穴
7. 加減活用 : (加)藿香, 丁香, 白豆久, 唐香(依症狀) 加減함
8. 服用方法 : 1日 2貼 及 再湯 水煎 服用
9. 學術的 根據 : 『張氏 景岳全書』
   卷之 二十 雜證謨 嘔吐
   卷之 五十一 新方入陣 熱 溫胃飮五
10. 學術會등 發表여부 : 無
11. 秘藏된 來歷 : 父親으로 傳受(漢醫書 及 漢文學 精通家)
12. 其他事項 : 無

[審査內容]

1. 傷病名 : 嘔吐症
2. 診 斷 : 平素 胃無力症의 旣往歷이 있고 대개 胃寒挾飮으로 手足冷, 嘔氣惡逆, 嘔吐頻發하는 特徵이 있다.
   傷食嘔吐 또는 急性 胃炎症에 併發하는 嘔吐에는 適當치 못함
3. 症 狀 : 惡心, 惡逆, 嘔吐頻發, 甚한 者는 飮水도 卽吐한다.

4. 治療法 : 溫胃飮

白朮炒 18.75gm, 人蔘, 白片豆, 陳皮 各 7.5gm, 乾干炒黑, 甘草灸, 當歸身(泄瀉者 勿用) 各 3.75gm

5. 應　用 : 胃虛者는 人蔘을 增하여 腸痛을 隨伴하는 者는 藿香, 丁香, 唐木香, 白豆蔻를 症狀에 따라 加味한다.

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日2貼, 合再湯 3回復

※ 灸 : 中脘穴, 章門穴

7. 藥　理 : 白朮, 人蔘, 乾干 등의 溫胃 鎭嘔作用과 陳皮, 乾干, 甘草 등의 理氣, 和解作用이 兼備한 것으로 추리됨(『景岳全書』 嘔吐門 參照)

8. 禁忌 및 副作用 : 脂肪質 및 刺戟性飮食物과 固形食物을 禁하며 될 수록 流動食을 取하여야 한다. 冲炎性 嘔吐症이 아닌 경우 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 寒冷性 嘔吐 즉 胃寒挾飮으로 發하는 嘔吐症에는 投與할만한 治療法이라 보여짐

2. 但, 本方 그대로 보다는 加味應用方이 더욱 效果的일 것이며 寒性症인가 炎性症인가의 鑑別을 正確히 할 必要가 있겠음

17. 腹痛 治療法

△提出者 : 慶南 昌寧 大同漢醫院 朴 德 峰

1. 傷 病 名 : 腹痛
2. 主要症狀 : 寒炅이 相衡하고 食積과 가스, 充滿等 一切 肚腸痛
3. 治療實績 : 治療患者 50名中 完治 60%, 현저한 効果 30%, 미상 20%
4. 副作用, 禁忌 : 鷄, 猪, 酒, 麵
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 開鬱導氣湯 - 蒼朮炒 2錢, 陳皮, 香附子童便炒, 白芷, 川芎, 白茯苓 各 1錢半, 乾干炒, 滑石, 山梔炒黑, 神曲 各 1錢, 甘草 5分
6. 加減活用 : 無
7. 服用方法 : 午前 10時경 1貼, 午後 2時경 1貼, 午後 5時경 再湯 溫服
8. 學術的 根據

   文獻 『增補壽世保元』(民國2年 廣益書局 卷五 10頁 腹痛 印行)
9. 秘藏된 來歷 : 無
10. 其他事項 : 無

※ 評 價 : 特히 兒童(10才~20才 以下정도)이 蛔蟲藥을 써도 効果가 없고 時時로 發作苦痛하는데 大效 特效함

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 腹痛
2. 診 斷 : 特別한 原因, 즉 膽石症이나 膵臟炎, 蛔垂炎 등에 發하는 腹痛을 除外하고 主로 消化障碍, 神經性 鬱滯, 胃腸筋運動 異常등으로 일어나는 腹痛에 適當하다.
3. 症 狀 : 消化不良, 痞滿, 가스充滿, 腸鳴, 便秘 혹은 下痢증에 隨伴하여 腹痛이 일어남

4. 治 療 法 : 開鬱導氣湯

蒼朮 7.5gm, 陳皮, 香附子童便炒, 白芷, 川芎, 白茯苓 各 5.625gm, 乾干炒, 滑石, 山梔子炒黑, 神麴 各 3.75gm, 甘草 1.875gm

5. 應　　用 : 特히 兒童(10~20세 이하)이 蛔蟲藥을 써도 効果가 없이 隨時 發作하는 腹痛에 應用하여 大效함

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日2貼 合再湯 3回服

7. 藥　　理 : 消導, 淸熱, 開鬱, 鎭靜의 作用이 있는 것으로 推測됨

8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵을 禁하며 服藥上 副作用은 별로 없다.

[評價 및 意見]

1. 多分히 神經性 胃腸機能障碍에서 오는 腹痛에 試用해 볼만한 治療法으로 간주됨

2. 寒症腹痛 또는 腹冷泄瀉腹痛 같은 경우에는 不適하며 加減이 필요할 것 같음

3. 小兒腹痛에 特效한 点, 追試해 볼 필요가 있겠음

18. 肝臟肥大의 감별診斷 및 治療法(金氏穴)

△提出者 : 서울특별시 강남구 원광대부속한방병원 金 永 萬

1. 傷 病 名 : 肝臟肥大의 鑑別진단 및 治療(金氏穴)
2. 主要症狀 : 腹診上 右側胸脇苦滿이 있는 境遇의 감별과 그 治療
3. 治療實績 :
   ① 肝癌, 肝경화, 위축등 症을 除外한 良性肝疾患에 効
   ② 1回針施術로 肝肥大消失
   ③ 거의 全例에서 効
4. 效能, 效果 :
   ① 肝肥大를 의심하는 (腹診上) 例에서 1回 施術로 감별
   ② 單純肝肥大 또는 良性疾患時 1回 施針으로 1~2分后 効
5. 副作用, 禁忌 : 없음
6. 處方內容 또는 鍼灸療法
   部位 : 右側足 3~4趾間足背側骨間筋上(短趾伸筋 바로 上部) 手指端으로 下部에서 上部를 向하여 밀고 올라가면 정지하는 곧은 金氏穴이라 稱
7. 加減活用(修治法 또는 技法)
   ① 5分을 直刺入
   ② 5分~20分까지 留鍼
   ③ 右側陽陵泉과 併用하며 効增
8. 學術的 根據 : 없음. 앞으로 규명이 요함
9. 學術會 等 發表與否 : 동대문, 영등포, 관악구, 부산 보수 교육에서 발표 (75~76년도)
10. 秘藏된 來歷 : 臨床效能이 없을 때 穴을 잘못잡아 施針한 즉 奇異하게도 效果를 봄

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 肝臟肥大
2. 診 斷 : 右側胸脇苦滿이 있으며 肝臟肥大가 触知되거나 但, 肝癌, 肝硬化, 肝痿縮등을 除外한 良性 肝臟肥大인 경우
3. 症 狀 : 寒熱, 惡嘔등 肝臟肥大에 따른 諸症狀이 일어남
4. 鑑別法 및 治療法 :

   部 位 : 右側 足 3~4趾間에서 足背側骨間筋上(短趾伸筋) 바로 上部 즉 診者가 手指로서 足趾에서 上部로 밀어 올라가면 停止되는 곳(圖面參照)

   施術法 : 5分정도(약 1cm) 直刺하여 5~20分間 留針

   效 果 : 1回 刺鍼으로서도 肝脾大가 消失됨을 確認할 수 있음 (施針後 1~2分 見効) 肝肥大가 疑心될 時 1回 施術로서 鑑別됨
5. 應 用 : 肝肥大與否를 鑑別하는데 應用되며 肝肥大가 되었을 경우는 刺針 施術로서 肥大를 消失시킬 수 있음
6. 學術的 根據 : 未詳이며 앞으로 규명이 필요함
7. 禁忌 및 副作用 : 별로 發見치 못하였음

[評價 및 意見]

1. 經驗的으로 發見된 奇穴이라고 보여지며 經絡上의 硏究考察이 필요함
2. 追試 및 實驗硏究의 價値있는 治療法으로 간주됨

19. 陰虛火動 肺結核 治療法

△提出者 : 大邱市 南區 의료법인 文星漢方病院 徐 文 敎

1. 傷 病 名 : 陰虛火動 肺結核
2. 主要症狀 : 咳嗽吐痰盜汗自汗 午後恒寒潮熱遺精泄
3. 治療實績 : 20年間의 陰虛火動患者의 治療中 70% 以上 治療됨.
4. 效能效果 : 最小 50%, 最高 70% 以上의 效力을 得할 수 있다
5. 副作用, 禁忌
   ① 熟地黃이 法制가 잘 안되었을 때 消化障碍가 있을 수 있음
   ② 鷄猪酒麵
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 甘草, 五味子, 枇杷葉, 陳皮, 黃芩, 黃芪, 別甲, 貝母, 知母, 天門冬, 麥門冬, 地骨皮, 枸杞子, 白茯苓, 山茱萸, 山藥, 熟芋
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 低血壓者 加入蔘 3.75g~7.5g, 咳甚者는 加 元百合(3錢) 11.25g
8. 服用方法 : 식후 1시간만에 1첩씩 복용하고 2첩 복용후 2첩 찍정을 합쳐서 재탕함
9. 學術的 根據 : 熟芋, 山茱萸, 枸杞子 補肝胃經하고, 茯苓, 山藥은 入脾胃陽經하여 補陰和中. 『張景岳全書』 51卷 2頁 參照
10. 學術會등 發表與否 : 發表한 바 없음
11. 秘藏된 來歷 : 金在誠先生任으로부터 傳受하였음. 加減應用은 本人의 經驗에 依하였음
12. 其他事項 : 處方의 分量表示

완 치	현저한 효과	증세 호전	치료 중단	무 효
66名 (33%)	42名 (21%)	36名 (18%)	38名 (19%)	18名 (9%)

※ 治療實績(總 200名中)

*치료기간 : 보통 20～40余日間 治療, 甚結核時 40～70日

* 處方內容分量 : 熟苄 15g(4錢), 山藥 7.5g(2錢), 山茱萸, 白茯苓, 枸杞子, 地骨皮, 麥門冬, 天門冬, 知母 各 5.6g(各 1錢半), 貝母, 別甲, 黃芪, 黃芩, 陳皮, 枇杷葉 各 3.75g(各 1錢), 五味子 1.87g(5分), 甘草 3.75g(1錢)

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 陰虛 火動症(肺結核)
2. 診 斷 : 陰陽調和가 안 되는 狀態에서 陰虛로 因한 陽(火)의 熾盛으로 上焦 機能의 枯燥와 下焦機能의 虛衰를 示顯하며 特히 肺結核 또는 消耗性 疾患에서 많이 볼 수 있음
3. 症 狀 : 咳嗽, 吐痰, 盜汗自汗, 午後怕寒, 潮熱遺精, 泄瀉等 症
4. 治 療 法 : 熟地黃 15gm, 山藥 7.5gm, 山茱萸, 白茯苓, 枸杞子, 地骨皮, 麥門冬, 知母, 天門冬 各 5.6gm, 貝母, 別甲, 黃芪, 黃芩, 陳皮, 枇杷葉 各 3.75gm, 五味子 1.875gm, 甘草 3.75gm
5. 應 用 : 低血壓者 加 人蔘 3.75～7.5gm, 咳甚者 加 元百合 11.25gm
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食後 1時間服, 1日2貼 合再湯 3回服
7. 藥 理 : 熟地黃, 山茱萸, 枸杞子등은 補肝 腎經하고 白茯苓, 山藥은 脾胃腸에서 補陰和中하는 作用이 있는 것으로 추리됨. 熟地黃의 法制를 철저히 할 것
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒, 麵을 禁하며 腸에 炎症 또는 消化作用이 있는 경우는 不良함
9. 其他 治療實績

효과 / 구분	완 치	현 저	호 전	미 상	무 효
총환자수(200명)	66명(33%)	42명(21%)	36명(19%)	38명(19%)	18명(9%)
치료기간	보 통 20 일 ～ 40 일 간 치 료				

[評價 및 意見]

1. 陰虛火動症에 흔히 應用되는 治療法으로 但, 藥性이 泥滯한 藥物이 많으므로 消化機能 및 腸機能이 弱한 患者에 投與는 愼重을 要할 것으로 思料됨
2. 診斷上 肺結核이 確實하면 抗結核劑의 併用이 效果促進에 도움을 줄 것으로 思料됨

20. 陰虛火動症 肺結核 治療法

△提出者 : 대구시 동구 재단법인제한동의학술원(제한한방병원) 변정환

1. 傷 病 名 : 陰虛火動症 肺結核
2. 主要症狀 : 發熱, 咳嗽, 吐痰, 喘息, 盜汗, 口乾
3. 治療實績 : 難易한 本疾患의 治療率을 새롭게 向上시켜주고 있으며 治療의 正確性을 立證하고 있다.
4. 效能效果: 此方光六味丸相間服之大神虛勞神効
5. 副作用, 禁忌 : 犯房과 辛燥之 飮食物을 禁함. 燥熱之劑를 忌함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 滋陰降火湯 - 百部根 11.25g, 生地黃, 熟地黃, 天門冬, 麥門冬, 知母, 貝母, 白朮, 白芍藥(酒炒), 白茯苓, 黃芪(蜜炒), 地骨皮 各 5.625g
7. 加減活用(修治法 또는 技法)
   - 骨蒸夜熱 加鱉甲 11.25g
   - 痰中帶血 加阿膠 11.25g 倍加熟地黃
   - 盜汗不止 加沙酸棗仁 7.5g 倍黃芪
   - 咽喉療或痛 加桔梗, 桑白皮 倍加貝母
   - 咳嗽痰多喘急 加人蔘, 沙蔘 各 7.5g
   - 遺精 加山藥, 芡實 各 18.75g, 牛膝 7.5g
   - 小便淋閉 加車前子, 萆薢 各 7.5g
   - 大便不實 加炒山藥, 白片豆 各 18.75g
8. 服用方法 : 1日 3回, 食間服 水煎服 溫服 微凉服
9. 學術的 根據 : 肺結核等症을 陰虛火動症으로 보며 五行의 相生相剋의 理致에서 動火를 消滅하는데는 滋陰이 무엇보다 必要하며 金生水의 原理를 利用
10. 學術會등 發表여부 : 別로 發表한 바 없음
11. 秘藏된 來歷 : 『集驗良方』(崇南楓坪□□述梓 崇南枊村 張少緖匡校) 血証門

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 陰虛火動症(肺結核)
2. 診 斷 : 肺結核 또는 消耗性 疾患 特有의 症狀들을 認診할 수 있으며 X線 및 理化學的檢査를 兼行할 수 必要가 있다
3. 症 狀 : 發熱, 咳嗽, 吐痰, 喘急, 盜汗, 口乾등 症이 있음
4. 治 療 法 : 滋陰降火湯

   百部根 11.25gm, 生地黃, 熟地黃, 天門冬, 麥門冬, 知母, 貝母, 白朮, 白芍藥酒炒, 白茯苓, 黃芪蜜炙, 地骨皮 各 5.625gm
5. 應 用 : ◎ 骨蒸夜熱 加別甲 11.25gm
   ◎ 疾中帶血 加 阿膠 11.25gm 熟地黃 增量
   ◎ 盜汗不止 加 酸棗仁炒 7.5gm 倍黃芪
   ◎ 咽喉痛或痛 加 桔梗, 桑白皮 倍貝母
   ◎ 咳嗽痰多喘急 加 人蔘, 沙蔘 各 7.5gm
   ◎ 遺精 加 山藥, 芡實 各 18.75gm, 牛膝 7.5gm
   ◎ 小便淋閉 加 車前子, 萆薢 各 7.5gm
   ◎ 大便不實 加 山藥炒, 白片豆 各 18.75gm
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間溫服 또는 微凉服 1日 2貼, 合再湯 3回服
7. 藥 理 : 滋陰劑인 生地, 熟地, 天門, 麥門등과 降火劑인 知母, 地骨皮, 白芍藥등과 抗結核 殺菌劑인 百部根등의 具備로 補腎水 滋陰降火 補益의 作用이 있을 것으로 추리됨
8. 禁忌 및 副作用 : 辛燥性 및 刺戟性飮食物을 禁하며 性交行爲를 警戒함. 服藥上 副作用은 별로 發見치 못하였음

[評價 및 意見]

1. 漢醫學上 肺病의 証이 갖추어진 上記症狀이 具備되었으면 治療效果를 期待하기에 足한 治療法이라고 思料된다.
2. 重症의 肺結核인 경우는 抗結核劑의 併用이 더욱 效果的일 것으로 보여짐.

21. 肺膿症 治療法

△提出者 : 釜山市 西區 大東漢醫院 朴 千 來

1. 傷 病 名 : 肺結核
2. 主要症狀 : 吐膿, 吐痰, 咳嗽, 結胸 等
3. 治療實績 : 開業 30年間 累次使用하여 特效하였음
4. 效能效果 : 最危急症外는 100% 完治됨
5. 副作用, 禁忌 : 藥物副作用 없음(禁忌關食)
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 金銀花 20g, 蒲公英 20g, 柴胡 12g, 當歸 8g, 川芎 3g, 白芍藥 8g, 白茯苓 8g, 黃芩 6g, 桔梗 4g, 枳殼 4g, 靑皮 3g, 木香 4g, 天花粉 4g, 桑白皮 4g, 百合 4g, 貝母 4g, 砂仁 4g, 薏苡仁 8g, 連翹 4g, 瓜婁仁 4g, 麥門冬4g, 甘草 4g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 便滑者 澤瀉, 車前子 各 4g 加用
8. 學術的 根據 : 『方藥合編』 桔梗湯에 獨創的 加味方임
9. 學術會등 發表與否 : 發表없었음
10. 其他事項 : 備考 上記方으로 10貼程度 服用則 吐膿半減하며 呼吸, 安息하며 5劑 完治됨

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 肺膿症
2. 診 斷 : 肺膿瘍, 結核性肺洞空 및 侵潤等 症과의 鑑別을 要한다
3. 症 狀 : 吐膿, 吐痰, 咳嗽, 結胸等
4. 治 療 法 : 加味桔梗湯

   金銀花, 蒲公英 各 20gm, 柴胡 12gm, 當歸 8gm, 川芎 3gm, 白芍藥, 白茯苓 各 8gm, 黃芩 6gm, 桔梗, 枳殼, 木香, 天花粉, 桑白皮, 百合, 貝母, 砂仁, 靑皮 3gm, 薏苡仁 8gm
5. 應 用 : 便滑者(泄瀉) 加澤瀉, 車前子 各 4gm

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日 2貼 合再湯 3回服

7. 藥　　理 : 『方藥合編』 桔梗湯의 加味方으로 消炎排膿作用이 强하며 10貼정도 服用하면 吐膿半減되며 5劑정도면 治療

8. 禁忌 및 副作用 : 刺戟과 肉體的 動搖를 禁하고 腥臭性 魚閔等의 攝取를 禁忌한다. 服藥上 副作用은 별로 發見히 못하였음

[評價 및 意見]

1. 肺膿瘍으로 確診된 患者에게는 投與해 볼만한 治療法임

2. 排膿, 消毒, 淸熱등의 効가 있을 것으로 보아 實驗硏究를 해볼만한 治療法으로 간주됨

22. 流行性 毒感 治療法

△提出者 : 江原道 三陟 春光漢醫院 鄭 浩 仁

1. 傷 病 名 : 流行性 毒感
2. 主要症狀 : 頭痛, 惡寒, 發熱, 肢節痛, 食慾不振, 無汗, 咳嗽, 鼻寒, 胸滿
3. 治療實績 : 90%이상 治療效果를 得함
4. 效能效果 : 輕症 2日~3日, 重症 5日
5. 副作用, 禁忌 : 돼지고기, 닭고기, 가루음식, 술
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 蒼朮 7.5g, 柴胡, 前胡, 羌活, 獨活, 枳殼, 桔梗, 川芎, 赤茯, 黃芩, 防風, 白芷, 古本, 乾地黃, 細辛, 薄荷, 麥門冬, 桑白皮, 杏仁, 五味子, 甘草 各 3.75g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 生薑 3片, 大棗 2個, 葱白3
8. 服用方法 : 食后約 30分后 服用, 1日 3回
9. 學術的 根據 : 『方藥合編』에 있는 九味羌活湯과 敗毒散의 合方(中統 11) (中統 19)
10. 秘藏된 來歷 : 本人의 경험방법
11. 其他事項 : 上記 處方中 咳嗽가 甚할 時에 杏仁, 桑白皮, 麥門冬, 五味子를 加함 咽痛이 有할 時는 桔梗을 倍加함

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 流行性 毒感
2. 診 斷 : 流行性 感冒의 解熱處方인바 消化器性 感冒와 鑑別을 要함
3. 症 狀 : 頭痛, 惡寒, 發熱, 肢節痛, 食慾不振, 無汗, 咳嗽, 鼻寒, 胸滿
4. 治 療 法 : 九味羌活敗毒散合方

   蒼朮 7.5gm, 柴胡, 前胡, 羌活, 獨活, 枳殼, 桔梗, 川芎, 赤茯苓, 黃芩, 防風, 白芷, 古本, 乾地黃, 細辛, 薄荷, 麥門冬, 桑白皮, 杏仁, 五味子, 甘草 各 3.75gm, 生薑3片, 大棗2枚, 葱白 3枚

5. 應　　用 : 咳嗽甚者增 杏仁, 桑白皮, 麥門冬, 五味子, 咽痛增 桔梗

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食後 30分服 1日 2貼 合再湯 3回服

7. 藥　　理 : 解熱鎭痛, 發散作用이 있으며 『方藥合編』의 九味羌活湯과 敗毒散을 合方한 것임

8. 禁忌 및 副作用 :

鷄, 猪, 麵, 酒 및 冷菓物을 禁食하고 虛弱者인 境遇는 過度한 服藥을 禁하며 減量이 必要함

[評價 및 意見]

1. 季節性 流行性 感冒에 自古로 定評이 있는 發散發汗劑이긴 하나 外感性 感冒로 診斷되었더라도 患者의 元氣虛弱한 境遇에는 服用에 愼重을 要한다.

2. 感冒治療方으로 漢方臨床界에서 흔히 使用되고 있는 治療法임

23. 流行性 感冒 治療法

△提出者 : 京畿道 始興郡 부곡한의원 金 象 日

1. 傷 病 名 : 流行性 感冒
2. 主要症狀 : 發熱, 惡寒, 肢節痛副甚 一般外感보다 甚
3. 治療實績 : 2년간 常用
4. 效能效果 : 輕症은 2첩 기상하고 4첩 2일분 服이면 起床
5. 副作用, 禁忌 : 無함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 蒼朮, 桂枝 各各 7.5g, 厚朴, 陳皮, 山査, 乾干, 草果, 茯苓 各 3.7g, 川芎, 甘草 2g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 古方에 金銀花 5錢, 夏苦草 2錢 加하야 投與하였음
8. 服用方法 : 本方 2첩을 10分間 沸騰水煎하야 2回分服
9. 學術的 根據 : 『醫鑑重磨』 附篇 扶陽集外感章에 外感發熱 肢節痛方으로 기재
10. 學術會등 發表與否 : 없음
11. 秘藏된 來歷 : 上記 『醫鑑重磨』는 著者未詳 筆傳冊子로 35년 無免許醫로부터 本人이 筆記한 冊子로 確實히 漢方醫理에 通達한 名醫임
12. 其他事項 : 水原 藥業支社要員等이 冊發刊 목적으로 수차례 방문하였으나 如意치 못하고 本人이 한의대 교무과에 副敎材 가치여부도 特參問說

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 流行性 感冒
2. 診　　斷 : 季節性 外感症으로서 消化障碍를 兼한 경우이며 一般發熱疾患과의 鑑別을 要한다.
3. 症　　狀 : 發熱, 惡寒, 肢節痛甚 一般 外感보다 甚한 症狀

4. 治 療 法 :

蒼朮, 桂枝 各 7.5gm, 厚朴, 陳皮, 山査, 乾干, 草果, 茯苓 各 3.75gm, 川烏, 甘草 各 2gm

5. 應　　用 : 金銀花 18.75gm, 夏苦草 7.5gm 加味하여 投與할 境遇도 있다

6. 用　　法 : 本 處方 2貼을 10分間 煮沸하여 1日 2回에 分服한다

7. 藥　　理 : 本 處方에 配合되고 있는 川烏는 極烈한 熱性藥으로서 全體的인 處方의 性格도 溫熱한 藥性이다

8. 禁忌 및 副作用 : 별로 發見치 못하였음

[評價 및 意見]

1. 消化機能障碍를 隨伴하는 感冒에 使用해 볼만한 治療法이긴 하나 方中에 川烏가 들어 있으므로 愼重한 考慮가 있어야 할 것임

2. 一般的으로 잘 應用되지 않는 治療法이므로 追試를 通한 效果의 確認이 必要함

24. 扁桃腺炎 治療法

△提出者 : 忠南 錦山 錦南漢醫院 金 定 圭

1. 傷 病 名 : 外感風熱에 咽喉腫痛이나 扁桃腺炎 外部 耳下項部 腫大
2. 主要症狀 : 扁桃腺炎은 治療가 잘됨
3. 治療實績 : 百發百中 治療 100%
4. 效能効果 : 大效를 이룸
5. 處方內容 또는 鍼灸療法

   淸火湯～玄蔘, 荊芥, 防風, 連翹, 犀角方, 黃芩, 黃連, 桔梗, 甘草, 薄荷, 升麻, 滑石, 黃柏 各 3.75그람, 竹葉 7片 5貼
6. 服用方法 : 1日 2回 食上服 徐徐服用下
7. 秘藏된 來歷 : 裡里 北一面에 어느 3代 醫術로 내려온 名醫家門의 秘方으로 내려온 處方임

※ 風虫齒를 莫論 大效

石吉湯 : 石膏 7.5g, 荊芥, 防風, 白芷, 升麻, 細辛, 芒硝, 薄荷, 檳榔, 川椒 各 3.75g, 3貼

※ 肋膜炎 特效

金歸散 : 金銀花 18.75g, 當歸 15.0g, 蒲公英 7.5g, 天花粉, 甘草, 敗醬 各 3.75g, 10貼을 1貼으로 調製. 5次分服

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 扁桃腺炎
2. 診 斷 : 外感風寒으로 因한 咽喉腫痛 및 扁桃腺炎, 外部 或 耳下線部腫炎
3. 症 狀 : 鼻寒, 頭重, 惡寒發熱등 外感症狀과 함께 咽痛, 嚥下困難等

症이 있음

4. 治 療 法 : 淸火湯

玄蔘, 荊芥, 防風, 連翹, 犀角方, 黃芩, 黃連, 桔梗, 甘草, 薄荷, 升麻, 滑石, 黃柏 各 3.75gm, 竹葉 7片

5. 應　　用 : 風熱로 因한 扁桃腺炎, 咽喉炎 等이 淸熱消炎의 目的으로 應用하며 風熱로 因한 齒痛에도 本方의 應用이 可能하나 다음과 같이 處方으로도 適效를 期待할 수 있다

* 石古湯

石膏 7.5gm, 荊芥, 防風, 白芷, 升麻, 細辛, 芒硝, 薄荷, 檳榔, 川椒 各 3.75gm, 3貼連服

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食後服 徐徐服下 1日 2貼

7. 藥　　理 : 淸解消炎劑로서 『方藥合編』의 「必用方甘桔湯」加味方임

8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 麵 及一切 腥物 및 冷藥物을 禁하여 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 藥性이 寒冷하고 發散力이 强한 處方인 바 平素 消化機能이 弱한 患者에게는 服用을 愼重히 해야 할것으로 보여짐

2. 一般的으로 咽喉腫痛에 흔히 應用하는 治療方임

25. 滲出性 肋膜炎 治療法

△提出者 : 江原 寧越 大東漢醫院 丁 相 鎭

1. 傷 病 名 : 滲出性 肋膜炎
2. 主要症狀 : 寒熱往來, 脇痛, 喘咳, 不能飮食倒飽, 尿不利
3. 治療實績 : 30名
4. 效能效果 : 85%
5. 副作用, 禁忌 : 嘔吐
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 蟾酥散
7. 加減活用 : 두꺼비를 잡아 陽, 陰乾한 다음 微溫的인 불에다 焙乾한 다음 粉末을 하여 使用함
8. 服用方法 : 粉末을 藥匙 하나式 20分마다 4봉을 가지고 80分間에 모두 물로 마신다.
9. 學術的 根據 : 申佶求先生任 本草下 181페이지
   主治散腫消毒治惡瘡 療癰疽 殺疳虫
10. 秘藏된 來歷 : 約 25年前 6.25 事變 다음 해에 제가 直接 이 病에 걸려 허덕이고 갖은 方法으로 治療를 하였으나 治療가 되지 않아서 있던 중 어떤 아주머니가 아주 酷寒인 冬節인데 公開 이 藥을 防空壕에서 1개를 得하여 使用, 完治되었음

※ 이 藥은 約 1時間內에 尿 14번~7번정도 多量이 나오게 되면 完速治된 것이다

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 滲出性 肋膜炎
2. 診 斷 : 主訴症狀과 兼하여 理化學的檢査에 依하여 滲出性 肋膜炎임을 確認해야한다. 肺膿瘍, 胸膜炎 또는 肋間神經痛과 鑑別을 要한다.

3. 症　　狀 : 寒熱往來, 脇痛, 喘咳, 不能飮食倒飽, 尿不利

4. 治 療 法 : 蟾酥散

두꺼비를 잡아서 陽, 陰乾하여 微溫的인 불에 焙乾한 다음 粉末을 하여 使用함

5. 應　　用 : 惡瘡, 癰疽, 瘰癧 등에도 應用할 수 있음

6. 用　　法 : 粉末을 藥匙 하나式 20分마다 한 봉式 80分間에 4봉을 溫水和服한다. 服用後 約 1時間內에 尿가 7回~14回로 排泄되면 速效함

7. 藥　　理 : 强心排毒劑로서 自古로 惡性腫瘍에 使用하였다.

Bufotoxin을 成分으로 하고 있으며 辛苦熱性으로 有毒하다. 治疳消鼓하며 鮮疔毒하고 通經驗한다

8. 禁忌 및 副作用 : 未稍神經에 麻痺作用이 强한 有毒性 藥品인 까닭에 元氣衰弱한 患者에게는 服用을 愼重히 해야한다. 服藥中 嘔吐症이 일어날 수 있음

[評價 및 意見]

1. 肋膜炎이란 病自體가 氣力을 消耗시키는 作用이 强한 까닭에 有毒性 藥品을 單味로 投與하는 것은 操心해야 할 것으로 思料된다.

2. 實證性인 경우에 加用해 볼 만하며 效果確認을 위한 實驗硏究가 必要한 治療方임

26. 嘔逆 治療法

△提出者 : 大邱 南區 醫療法人 文星漢方病院 徐 文 敎

1. 傷 病 名 : 吃逆, 딸꾹질(깔딱질)
2. 主要症狀 : 어떠한 重患者에게도, 平常人에게도 無所不效다.
3. 治療實績 : 臨床에서 累試累驗, 無不得效다 (25名中 25名 完治)
4. 效能效果 : 2貼에서 5貼 以內에 治療된다.
5. 副作用, 禁忌 : 形寒飮冷을 避한다. 副作用은 없다.
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 熟地黃 4錢(15.0g), 山藥 2錢(7.5g), 山茱萸, 牧丹皮, 澤瀉, 白茯苓 各 1錢半(5.625g)
7. 加減活用 : 加貢砂仁炒 2錢
8. 服用方法 : 食後 1時間 溫服
9. 學術的 根據 : 溫腎 和中하여 橫膈膜의 痙攣을 解消한다
   『方藥合編』 80頁上 40
10. 學術會등 發表 : 發表한바 없음
11. 秘藏된 來歷 : 具參述氏로부터 傳受함

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 吃逆(딸꾹질, 깔딱질)
2. 診 斷 : 重病 또는 消耗性 疾患으로 元氣衰弱한 患者에게 橫膈膜痙攣症狀으로 吃逆이 일어난다
3. 症 狀 : 卒然 吃逆發聲 或은 數分間 또는 數時間 晝夜不止
4. 治 療 法 : 六味地黃湯
   熟地黃 15.0gm, 山藥 7.5gm, 山茱萸, 牧丹皮, 澤瀉, 白茯苓 各 5.625gm
5. 應 用 : 貢砂仁炒, 人蔘 各 7.5gm, 加味 尤效
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 每食後 1時間 混服. 1日 2貼 合再湯 3回服

7. 藥　　理 : 溫腎和中으로 痙攣을 解他시키며 元來 六味地黃湯은 體液의 涸□防止를 目標로 使用하는 滋陰益水의 處方인 바 本 吃逆(橫膈膜痙攣)도 極度로 衰弱한 患者에게 勸服할만 하다.
8. 禁忌 및 副作用 : 形寒飮冷을 避하며 服藥上 副作用은 별로 없다.

[評價 및 意見]

1. 長期的인 消耗性 疾患의 體液涸燥現象인 橫膈膜間代性 痙攣에 使用해 볼만한 處方이다.
2. 胃腸機能이 弱하거나 消化力이 不足한 患者에게는 消化障碍가 일어날 것을 考慮할 필요가 있음

27. 腎臟結石 治療法

△提出者 : 京畿 平澤 全漢醫院 全 鳳 和

1. 傷 病 名 : 腎臟結石
2. 主要症狀 : 痛症은 疝痛이라 이것이 腎結 疝痛임. 腰部에서 發作 下腹 放散하고 血尿를 得함
3. 治療實績 : 1976年度

구분 \ 효과	完 治	현저한 효과	증세호전	미 상
診療數 6	4 名		1 名	1 名
完治 또는 症勢好轉 日字	14 日		3日	3日

4. 效能效果 : 1~2貼만 服用하여도 尿中 血量이 減少되며 痛症 減함
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   灯心, 豬苓 各 5g, 澤瀉, 白朮, 陳皮, 厚朴, 神曲, 檳榔, 麥門冬, 通草 各 3.75g, 生干 3片, 甘草 3.75g
6. 加減活用 : 尿中 血分이 減少되면 灯心, 豬苓量減하여 等分함
7. 服用方法 : 1日 3回, 每3時 公僕으로 服用함
8. 秘藏된 來歷 : 家傳秘方中에서
   ※ 結石除去手術을 아니하고 完治되는 点임

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 腎臟結石
2. 診 斷 : 腎結石 特有의 腰脇에 放散性 疝痛과 함께 尿檢査에서 血尿가 顯著하다.
3. 症 狀 : 腰脇部 放散性 疝痛과 血尿

4. 治 療 法 :

灯心, 豬苓 各 5g, 澤瀉, 白朮, 陳皮, 厚朴, 神曲, 檳榔, 麥門冬, 通草 各 3.75g, 生干 3片, 甘草 3.75g

5. 應　　用 : 尿中血分이 減少되면 灯心, 豬苓을 減量投與한다.

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 每空腹時 服用함

7. 藥　　理 : 利水消導하는 藥性을 가진 順平한 藥性임

8. 禁忌 및 副作用 : 별로 없으며 但, 鷄猪酒麵과 冷藥物을 禁忌한다.

[評價 및 意見]

1. 順平利尿之劑로서 結石의 溶解力은 不足하나 緩解劑로서 사용할 만하다.
2. 따라서 急性으로 發作하는 結石症에 對하여 速效를 發할지 疑問視되며 慢性 結石症에 長期投與에 妥當할 것으로 思料됨

28. 遺尿症 治療法

△提出者 : 京畿 安養 廣齊漢醫院 柳 錫 熙

1. 傷 病 名 : 遺尿症
2. 主要症狀 : 元氣不足, 下焦不足
3. 治療實績 : 1976. 7. 20 이○○ 78才 老人 男
   補中益氣湯(山藥, 五味子 各 9.375g, 桑螵蛸 18.75g)
4. 效能效果 : 5回 ~ 10回 補效(小兒도 亦是 同上) 十上八九는 效果
5. 副作用, 禁忌 : 無. 鷄猪肉
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   補中益氣湯 加山藥, 五味子 各 9.375g, 桑螵蛸 18.75g
   桑螵蛸製造法 : 春秋에 採取하여 蒸氣로 할 것
7. 加減活用 : 以上과 같이 하여도 무방하나 下陷한 사람은 升麻를 酒炒하여 倍入. 또 老人에게는 人蔘을 黃芪와 同等入하여도 무방함
8. 服用方法 : 1日 3回 服用
9. 學術的 根據 : 臨床的으로는 老衰한 点과 小兒의 境遇는 下焦가 불실한 点을 들 수 있습니다. 그러므로 補中益氣하면 잘 됩니다.
10. 秘藏된 來歷 : 많은 家傳秘方(父) 醫書는 父親으로부터 傳受하였으나 事變으로 失傳되고 參考로 메모가 있습니다. 父親이 事業하신게 아니고 家庭에 傳하여 온 약장 醫書가 있었습니다.
11. 其他事項 : 科學의 發達 後 모든 시설이 된 후는 別로 治療가 적었으나 事變 前까지는 많이 治癒한 處方입니다. 비굴한 용의의 경험과 처방이오니 꾸지람 없으시며 받아주시기를 바랍니다.

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 遺尿症
2. 診　　斷 : 全體的으로 無力性體質者로서 膀胱括約筋無力弛緩에 依한

遺尿症에 限한다.

3. 症　　狀 : 元氣不足, 腫中遺尿
4. 治 療 法 : 加味補中益氣湯

黃芪, 當歸, 白朮, 人蔘, 陳皮 各 5.625gm, 甘草 3.75gm, 柴胡, 升麻 各 1.875gm, 生干 3片, 山藥, 五味子 各 9.375gm, 桑螵蛸 18.75gm

5. 應　　用 : 元氣下陷한 患者에게는 升麻酒炒하여 倍로 增量, 老人 및 虛弱者는 人蔘을 5.625gm로 增함
6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 服用
7. 藥　　理 : 處方名 그대로 補中益氣之劑에 收澁性이 强한 桑螵蛸, 山藥, 五味子를 加한 處方이다.
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄猪肉등을 禁하며 服藥桑 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 溫和한 補氣劑에 收澁劑를 加味配合한 處方內容인 바 勸服할만 하다.
2. 習慣性 遺尿症 같은 경우는 어떨지 疑問視되며 收澁性이 强한 桑螵蛸 등이 있으므로 追試해 볼만한 治療法으로 思料됨

29. 尿道結石症 治療法

△提出者 : 慶北 安東 東興漢醫院 申 大 湜

1. 傷 病 名 : 尿道結石症
2. 主要症狀 : 小便癃閉, 排尿困難
3. 效能效果 : 5貼~10貼 必效
4. 副 作 用 : 無
5. 禁 忌 : 辛醎之物
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加味五苓散 - 車前子 5錢, 滑石 3錢, 澤瀉 2錢半, 豬苓, 赤茯苓, 白朮 各 1錢半, 茴香, 木通 各 1錢, 知母, 黃柏 各 7分, 肉桂 5分
7. 加減活用 : 無
8. 服用方法 : 午前, 午後 空腹時 服用
9. 學術的 根據 : 溫腎, 利小便함으로 結石이 尿道를 通하여 排出됨
10. 學術會등 發表與否 : 無
11. 秘藏된 來歷(傳受받은 經緯) : 우연히 얻은 方文인데 愛用하여 보니 效果가 特有함

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 尿道結石症
2. 診 斷 : 腎臟結石症이 腰脇部에 放散狀疝痛이 甚한데 比해 本症은 少腹部 및 前立線에 痛症이 尤甚하고 小便不利와 排尿澁痛이 顯著
3. 症 狀 : 小便癃閉, 排尿困難
4. 治 療 法 : 加味五苓散

   車前子 18.75gm, 滑石 17.25gm, 澤瀉 9.375gm, 豬苓, 赤茯苓, 白朮 各 5.625gm, 小茴香, 木通 各 3.75gm, 知母, 黃柏 各 3.0gm, 肉桂 1.875gm

5. 應　　用 : 加減活用 없음

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 午前, 午後 空腹時 服用

7. 藥　　理 : 溫腎利少便하므로 結石이 尿道를 通하여 排出되며 利尿, 消導, 消炎 作用이 强함

8. 禁忌 및 副作用 : 辛鹹之物을 禁함. 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 尿道結石으로 確診된 患者일 境遇에는 勸服할 만한 處方이다.

2. 追試를 해 볼 만한 治療法으로 思料됨

30. 腎虛全身浮腫 治療法

△提出者 : 慶北 安東 義城漢醫院　南 相 濬

1. 傷 病 名 : 腎虛全身浮腫
2. 主要症狀 : 全身浮腫이 甚, 蛋白尿, 呼吸困難, 身重不能運, 尿煮沸則糊狀
3. 治療實績 : 安東市 景德中學生 黃在然 16才 男이 腎虛浮腫으로 성소병원, 大邱 東山病院을 入院해도 效果없이 數日. 더 견디기가 困難.
   柮醫는 腎虛로 斷定, 下氣方文으로 約 4個月에 完治
4. 效能效果 : 完治
5. 副作用, 禁忌 : 新藥에 라식스, 다이크짓트를 暫用은 可해도 繼續的으로 不可. 더욱 腎虛해지므로.
6. 加減活用 : 六味地黃湯加牛膝車前子
   熟地黃 4錢, 山藥, 山茱萸 各 2錢, 澤瀉, 白茯苓, 牧丹皮, 牛膝, 車前子 各 1錢半
7. 服用方法 : 空心服
8. 學術的 根據 : 『方藥合編』 上 40 六味地黃湯에 依據함

[審査內容]

1. 傷 病 名 : 浮腫(腎虛性)
2. 診　　斷 : 慢性 腎臟炎으로 確診된 患者로서 全身浮腫이 彌漫하고 蛋白尿가 檢出되는 者
3. 症　　狀 : 全身浮腫, 蛋白尿, 呼吸困難, 身重不能運
4. 治 療 法 : 加味六味地黃湯
   熟地黃 15.0gm, 山藥, 山茱萸 各 7.5gm, 澤瀉, 白茯苓, 牧丹皮, 牛膝, 車前子 各 5.625gm
5. 應　　用 : 加減應用 없음

6. 用　　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 空心溫服

7. 藥　　理 : 滋潤利水之劑로서 六味地黃湯의 補腎作用과 牛膝, 車前子의 利尿作用이 兼備하였음

8. 禁忌 및 副作用 : 難消化性飮食物을 禁하며 服藥上 副作用은 별로없음

[評價 및 意見]

消耗性 慢性 腎臟炎患者에게 投與해 볼 만한 處方이다. 但, 消化障碍가 甚한 患者에게는 消導劑의 加味가 있는 것이 좋을 것으로 思料된다.

31. 消渴(現病名 糖尿) 治療法

△提出者 : 서울 마포 杏南漢醫院 이 정 화

1. 傷 病 名 : 消渴(現病名 糖尿)
2. 主要症狀 : 多尿, 疲勞無力, 汗多, 不眠, 體重減少, 精力全無
3. 治療實績 : 約 20名 治療中, 約 80% 效力
4. 效能效果 : 約 9個月이면 完治
5. 副作用, 禁忌 : 糖味類, 澱粉類, 鷄, 猪, 酒, 煙草, 醎味, 鷄卵
6. 處方內容 :

   ※ 午前食間服處方

   玄蔘 37.50g 1錢, 山茱萸 7.5g, 麥門冬 18.75g, 肉桂, 五味子 各1.875g

   ※ 午後食間服 忌蘿葍

   熟地黃, 山茱萸, 麥門冬 各 37.50g(1양), 玄蔘 18.75g, 車前子 9.375g

7. 服用方法 : 2가지 處方으로 1日 2回 服用 食間服(煎服)
8. 學術的 根據 : 本人 治療中 臨床中 得方
9. 秘藏된 來歷 : 本人의 경험으로 작성된 처방
10. 其他事項 : 上記 處方은 本人이 4年間 消渴症으로 苦生하던 中 使用한 處方. 本人의 혈액형은 B형, 漢方四象醫學 少陽人

[審査內容]

1. 傷病名 : 糖尿病(消渴)
2. 診 斷 : 尿糖(食後 2時間 尿를 여러 차례 檢査)과 血糖(早朝 空腹市 140gm% 以上이면 確診)의 檢査로 診斷한다.
3. 症 狀 : 口渴, 多尿, 多識, 倦怠感, 瘙痒, 化膿傾向, 神經痛, 陰痿 등
4. 治療法 :

   (가) 午前方

玄蔘 37.5g, 山茱萸 7.5g, 麥門冬 18.75g, 肉桂 1.875g, 五味子 1.875g

(나) 午後方

熟地黃, 山茱萸, 麥門冬 各 37.5g, 玄蔘 18.75g, 車前子 9.375g

5. 應　用 : 加減 應用은 없음
6. 用　法 : 各各 煎湯으로 하여 午前方은 午前食間에, 午後方은 午後食間에 服用한다. 1日 2回
7. 藥　理 : 補陰, 除煩, 收斂制火, 凉血등의 作用이 있을 것으로 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 糖味類, 澱粉類, 鷄, 猪, 酒, 煙, 鹹味, 鷄卵등을 禁하며 服用中. 蘿蔔(무)를 禁食함

[評價 및 意見]

1. 處方內容이 簡單하나 그 構成이 좋으며 六味之類의 長期服用이 有效하다는 報告가 있는 것으로 보아 계속적 服用은 糖尿病에 效果가 있을 것으로 기대된다.
2. 그러나 糖尿病의 原因이 多樣하기 때문에 모든 糖尿病에 特效가 있다고 할 수는 없을 것임.

32. 腫脹 治療法

△提出者 : 대구 동구 재단법인 제동한의학술원 변 정 환

1. 傷 病 名 : 腫脹
2. 主要症狀 : 四肢面皆浮, 大便泄, 小便澁, 口渴, 身熱, 所食只是冷水而已
3. 治療實績 : 腫脹의 諸症狀을 迅速히 解消시키며 치료뿐만 아니라 豫防效果도 同時에 期待할 수 있다.
4. 效能效果 : 此方 70~80貼 服用. 諸症悉愈斷以水上丹調理而堇不發
5. 副作用, 禁忌 : 일체의 염분을 금하고 肥甘之食을 삼가하며 포식을 금할 것
6. 處方內容 : <四苓肥兒湯>

   白朮 5.625g, 茯苓, 澤瀉 各 3.75g, 山査肉, 神曲, 使君子肉, 麥芽, 人蔘 各 1.875g, 豬苓, 黃連, 車前子, 甘草 各 1.25gm, 蘆苓 0.75g, 官桂 0.375g
7. 加減活用 :

   ○ 증상에 따라 白朮 11.25g, 人蔘 3.75g, 日黃連 1.85g을 加한다.

   ○ 食慾不振에 白豆久 3.75g, 泄瀉에 肉豆久 3.75g을 加한다.
8. 服用方法 : 1日 3回, 食前 1時間 水煎服, 溫服
9. 學術的 根據 : 소감, 이뇨작용이 강하므로 부호가 자제들의 과식, 고량진미로 인한 有餘症을 제거하며 선천수기를 보강하는데 있음
10. 秘藏된 來歷 : 無顯單方(家傳方임)

[審査內容]

1. 傷病名 : 腫脹(腹膜炎)
2. 診 斷 : 腎臟炎이나 肝臟의 異常으로 腔內 貯留液이 있는지의 與否를 診斷하며, 腹壁打診으로 腹水를 認定할 수 있다. (600~1000㎖가 存在하면 確認됨)

3. 症　狀 : 四肢 및 顔目이 모두 浮腫이 오고 大便泄 小便澁과 口渴, 身熱 등이 일어남

4. 治療法 : 四苓肥兒湯

白朮 5.625gm, 茯苓 3.75gm, 澤瀉 3.75gm, 山査肉, 神曲, 使君子肉, 麥芽, 人蔘 各 1.875gm, 豬苓, 黃連, 車前子, 甘草 各 1.25gm, 蘆苓 0.75gm, 肉桂 0.375gm

5. 應　用 : 症狀에 따라 白朮 11.25gm, 人蔘 3.75gm, 日黃連 1.85gm로 增加한다.

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 食前 1時間마다 服用

7. 藥　理 : 去濕, 利尿, 消滯, 補中治濕, 治消疳 등의 目的으로 構成되어 有餘를 제거하고 水氣를 補한다.

8. 禁忌 및 副作用 : 一切의 鹽分을 禁하고 肥甘之食을 삼가며 飽食하지 말 것. 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 比較的 平凡한 處方으로 補中, 治濕, 消疳하도록 되어 있어 가벼운 마음으로 使用할 수 있는 處方이다.

2. 植物性 利尿劑로 副作用이 없어 安心하고 處方할 수 있으며 症狀好轉을 기대할 수 있다고 보여짐

33. 卒中風(腦溢血) 治療法

△提出者 : 釜山 南區 密陽漢醫院 金 宗 烈

1. 傷 病 名 : 卒中風(腦溢血)
2. 主要症狀 : 卒然昏倒, 不省人事, 痰延壅盛, 言語塞澁, 右手足不遂
3. 治療實績 : 星香正氣散, 藿香正氣散加 南星 木香 10貼, 地黃飮子 50貼
4. 效能效果 : 5個月 完治
5. 副作用, 禁忌 : 鷄猪酒
6. 處方內容 : 泗關三里湧泉大敦補 太白風市瀉 口喝斜 啞門風府瀉 (中風)
7. 加減活用 :

左手陽經 右手陰經 午前進前, 右手陽經 左手陰經 午後退後 午前退後 午後進前 直刺 1~3寸

*深度 - 補 法 99-81, 瀉 法 66-36

8. 服用方法 : 1日 3回 食間服

※ 傷寒陽症 陰症

陽症 發熱惡寒 頭項肢節痛煩渴不欲近衣

陰症 四肢厥冷吐利不渴精踡臥引衣自覆

表症 初得病 二三日頭身病惡寒發熱脉浮者表症

裏症 發熱不 不惡寒 反惡熱 大便硬 小便赤 譫言潮熱症 表症可汗 麻黃湯依主 可下調胃升氣湯

傷寒陽毒 狂亂向赤眼紅身熱發斑或 下痢 黃赤大脈 洪大名 日 陽毒(現代發診디프스) 三黃石膏湯

傷寒陰毒 四肢厥冷吐利不渴 精踡臥 甚則 咽痛 □□ 甘草湯 一名 升麻別甲湯

傷寒潮熱 1日 1發 指時而發者也 1日~ 3.5日發者 非潮熱也 邪入胃則發潮熱 小柴胡湯

傷寒發狂 熱毒在併入於心

表裏俱熱者 三黃石膏湯
裏熱者 大承重湯加黃連
狂言 膽語者 辰砂五苓散

[審査內容]

1. 傷病名 : 卒中風(腦溢血, 腦較化 등으로 發作)
2. 診 斷 : 平素 高血壓患者에 있어서 腦動脈硬化를 가지고 있어 出血性發作을 일으켜 突然 偏枯를 가져온다.
3. 症 狀 : 卒然昏倒, 人事不省, 痰延壅盛, 言語寒澁, 手足不遂(半身不遂)
4. 治療法 :
   가) 星香正氣散 (藿香正氣散 加 南星, 木香)
   나) 地黃飮子 (本方)
   다) 四關, 三里, 湧泉, 大敦을 補하고 太白, 風市를 瀉한다. 口眼喎斜면 啞門, 風府를 瀉한다.
   또한 右手陽經, 右手陰經 午前進前 右手陽經 左陰經, 左手陰經後, 午前退后 午後進前 直刺 1~3寸. 深度 (補法은 99~81, 瀉法은 66~36)
5. 應 用 : 中風後遺症으로 半身不遂, 語難 등에도 應用할 수 있음
6. 用 法 : 藥物은 水煎去渣하여 1日 3回 食間服用
7. 藥 理 : 藿香正氣散은 內傷과 外感을 兼治하고 發散力이 있어 南星을 加하여 去痰, 治風, 散血하고 木香을 加하여 諸氣를 伏降케 한다.
   또한 地黃飮子는 補陰滋肺로 血液循環을 이롭게 한다.
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄猪酒 및 脂肪質을 禁한다. 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 星香正氣散은 卒中風에 흔히 應用되는 處方으로 가장 安心하고 投藥할 수 있다고 보겠으며 地黃飮子 역시 中風後遺症 治療에 많이 應用되는 處方임
2. 長期治療에 應用되는 治療法으로 妥當하다고 思料됨

34. 本態性 高血壓症 治療法

△提出者 : 서울 城北 蒼生堂漢醫院

1. 傷 病 名 : 本態性 高血壓症
2. 主要症狀 : 頭目眩暈, 腦中作疼, 心中煩燥, 恒覺有熱, 脉象弦硬
3. 治療實績 : 10人 施治中 8人 治癒
4. 處方內容 :

   建瓴湯 - 山藥 1兩(37.5g), 牛膝 1兩(37.5g), 生代赭石 8錢(30g), 龍骨 6錢(22.5g), 牡蠣 6錢(22.5g), 生地黃(22.5g), 白芍藥(15g), 栢子仁(15g)
5. 加減活用 : 大便不實者 去代赭石 蓮子肉 11.25g 若畏 畏凉者以 熟地易生地
6. 服用方法 : 1日 2貼 再煎, 1日 3服 食間服
7. 學術的 根據 : 『哀中參西錄』 第2卷(張錫純 著)

[審査內容]

1. 傷病名 : 本態性 高血壓
2. 診 斷 : 平素에 高血壓症이 있으며 年令, 生活環境에 따라 더욱 甚해진다. 脉象은 弦硬하다.
3. 症 狀 : 頭目眩暈, 腦中作痛, 心中煩燥, 恒覺有熱
4. 治療法 :

   *建瓴湯

   山藥 37.5g, 牛膝 37.5g, 代赭石 30.0g, 龍骨 22.5g, 牡蠣, 生地黃 各 22.5g, 白芍藥 15.0g, 栢子仁 15.0g
5. 應 用 : 大便不實이면 去 代赭石 加 蓮子肉 11.25g하고 萬若 畏凉하면 生地黃을 熟地黃으로 바꾼다.
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 2貼을 再煎하여 3回를 食間에 服用한다.

7. 藥　理 : 代赭石이 主藥으로 肝, 心包의 血熱을 平하게 하고 消瘀通經, 收斂下行시키는 作用이 있는 것으로 추리됨

8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒 및 脂肪質을 禁하며 安靜된 環境을 要한다. 服藥上 副作用은 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 藥性이 順하여 長期間 使用하여 볼 만하며 代赭石의 淸熱降火하는 效果를 기대한 점이 特異함

2. 試用해 볼만한 治療法이며 實驗硏究를 해 볼만한 價値가 있다고 思料됨

35. (中風) 腦溢血 末梢神經 治療法

△提出者 : 慶南 密陽 成晨漢醫院 朴 淳 遠

1. 傷 病 名 : (中風) 腦溢血 末梢神經
2. 主要症狀 : 皆因卒倒 體氣虛弱 榮衛調失調 七情酒色勞力所傷以致眞氣耗散
3. 治療實績 : 拾人六割所要
4. 效能效果 : 限 4週日
5. 處方內容 :

   活血通氣膏- 桂枝, 南星 18.752g, 附子, 羌活, 川烏, 細辛 7.51875g
   麻黃 5.625g, 烏藥, 草藥 3.75g
6. 加減活用 : 右藥麻布囊爲入藥碓鷄肉內 藥囊置 雄鷄一首去內腸頭皮足入藥水 六七碗爛煎微溫冷服取汗無不神効
7. 秘藏된 來歷 : 祖父 世世. 家庭藥藏으로 傳受

[審査內容]

1. 傷病名 : 中風後遺症(末梢神經麻痺症)
2. 診 斷 : 腦卒中 發作后의 半身不遂를 同伴하는 末梢神經麻痺
3. 症 狀 : 半身不遂, 手足麻痺 및 鈍麻顔面神經麻痺, 言語蹇澁 등등
4. 治療法 : 活血通氣膏

   桂枝, 南星 18.752gm, 附子, 羌活, 川烏, 細辛 各 7.52gm, 麻黃, 烏藥 5.63gm, 草藥 3.75gm
5. 應 用 : 中風後遺症으로 일어난 麻痺不遂症에는 모두 應用 可함
6. 用 法 : 以上의 藥을 麻布囊에 넣어 鷄肉內(腹腔內)에 넣는다. 雄鷄 1마리를 內腸과 頭皮와 足을 除去하고 藥을 넣어 6~7碗정도의 물을 넣고 爛煎하여 微溫 또는 冷服하고 取汗한다.
7. 藥 理 : 9種의 藥性이 모두 溫熱하여 溫經通脉, 治風, 散血, 除痰濕,

發汗, 解肌通九竅, 順氣, 治中風하는 藥들로 構成되어 末梢血管의 擴張과 血液循環에 效果가 있다.

8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒 및 脂肪質을 禁하며 裏熱과 血壓이 높을 때는 服用치 않는 것이 좋겠음

[評價 및 意見]

1. 모두 熱性藥 또는 劇藥이 包含되어 있어 血壓이 上昇될 우려도 있고 血壓이 높은 境遇에는 삼가는 것이 좋을 듯 하며 裡熱이 있어도 禁하여야 할 것임.
2. 그러나 通經, 通脉하고 勝溫하여 九竅를 能히 通한다는 藥性으로 보아 末梢 血管의 擴張과 血液循環에 效果가 있으리라 思料된다.

36. 高血壓 頭痛 治療法

△提出者 : 慶南 蔚州 朴漢醫院 朴 祥 根

1. 傷 病 名 : 高血壓 頭痛
2. 主要症狀 : 高血壓, 頭痛, 心悸亢進, 上氣
3. 治療實績 : 血壓이 있는 患者는 대개 頭痛症 있는데 特別히 極甚한 者
4. 效能效果 大端히 多効하여 不過 數貼으로 治癒되며 中風의 예방에도 可하며 치료약 中風調理 等으로 可하다 했음.
5. 副作用, 禁忌 : 別無함
6. 處方內容 :

   加減愈風湯 - 枸杞子 5.625g, 乾地黃, 黃芩, 蒼朮 各 4.0g, 白芷, 白芍藥, 桂皮, 知母 各 3.75g, 枳殼, 杜冲, 當歸, 石膏 各 2.625g, 麻黃, 川芎, 甘菊, 薄荷, 黃芪, 防風, 甘草 各 1.875g, 細辛, 地骨皮, 人蔘 1.5g, 秦艽 1.0g, 羌活, 獨活 各 1.5g
7. 服用方法 : 1日 2貼服 老人虛弱者 分服
8. 學術的 根據 : 中風治療약으로, 又는 調理藥으로 周知한 바 特히 高血壓患者의 頭痛에 有效했으므로 記入함. 本方보다 量에 差異가 있음

※ 中風, 卒風 以後에 民間藥으로서 柿澁(뜷은 감즙)과 蘿蔔根汁 服用. 柿澁은 가을 前에 뜷은 감즙을 짜서 保管하는데 옛날에는 藥甫나 投網 만드는 분들이 網에 塗하느라고 準備하지만 只今은 求하기 難함

* 服法 柿汁 1勺과 生蘿蔔根汁 1勺을 合하여 1日 2~3일 空 服 7日間 服用后 7日間 休藥 又 7日 服後 7日 休藥 반복함.
* 繼續 服用해도 無防함
* 柿汁으로 治療한 中風은 再發이 없다고 함

※ 枇杷葉療法

이 療法은 萬病에 有效한다 함. 各 家庭療法으로 권장함. 生枇杷葉에는 靑酸이란 毒藥成分이 含有하다고 함.

*適應症 : 萬病에 有效, 腹膜炎, 小兒麻痺로서 步行不能兒, 腹膜炎, 肺結核, 小兒夜尿症, 카리에쓰, 瘰癧, 流走痰腫, 膿瘍파괴, 其他 各病速效

*用法 : 枇杷靑葉中厚葉을 갈어(古藥) 布片으로 닦는다.(水洗치 말것) 光澤이 있는 部分을 火爐에 조금 구어서(炙) 2매를 합처서 10回 정도부빈다. 이것을 1枚式 兩手로 가저 患處에 대여 조금 눌러서 문지른다.

① 10回 程度 문지른 后에 他處에 옮겨 10回 程度 문지른다.

② 腹部면 6, 7分 程度 腹部 全體를 문지른다.

③ 腹部, 背部 等 全體를 차례로 하되 腹部에만 六葉쯤 使用됨

④ 使用時마다 葉을 合하여 조금 炙하여 문지른다.

⑤ 藥中에 있는 靑酸成分이 조금 임으로서 外部로 出한다고 실으며 靑酸이란 毒으로 皮膚로 浸하여 病處에 效果를 發生한다고 한다. 癌患者에게도 有效함

[審査內容]

1. 傷病名 : 高血壓性 頭痛
2. 診　斷 : 高血壓患者가 頭痛을 呼訴하는 때
3. 症　狀 : 高血壓, 日常頭痛, 心悸亢進, 上氣
4. 治療法 : 加減愈風湯

   枸杞子 5.625gm, 乾地黃, 黃芩, 蒼朮 各 4.0gm, 白芷, 白芍藥, 桂皮, 知母 各 3.75gm, 枳殼, 杜冲, 當歸, 石膏 各 2.625gm, 麻黃, 川芎, 甘菊, 薄荷, 防己, 甘草 各 1.875gm, 細辛, 地骨皮, 人蔘 各 1.5gm, 秦艽 1.0gm, 羌活, 獨活 各 1.5gm
5. 應　用 : 一般的인 高血壓者의 中風豫防劑로 長期服用에도 可함
6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 2貼 服用. 老人, 虛弱者는 分服한다.
7. 藥　理 : 療肝腎虛, 筋骨弱, 言語難, 精神昏□, 或 瘦而偏枯, 或 肥而不

遂, 或 恐而健忘, 或 □而多事, 能安心 養神

8. 禁忌, 副作用 : 鷄, 猪, 酒 및 脂肪質飮食을 禁하며 服藥上 副作用은 別로 없음

[評價 및 意見]

1. 本 治療法은 『方藥合編』에도 收錄된 것으로 『萬病回春』에 中風, 中藏, 中府에 먼저 이 藥으로 治療 또는 調理한다고 하였다.
2. 淸熱, 順氣, 鎭靜의 作用이 있는 것으로 보아 一般的으로 熱性頭痛에 使用할 만하나 方中에 麻黃, 人蔘 등이 不適者에게는 副作用도 있을 것으로 思料된다.

※ 中風, 卒中 療法(民間藥)

1. 傷病名 : 中風, 卒中 後遺症
2. 診 斷 : 卒中后의 諸痲痺 및 後遺症
3. 症 狀 : 半身不遂, 言語蹇澁 및 末梢神經鈍痲 등 症
4. 治療法 : 柿汁 1.2dℓ, 生蘿蔔汁 1.3dℓ
5. 應 用 : 계속적으로 服用하여도 無防
6. 用 法 : 1日 2回나 3回를 空服에 服用하되 7日間 服用하고 7日間 服用后 休藥, 계속 반복한다.
7. 藥 理 : 柿는 淸上焦의 心肺熱하며 消痰하며 蘿蔔根은 散痰消食하고 寬中化痰하는 藥物로 朱丹溪는 氣升則 食自降이라 하였다.
   그리고 감의 뜁음으로 오는 消化에 障碍가 蘿蔔根에 依해 상쇄된다.
8. 禁忌 및 副作用 : 별로 없음

[評價 및 意見]

흔히 民間藥으로 使用하는 境遇를 보는데 아직은 特效를 본 例를 別로 보지는 못하였으나 또한 惡化된 例도 별로 없었으므로 한 번 家庭療法으로 試用해 보는 것도 좋을 듯 하다.

※ 小兒痲痺

1. 傷病名 : 小兒痲痺
2. 診　斷 : 弛緩性 運動痲痺
3. 病　狀 : 主로 1側足筋의 弛緩性 痲痺로 점차 筋萎縮이 온다.
   初期 2年間은 점차 回復이 오나 그 后에는 後遺症으로 남는다.
4. 治療法 : 枇杷靑葉(厚葉)
5. 應　用 : 腹膜炎, 小兒痲痺로서 步行不能兒, 肺結核, 小兒夜尿症, 카리에쓰, 結核性 淋巴腺種, 流走痰腫, 膿瘍破腫, 其他 各種 疾患에도 應用
6. 用　法 :
   ① 生枇杷葉을 綿布로 닦고(水洗를 禁) 光澤이 있는 部分을 불에 조금 炙하여 2枚를 合쳐서 10회 정도 부빈다.
   ② 이 것을 1枚式 患處에 대어 조금 눌러서 문지른다.
   ③ 10회 程度 문지른 后에 他處에 옮겨 10회 程度 문지른다.
   ④ 腹部면 6, 7分 程度 腹部 全體를 문지른다.
   ⑤ 腹部, 背部 等 全體를 차례로 하되 腹部에만 六葉쯤 使用됨
   ⑥ 使用時마다 葉을 合하여 조금 炙하여 문지른다.
7. 藥　理 : 枇杷葉成分中에는 靑酸이 함유되어있어 이 靑酸이 皮膚로 호흡되어 效果가 있지 않나 한다. 藥性은 下氣, 淸熱하는 효과가 있다.
8. 禁忌 및 副作用 : 없음

[評價 및 意見]

別 副作用이 없을 것으로 보아 民間藥療法으로 試用하여 보는 것이 좋을 것 같음

37. 淋巴腺結核 治療法

△提出者 : 慶南 晋州 省濟漢醫院

1. 傷 病 名 : 淋巴腺結核
2. 主要症狀 : 잠재성으로 1개~수개의 無痛硬固한 腫脹이 發生, 表面凹凸, 不平의 腫團塊는 形成發炅貧血, 衰弱 等 其他 等等
3. 治療實績 :

效 果 / 區 分	効 果			
	完 治	顯著한 效果	症勢好轉	未 詳
診療患者 總 5 名		3 名 (70%)	2 名 (80%)	
完治 또는 症勢好轉까지 소요된 평균 치료 기간		20 日	20 日	

4. 效能效果 : 主로 滿 15歲 未滿, 喉頭, 結核, 表上面, 腫脹團腫이 治癒됨
5. 副作用, 禁忌 : 主로 處方內容이 藥性無毒, 但 服用量, 年令, 等分에 參酌要함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 新採消瘰丸, 玄蔘蒸 150g, 牡蠣煅醋碎 150g, 貝母去心蒸 150g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : (通院修治 要하다) 10歲 미만 減半量
8. 服用方法 : 以上 3種 藥劑 粉末練蜜丸하여 每回 11.25g, 冷水 日 1回 服用可함
9. 學術的 根據 : 임상적 理論提示로 主된 原發巢로부터 2次的으로 轉移性 發生에 依하여 好發部位에 發生함으로 組織學的, 細菌學的 病理檢査 依賴에 重要性을 根據함
10. 秘藏된 來歷 : 秘藏된 醫書籍名은 『增輯陳修園醫書』 70種. 傳受받은 經緯는 家傳秘藏. 年歷은 未祥, 廣益書局 石印

[審査內容]

1. 傷病名 : 淋巴腺結核
2. 診　斷 : 2~3個 ~ 數個의 硬固無痛한 腫留物이 触知되며 全身衰弱과 貧血등이 招來되며 X-ray 診斷으로 肺結核을 認定하면 診斷에 도움을 준다.
3. 症　狀 : 主로 頸部 淋巴腺에 여러 개의 淋巴腫이 發見되며 全身衰弱을 同伴한다.
4. 治療法 : 新採消瘰丸 - 玄蔘蒸, 牡蠣煅醋碎, 貝母去心蒸 各 150g
5. 應　用 : 各種 淋巴腺腫에 應用可함
6. 用　法 : 以上 3種藥物을 粉末 混合, 練蜜丸으로 하여 每回 11.25g을 冷水로 1日 1回式 服用한다. 10歲 未滿者는 減半量한다.
7. 藥　理 : 玄蔘은 結核, 癰疽, 癤瘻등을 治療하며 牡蠣分도 역시 消瘰癤結核하고 貝母도 散肺鬱로 肺痿, 肺癰, 瘻瘤, 惡瘡을 療하는 藥으로 3種이 모두 消瘰作用이 있을 것으로 추리됨
8. 禁忌 및 副作用 : 藥性이 無毒하므로 별로 禁忌와 副作用이 없음

[評價 및 意見]

1. (『增輯陳修園醫書』 70種에 收載) 本 處方은 藥理的 面에서 有效한 藥物이라 보며 모든 腫留物에 應用되는 것으로 淋巴腺腫에도 效果가 있다고 보겠음

2. 藥材가 매우 單純하므로 速效를 기대 하기는 곤란할 것 같으며, 長期投與를 하여야 할 것과 結核菌의 殺菌抵抗에는 抗結核藥의 併用이 바람직하지 않나 思料됨

38. 再生不能貧血, 血友病, 惡性貧血, 血癌, 紫斑病, 諸般出血性病

△提出者 : 慶北 大邱 성제국한의원 李 尙 明

1. 傷 病 名 : 再生不能貧血, 血友病, 惡性貧血, 血癌, 紫斑病, 諸般出血性病
2. 主要症狀 : 貧血 및 出血性(內)本質
3. 治療實績 : 極惡性時는 醫學的인 견해보다는 連命, 輕症時는 良好
4. 效能效果 : 追試의 가치와 有. 大體로 良好한 反應
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

① (酒洗)當歸(身) 2錢, 去油 川芎(土) 1錢, (酒炒) 芍藥 2錢 (大) 熟芐(上) 2錢, 人蔘 2錢, 鹿茸(上) 3錢 以上, 白茯(上) 1錢, 白朮(土炒) 2錢, 陳皮(右) 1錢, (大)砂仁 1錢, 丁香 1錢半 以上, 甘草 1錢, 桂皮(去皮) 1錢, 別甲(酒炒) 2錢, (蜜炙)黃芪(上) 2錢半, 柴胡(土) 2錢, 肉從容(材) 2錢(女子則換 牧丹皮)

② 薑棗 三五

6. 學術的 根據 : 日本國 學術發表 및 追試(本人) 結果 認定
7. 學術會들 發表與否 : 大韓漢醫學會誌 13卷 1号

※ 處方 ①은 煎湯藥으로 1日 食間服(3回)

○ 患者가 有熱時는 加 柴胡(土) 5錢~10錢, 檳榔 1~2錢, 脾腫이 甚한즉 加 赤芍藥(酒炒) 5錢~10錢

處方 ②는 處方 ①의 湯藥을 牛黃(土) 硏末 2~3分式 服用한다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 再生不能性 貧血, 血友病, 惡性貧血, 白血病(血癌), 紫斑病, 諸般出血性 疾患
2. 診 斷 : 惡性貧血의 診斷上 重要한 点은 ;

① 40~60才에 많고 男子가 若干 많다.

② 皮膚蒼白하며 亞黃疸色을 呈한다.

③ 舌炎(腫脹, 疼痛后에 舌粘膜萎縮이 온다.)

④ 網膜出血

⑤ 胃液欠乏症

⑥ 神經症狀

⑦ 脾腫

⑧ 尿우로비리노겐의 强陽性

⑨ 高色素性 大赤血球등과 血淸色調의 濃厚, 비루빈 增加, 白血球 減少, 血小板減少 등등

⑩ 반드시 臨床檢査에 依한다.

3. 症　狀 : 各種 貧血症狀과 出血性 疾患

4. 治療法 : 當歸身酒洗, 土川芎去油 各 3.75gm, 芎藥酒炒, 熟地黃, 人蔘 各 7.5gm, 鹿茸(上) 11.25gm, 白茯 3.75gm, 白朮土炒 7.5gm, 陳皮 3.75gm, 砂仁 3.75gm, 丁香 5.625gm, 甘草, 桂皮 各 3.75gm, 別甲酒炒 7.5gm, 黃芪蜜炙 9.375gm, 柴胡 7.5gm, 肉從容 7.5gm(女子는 牧丹皮)

5. 應　用 : 熱이 있으면 柴胡 18.75~3.75gm, 檳榔 3.75~7.5gm을 加
或은 本 處方에 牛黃(土) 硏末 0.75~11.25gm을 加

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 食間服한다.

7. 藥　理 : 十全大補湯에 丁香, 別甲, 柴胡, 肉從容을 加한 處方으로 貧血에 效果가 있는 藥이다. 더욱이 鹿茸의 量이 가장 많아 더욱 有效

8. 禁忌 및 副作用 : 없음

[評價 및 意見]

1. 十全大補湯과 貧血治療에 有效한 것은 古典 및 最近 實驗에서(前 慶熙大 李貞載) 알려져 있으며 本 處方은 十全大補湯類에 鹿茸, 肉從容등의 補藥이 加味되어 그 藥效를 더욱 發揮하도록 構成되었으므로 各種 血液疾患에 有效한 것으로 보며 惡性貧血에 效果에 對해서는 追試가 必要하리라고 思料됨

39. 腦充血兼 偏枯 治療法

△提出者 : 慶北 大邱 제한동의학술원 변 정 환

1. 傷 病 名 : 腦充血兼 偏枯
2. 主要症狀 : 頭痛, 眩暈, 忽然昏倒, 左手足能動, 言語蹇澁, 半身皆痲木
3. 治療實績 : 治療範圍가 廣範하며 빠르고 우수하다. 本 疾患에 많은 治療效果가 기대된다.
4. 效能效果 : 將藥又連服三十餘劑 手足之擧動 皆較前便利 言語之蹇澁亦大見愈 可勉强出門作矣
5. 副作用, 禁忌 : 정신적 안정을 요하며 신열성 식물을 금하고 취한을 요함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 生懷山藥 37.5g, 生懷地黃 37.5g, 生赭石 80g, 軋細懷 牛膝 80g, 生杭芍 22.5g, 柏子仁 15g, 炒搗 白朮 11.25g, 滴乳香 11.25g, 明沒藥 11.25g, 土鱉虫四大個搗, 生鷄內金 5.625g, 黃色搗茵蔯 3.75g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 日用生藥(懷) 細末煮作茶湯, 調以白糖, 分適口送服 黃色生鷄內金 細末3分許
8. 服用方法 : 1日 3回 食間服, 水煎湯, 一大鍾溫服 微溫服
9. 學術的 根據 : 『醫學衷中參西錄』 選評 第2卷 p 203 (河北監山 張錫純原著) (廣東 梅縣 張公讓 選評)

[審査內容]

1. 傷病名 : 腦充血(腦壓上昇) 및 半身不遂
2. 診 斷 : 腦壓上昇으로 充血이 되면 嘔吐, 乳頭腫 및 頭의 症狀이 同伴하는데 이 경우는 血壓이 上昇되었음을 意味하며 이로 因하여 半身 또는 어느 器官에 鈍痲 偏枯 不遂現象이 일어날 수 있다.
3. 症 狀 : 頭痛, 眩暈, 忽然昏倒, 左手足運動不能, 言語蹇澁, 半身痲木

(麻痺)

4. 治療法 : 生山藥, 生地黃 各 3.75gm, 生赭石, 牛膝 各 80.0gm, 生芍藥 22.5gm, 柏子仁 15.0gm, 白朮炒搗 11.25gm, 土鱉虫搗 4個, 鷄內金 5.625gm, 茵蔯 3.75gm
5. 應 用 : 中風後遺症에 應用可함
6. 用 法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 藥液을 一大鍾으로 하여 1日 3回 食間服으로 溫服 또는 微溫服한다. 生山藥은 細末을 煮作茶湯하여 白糖을 加調, 조금씩 먹는다. 또한 黃色鷄內金 細末 1.2gm을 복용한다.
7. 藥 理 : 處方의 內容藥物이 大部分 若寒性이므로 降高血壓하며 牛膝은 下氣, 芍藥, 茵蔯은 收斂, 山藥과 柏子仁은 淸熱 養心, 鷄內金은 助消化, 除熱止煩하여 治療效果를 높힐 것으로 추리됨
8. 禁忌 및 副作用 : 辛熱性食物을 禁하며 精神的 安靜과 服藥時에 取汗을 要함

[評價 및 意見]

1. 張錫純著 『醫學衷中參四錄』 選評 第2卷 p 203에 收載. 大部分의 若寒藥들은 血壓을 下降시키고 淸熱 養心 등 循環, 消化의 疥癬으로 代謝를 원활히 하여 治療시킴을 目的으로 處方이 構成되었으나 長期投與를 要할 것이며 治療效率測定에는 경험이 必要할 것으로 思料됨

40. 惡性 出血熱 治療法

△提出者 : 江原 春川 濟衆漢醫院 瀋 昌 均

1. 傷 病 名 : 惡性 出血熱
2. 主要症狀 : 口鼻目大小便出血, 口唇破裂出血, 毛細血管破裂, 出血全身 紫褐色脉浮數
3. 治療實績 : 7名을 治療하였음
4. 效能效果 : 80% 效果
5. 副作用, 禁忌 : 虛弱無熱體質, 出血症에는 不用. 鷄猪酒麵
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   犀角地黃湯 - 生地黃 3錢, 犀角, 升麻, 側柏葉, 白茅根, 赤芍藥 各 2錢, 當歸, 川芎, 白芍藥, 熟地黃 各 1.5錢, 梔子, 黃連, 連交, 牧丹, 葛根, 麥門冬, 薄荷, 柴胡, 甘草 各 1錢
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 犀角地黃湯 本方案 生苄 3錢, 赤芍 2錢, 犀角, 牧丹 各 1錢인데 上方을 止血劑로 側柏, 白茅根, 淸血補血劑로 四物, 瀉血劑로 梔子, 黃連, 柴胡, 牧丹, 薄荷, 葛根, 治療劑로 連交를 加하였음
8. 服用方法 : 1日 3回
9. 學術的 根據 : 元方 『方藥合編』 下 60頁

[審査內容]

1. 傷病名 : 惡性 出血熱
2. 診 斷 : 高熱과 함께 出血狀態로 診斷되며 脉은 浮數하다.
3. 症 狀 : 發熱과 함께 口鼻眼, 大小便出血, 唇裂出血, 毛細管破裂出血, 全身紫褐色 出血斑
4. 治療法 : 加味犀角地黃湯

生地黃 11.25gm, 犀角, 升麻, 側柏葉, 白茅根 7.5gm, 當歸, 川芎, 白芍藥,

熟地黃 各 5.625gm, 梔子, 黃連, 牧丹, 葛根, 麥門冬, 薄荷, 柴胡, 甘草 各 3.75gm

5. 應　用 : 별로 없음

6. 用　法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日 2貼 合再湯 3回服

7. 藥　理 : 犀角地黃湯은 吐血, 衄血, 嗽血, 更血, 畜血如狂과 陽毒發斑에 有效하며 여기에 다시 止血, 淸血, 凉血하는 藥物들을 加味하여 그 效用을 補强한 것이다.

8. 禁忌 및 副作用 : 藥性이 寒하므로 陰症에는 不適하며 또 虛弱者 및 無熱者와 出血症에도 忌用함. 鷄猪酒麵을 禁한다.

[評價 및 意見]

1. 本來 犀角地黃湯은 傷寒胃火熱盛, 吐血, 衄血, 嗽血, 更血, 畜血如狂한데 使用되는 것으로 여기에 追加하여 作用을 補强하였으므로 出血熱에 可用할 만 하다고 보여짐

2. 本方은 『方藥合編』 下 60에 收載되고 臨床上 좋은 藥이라 思料되며 追試硏究해 볼 必要가 있겠음

41. 流行性 耳下腺炎, 各種筋炎, 腫處乳, 腫手指, 腫痛, 打撲瘀血 治療法

△提出者 : 京畿 平澤 全漢醫院 金 鳳 和

1. 傷病名 : 流行性 耳下腺炎, 各種筋炎, 腫處乳, 腫手指, 腫痛, 打撲瘀血
2. 主要症狀 : 發病局所, 發赤腫脹, 腫痛
3. 治療實績 :

效果 / 區分	完 治	현저한 효과	증세 호전	미 상
진료환자 15名	10名 62%	3名 20%		2名 10%
소요된 日字	7日	3日	2日	

4. 效能效果 : 대부분 3日間이면 差度가 있고 當處에 熱이 심할 時는 當日로 效果를 봄
5. 副作用, 禁忌 : 약을 當處에 貼付할 때 비닐이나 油脂를 使用해서는 아니되고 붕대를 利用함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 大黃末
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 腫處大小에 依하여 充分하게 藥末을 使用할 것
8. 服用方法 : 大黃末을 술에 개서 당처에 부치되 마르면 다시 술에 개서 붙임. 3日간 반복
9. 學術的 根據 : 『本草綱目』 大黃門에서 杖瘡腫病 및 各條參照
10. 學術會등 發表與否 : 어느 때 年度未詳, 中央會서 秘方 모집할 때 記呈하였음
11. 其他事項 : 寡居에도 中央會 經驗方收集時에도 記述한 바 있으나 或是 使用치 않고서 展示的 경향이 있을 念慮가 되오니 試用하시기를. 使

用하며 절대 化膿되지 않음

[審査內容]

1. 傷病名 : 流行性 耳下腺炎, 各種筋炎, 腫處乳, 腫手指, 腫痛, 打撲瘀血
2. 診斷 : 局所的으로 發生하는 線, 筋, 肉의 化膿性 腫炎
3. 症狀 : 發赤腫脹, 腫痛
4. 治療法 : 大黃末
5. 應用 : 모든 發赤, 腫脹에 應用
6. 用法 : 大黃末을 술에 개어 當處에 부치되 마르면 다시 술에 개서 붙임. 3日間 반복한다.
7. 藥理 : 大黃은 一切實熱, 血中伏火, 行水除痰, 蝕膿消腫, 能推陳致新하는 藥이다.
8. 禁忌 및 副作用 : 비닐과 油脂를 使用치 말고 붕대로 貼付함이 좋음

[評價 및 意見]

1. 大黃의 性質이 寒하며 能히 實熱을 瀉할 수 있고 消腫하는 效能이 있어 現在도 臨床醫들이 많이 應用하고 있는 方法이기도 하다.
2. 혹 감자나 쌀제 등도 使用하는데 이런 方法보다는 效果的이라 思料된다.

42. 諸出血證 治療法

△提出者 : 忠南 禮山 壽星漢醫院 李 東 翼

1. 傷病名 : 諸出血證
2. 主要症狀 : 吐血, 衄血, 下血(子宮出血)
3. 副作用, 禁忌 : 豚肉, 鷄肉, 酒 禁함
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 生地黃, 熟地黃 各 3錢, 麥門冬, 白芍藥, 當歸 各 3錢, 茜草根, 荊芥炒 各 1錢, 茅根 2錢
5. 加減活用(修治法 또는 技法) : 大腸出血엔 加地楡

[審査內容]

1. 傷病名 : 諸出血證
2. 診斷 : 단순히 止血을 要하는 出血
3. 症狀 : 吐血, 衄血, 下血(子宮出血)
4. 治療法 : 生地黃, 熟地黃, 麥門冬 各 11.25gm, 白芍藥, 當歸 各 11.25gm, 茜草根, 荊芥炒 各 3.75gm, 茅根 7.5gm
5. 應用 : 大腸出血에 加地楡
6. 用法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 食間服 1日 3會
7. 藥理 : 止血劑로써의 生地, 熟地, 麥門冬, 白芍藥, 茜草根, 荊芥炒, 茅根 등 모두 좋은 效果를 가지고 있어 止血약의 集合體라 할 수 있다.
8. 禁忌 및 副作用 : 豚肉, 鷄肉, 酒를 禁한다.

[評價 및 意見]

處方을 構成하고 있는 藥物들이 모두 止血劑로 止血의 可能性이 있다. 그러나 病症의 種類에 따라 效果의 差異가 있을 것이니 이 處方은 한마디로 大衆療法의 止血處方이라고 할 수 있겠다.

43. 淋巴腺腫 治療法

△提出者 : 釜山 南區 廣齊局漢醫院 金 文 星

1. 傷病名 : 腫瘍, 淋巴腺腫, 神經痛, 結膜炎, 髮際疽, 打撲傷, 瘀血
2. 主要症狀 : 癭瘤, 諸症
3. 治療實績 : 거의 100%
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 寶豆 7.5g, 棉實油 0.4ℓ. 上記 2鍾을 냄비에 붓고 달여서 寶豆가 타서 煙氣가 나고 黑色으로 될 때 불에서 냄비를 들어내어 寶豆는 건져내고 黃臘 혹은 洋燭 75g을 넣어서 冷却爲軟膏
5. 加減活用 : 破腫된데는 日 1회 가제에 薄塗 付着시키고 破腫안된데는 皮膚上에 摩擦塗之하고 가제를 첨부. 結膜炎에는 閉目하고 瞼上 塗擦함
6. 學術的 根據 : 寶豆 溫毒治喉痺 蛔痛, 虫傷, 兼疫痢, 壯實者 2分, 老弱者 1分 或 1里나 其毒性을 利用하고 또 古者 鼠蹊 淋巴腫에 寶豆를 醋에 磨末塗之하여 擧効한 事를 經驗하여 發明한 것으로 10餘年 前 釜山漢醫師會報에 發表한 바 있음
7. 其他事項 : 눈에 넣어도 痛症이 없고 眼瞼에 발라서 一夜宿으로 핏발이 삭으며 성한 살은 조금도 害하지 않는다. 外科藥이므로 四象의 本質 區別없이 萬人에게 通用됨

[審査內容]

1. 傷病名 : 腫瘍, 淋巴腺腫, 神經痛, 結膜炎, 髮際疽, 打撲傷, 瘀血
2. 診斷 : 局所性의 各種 腫瘍, 瘀血 및 神經痛
3. 症狀 : 癭瘤, 腫瘤諸症
4. 治療法 : 寶豆 7.5gm, 棉實油 0.4ℓ
5. 應用 : 各種 腫痛處에 貼付 應用이 可하다.

6. 用法 : 2종 藥物을 냄비에 붓고 달여서 寶豆가 타서 煙氣가 나고 黑色으로 될때 寶豆는 건져내고 黃臘 또는 洋燭 75g을 넣어서 冷却시켜 軟膏를 만들어 破腫된 곳에는 1日 1회 가제에 薄塗付着시키고 破腫안된 곳에는 皮膚상에 摩擦塗之하고 가제를 붙인다. 結膜炎에는 閉眼하고 瞼外側皮膚上에 塗擦함
7. 藥理 : 寶豆는 溫毒, 喉痺, 蛔痛, 虫傷□痢를 治한다.
8. 禁忌 및 副作用 : 별로 없음

[評價 및 意見]

寶豆는 苦寒한 藥으로 여러 病에 極히 奇效가 있는 藥物이다. 特히 止痛作用이 强하며 諸傷과 中毒疾患에 效果가 있는 藥으로 널리 쓰이고 있는 藥으로 外科的 貼付藥으로 應用할 만 하다.

44. 脾臟炎(脾心痛) 및 腰痛 治療法

△ 提出者 : 서울 中區 聖信漢醫院 李 聖 宿

가. 脾臟炎 治法

1. 傷病名: 脾臟炎(漢方名 脾心痛)
2. 主要症狀 : 心下部가 칼이나 鍼 등으로 찌르는 것 같이 통증
3. 治療實績 : 屢試屢驗
4. 副作用, 禁忌 : 別로 없다. 禁忌 - 酒類, 鷄猪, 기름기 있는 것
5. 處方內容 :

訶子散(治心脾冷痛不可忍 1服見効) 訶子炮, 厚朴, 乾干炮, 草果, 陳皮, 良薑炒, 茯苓, 神麴炒, 麥芽炒, 甘草 各等 4.0g, 入塩少許, 煎服

6. 服用方法 : 水煎服하되 1日 3回 限 5~6貼이면 有效함
7. 學術的 根據 : 『萬病醫藥顧問』이나 『東醫寶鑑』에 第1方으로 記載되었기에 實驗하였던 바 意外에 잘 들었다.
8. 秘藏된 來歷 : 大邱로 避難(6.25當時) 갔었을 때 그곳 李某라고 하는 名醫에게 들은 바 있었고 그 后에 諸醫書에서 얻어 보게 되어 屢試屢驗한 결과 秘藏되었다.

나. 腰痛 治療法

1. 傷病名 : 腰痛
2. 鍼灸療法 : 大腸前 部位의 筋骨이 끊어지는 것 같이 아픈 腰痛은 大腸經의 變動으로 오는 腰痛이다. 이런 경우에는 舍岩道人의 五行鍼中 大腸正格을 쓰면 잘 낫는 것을 體驗하였다.
3. 應用 : 三里, 曲池를 補하고 陽鷄, 陽谷을 瀉한다.
4. 補瀉法 : 筆者는 南豊李氏의 迎隨補瀉法을 쓴다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 脾心痛(膵臟炎)
2. 診斷 : 대개 膽石症 또는 膽囊炎에서 續發되거나 또는 蛔蟲 혹은 他臟器炎症의 2次的 感染으로 일어나며 膵臟部의 疼痛, 膨隆 등을 認知할 수 있고 血液 및 尿의 理化學的 檢査로서 確診된다.
3. 症狀 : 上腰部에 突然 激痛, 左腹肋間 또는 左肩에까지 波及되며 消化障碍, 特히 嘔吐가 심하고 便秘, 腹部膨隆, 發熱 등이 일어난다.
4. 治療法 : 訶子散

   訶子炮, 厚朴, 乾干炮, 草果, 陳皮, 良薑炒, 茯苓, 神麴炒, 麥芽炒, 甘草 各 4.0gm, 入塩少許
5. 應用 : 急發性 腹痛, 腸疝痛, 心脾冷痛에 應用이 可함
6. 用法 : 合爲 1貼, 水煎去渣, 1日 3回 食間服 5~6貼이면 有效함
7. 藥理 : 溫中, 緩和, 鎭痛, 鎭靜, 消導의 作用이 있는 것으로 추리됨
8. 禁忌 및 副作用 : 鷄, 猪, 酒 및 脂肪質의 取食을 禁하며 服藥上 副作用은 別로 없음

[評價 및 意見]

1. 東醫寶鑑과 萬病醫藥顧問에 治心脾冷痛 1服見効라는 記錄이 있고 또한 藥性이 溫中, 鎭靜劑들 이므로 膵臟炎에 應用이 可能할 것으로 보며, 非但 膵臟炎뿐 아니라 심한 腹痛에는 1且 試用해 볼 만한 治方이라고 思料됨
2. 但 急發性 壞死 및 發炎性 疾患에는 消炎제의 加味가 必要할 것임

45. 惡性 癰腫 外治法

△ 提出者 : 전남 완도군 광주한의원 劉 光 男

1. 惡性 腫瘡, 癰疽, 關節炎에 對하여 草烏 8刃, 南星, 半夏, 狼毒, 大黃, 何首烏, 寶豆, 川椒, 霹歷花 2刃 右藥을 粉末하여 麥飯爲泥하여 煙葉 또는 피마자 葉에 싸서 瘡口 또는 患部에 添塗함. 各化膿性 또는 骨髓炎에도 良好함
2. 精神病, 動脈硬化症 服用法

   石膏 2錢, 人蔘 2錢, 麥門冬 3錢, 半夏 1錢 5分, 黃連 1錢, 梔子 1錢, 酸棗仁 1錢, 甘草 1錢, 生薑5.

   右藥은 每食後에 服用. 午前 8時 1服, 午後 1時 1服, 午後 5時 2貼合再煎服

[審査內容]

1. 傷病名 : 惡性 癰腫
2. 診斷 : 筋關節 및 皮下軟部 組織에 發生하는 限局性 化膿腫
3. 症狀 : 發赤腫起 發熱로 시작하여 腫脹硬結 化膿 中央部에 黃白色의 膿栓을 形成하고 심하면 高熱, 激痛을 일으키며 化膿后에는 自潰排膿된다.
4. 治療法 : 草烏 300.0g, 南星, 半夏, 狼毒, 何首烏, 寶豆, 川椒, 霹靂花 各 75.0g
5. 應用 : 各 化膿性 癰腫, 關節炎 또는 骨髓炎에도 良好함
6. 用法 : 合爲 粉末 混合하여 麥飯으로 作泥한 후 煙草葉 또는 蓖麻子葉에 包하여 患處瘡口 또는 患部에 貼付함
7. 藥理 : 消炎, 鎭痛, 排膿의 作用이 있는 것으로 추측됨
8. 禁忌 및 副作用 : 별로 없음

[評價 및 意見]

1. 매우 毒劇性 藥物이므로 殺菌, 消炎의 効를 가져올 수 있을 것이나 患處皮膚의 刺戟症狀이 일어나지 않을는지 의심됨

2. 動物實驗 등에 試用하여 効果의 確認을 해 보아야 할 것임

<소 아 과>

1. 幼少兒 泄瀉 (慢性 大腸炎) 治療法

△ 提出者 : 서울 東大門 普仁漢醫院 李 鍾 聲

1. 傷病名 : 幼少兒 泄瀉 (慢性 大腸炎)
2. 主要症狀 : 泄瀉 1日 3~4次 滑泄不止, 長期間으로 身體虛弱瘦瘠
3. 治療實績 : 幼兒, 小兒, 或은 成人의 慢性 泄瀉에 投與하여 確認된 者 중 70% 良好하며 特히 幼少兒에서 多効함
4. 效能效果 : 止瀉, 健腸, 補益劑
5. 副作用, 禁忌 : 별로 發見치 못하였음
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加減啓脾湯
   山査子, 白朮, 人蔘 各 20gm, 連子肉 3gm, 山藥 6gm, 澤瀉, 陳皮 4gm, 訶子肉 3gm, 甘草炙 2gm, 生薑 1gm, 大棗 1gm
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 腹痛 加 白芍藥
8. 服用方法 : 上記 用量을 1貼으로 하여 煎湯液 150cc로 하고, 大人은 1回服 1日 3回, 10歲 以下는 2回 分服, 1歲 未滿은 4~5回 分服(1日)
9. 學術的 根據 : 『萬病回春』 泄瀉門의 啓脾湯 處方을 加減한 것으로 山査子는 肉을 除去하고 核만을 使用하는 것이 特異함 (止瀉作用)
10. 學術會 등 發表與否 : 없으나 臨床醫들의 모임에서 發表하여 諸醫가 使用해 본 결과, 有效함을 인정하였음
11. 秘藏된 來歷 : 小兒泄瀉에 啓脾湯 木方中, 山査子(核)를 增量 使用하면 多効하다는 意見에 따라 試用하여 본 結果, 果然 憂愁함을 發見. 10餘年來 使用해 오고 있음

[審査內容]

1. 傷病名 : 小兒 泄瀉(慢性 大腸炎)

2. 診斷 : 急性期의 後, 또는 慢性 大腸炎으로 오래 泄瀉를 하는 境遇를 말한다.
3. 症狀 : 非細菌性 痢疾로서 後重氣가 없고 吸收가 잘 되지 않은 便을 하루에 數次하여 脫水症이 왔을 때가 많다. 元氣도 매우 떨어짐.
4. 治療 : 水煎服用하는데 1일 數回에 分服시킴이 좋다.
5. 應用 : 冷性 腹痛이나 虛弱체의 消化 不良에 應用된다.
6. 用法 : 年令에 따라서 다르지만 可及的이면 하루 몇 차례씩 分服.
7. 藥理 : 溫脾, 健腸, 消化, 止瀉의 作用이 있다. 本方은 四君子湯을 基礎로 하여 加減한 것으로서 健胃補裨, 利水를 目的으로 하여 消化를 促進시키게 한 것이다. 虛證으로서 貧血性, 食慾不振, 水樣性 下痢가 오래되어도 不治이며 가끔 腹痛이 있고 때로는 嘔吐하는데에 效果.

處方 : 山査子 20gm, 山藥 6gm, 澤瀉 4gm, 白朮, 人蔘, 蓮子肉, 陳皮, 訶子肉 各 3gm, 炙甘草 2.0gm, 生干, 大召 各 1.0gm

8. 禁忌 : 細菌性 痢疾에는 禁忌이다.

[評價]

臨床에서 많이 쓰이는 處方으로서 좋은 加減法이라 할 수 있다.

2. 小兒 疳病 (小兒線體質 改善藥) 治療法

△ 提出者 : 서울 東大門 普仁漢醫院 李 鍾 聲

1. 傷病名 : 小兒 疳病 (小兒線體質 改善藥)
2. 主要症狀 : 虛弱瘦瘠, 淋巴腺易腫
3. 治療實績 : 3~20歲까지의 小兒 및 少年期의 虛弱兒로서, 特히 耳下部線結核(豆大樣)이 있고 食慾은 있으나 瘦瘠하고 때로 原因未詳의 發熱(虛熱)이 있는 者에게 1~2個月 계속 服用시켜서 多効함
4. 效能效果 : 食慾增進, 體重增加, 健壯發育 및 寄生蟲의 驅除에도 有效
5. 副作用, 禁忌 : 或 消化障碍가 있으나 用量의 減少調節로서 除去됨
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 水土丹 ~熟地黃 80gm, 山藥, 山茱萸 各 40gm, 白茯, 牧丹皮, 澤瀉 各 30gm, 胡黃蓮 20gm, 使君子 18gm, 人蔘, 黃連, 神麴炒, 麥芽, 山査肉 15gm, 白朮, 甘草 各 12gm, 蘆薈煅 10gm
   * 製法 : 極細末로 하여 練蜜로서 綠豆大로 作丸함
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 熟地黃은 九蒸九炮의 良質品, 神麴은 炒制, 蘆薈는 煅制로 함. 熟地黃의 粉末法은 他藥과 搗碎乾燥하여 作末
8. 服用方法 : 1回 10丸~50丸까지 年令에 따라 適宜服用하며 1日 3回 每食後 30分에 溫水로 服用
9. 學術的 根據 : 『方藥合編』 中續 167方 肥兒丸條에 小兒疳疾과 諸熱을 治하는 處方으로 記錄되어 있음
10. 秘藏된 來歷 : 故 金永勳 先生으로부터 傳受

[審査內容]

1. 傷病名 : 小兒疳病(線體質兒)
2. 診斷 : 特別한 診斷名이 없이 虛弱하며 瘦瘠하고 結核性 淋巴腺炎이 잘 나거나 原因不明의 熱이 있는 아이

3. 症狀 : 큰 理由 없이 體重의 增加도 없고 標準値 보다 낮으며 食事에 比해서 瘦瘠하는 症狀을 나타내고 耳下에 結核性 淋巴腺炎(大豆大 程度의 것)이 있는 境遇가 많다.
4. 治法 : 水煎順用 시킨다.
5. 應用 : 虛弱兒의 補劑로서 應用될 수 있다.
6. 用法 : 年令에 따라서 增感하되 1日 4~5次 以上으로 分服.
7. 藥理 : 肥兒丸(湯)으로서 淸肝, 健脾, 進食, 消化, 退積하는 作用이 있고 體重의 增加가 올 수 있는 處方이다.
8. 禁忌 : 長期間 服用하면 發育에 若干의 支障이 있는 것으로(動物實驗에서) 되어있으므로 1個月 以上의 服用은 再考하여야 할 것이다.

[評價]

虛弱體의 體質改善에 도움이 될 수 있다. 臨床家들에 많이 利用되고 있는 方文이다.

3. 水痘（小兒科）治療法

△ 提出者 : 서울 鐘路　孝子漢醫院　權　日　相

1. 傷病名 : 水痘(小兒科)
2. 治療實績 : 數十名
3. 效能效果 : 憂愁
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 犀角消毒飮～牛蒡子 4錢, 荊芥, 防風 2錢, 甘草 1錢, 犀角 1錢半
5. 學術的 根據 : 『方藥合編』
6. 秘藏된 來歷 : 本人의 經驗

[審査內容]

1. 傷病名 : 水痘
2. 診斷 : 水痘는 流行性이다. 水痘가 있는 發疹性 疾患으로 熱을 隨伴.
3. 症狀 : 天然痘와 鑑別을 要하는 바이러스性 疾患이다. 熱, 頭痛, 全身倦怠, 食慾不振, 不安 等의 症狀과 顔面, 被髮部位에 大豆大 만큼의 大小不同한 解紅色 丘疹을 發生하게 하고 24時間 以內에 水疱로 된다. 發疹은 3~5일간 계속된다. 때로는 咽喉炎, 眼疾患 등도 合併한다.
4. 治療 : 藥物療法으로 하며 發疹이 없어질 때까지 安靜을 要한다.
5. 應用 : 他의 發病性 疾患에 도움이 될 것으로 안다.
6. 用法 : 1日 數回로 分服시킨다.
7. 藥理 : 解熱, 發表, 淸熱하며 發疹疾患에 散風, 除熱, 消炎 등의 作用.
8. 禁忌 : 別로 없다.

[評價]

『方藥合編』에 있는 처방으로 흔히 쓰이는 方文인데 이 犀角消毒飮의 처방은 모든 발毒으로 因한 瘡疹에 좋은 效果를 갖는다.

4. 風疹（小兒科）治療法

△ 提出者 : 서울 鐘路　孝子漢醫院　權　日　相

1. 傷病名 : 風疹(小兒科)
2. 治療實績 : 數十名
3. 效能效果 : 憂愁
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 藿香正氣散 - 藿香 1錢 5分, 蘇葉, 白芷, 白朮, 厚朴, 茯苓, 陳皮, 半夏 各 1錢, 大腹皮, 桔梗, 炙甘草 各 5分
5. 加減活用(修治法 또는 技法) : 頭痛加川芎, 四肢痛加木瓜, 惡寒加桂枝
6. 學術的 根據 : 『方藥合編』
7. 秘藏된 來歷 : 本人의 經驗

[審査內容]

1. 傷病名 : 風疹
2. 診斷 : 風疹은 發疹期가 3~5日부터 후두부 耳下 頸部 肘內側 또는 액하나 서개부淋巴腺의 腫脹하고 體表의 여러 곳에 發生하며 手足 파급.
3. 症狀 : 痲疹과 유사하나 좀 작고 體表에 많이 發生한다.
4. 治療 : 發熱時에 解熱하여 주며 安靜시켜준다.
5. 應用 : 痲疹, 風疹에 共히 應用될 수 있다.
6. 用法 : 水煎服用, 1日 3~4回
7. 藥理 : 理氣和中, 散寒和, 發邪, 消炎, 解熱 시키는 作用을 본 藿香正氣散에 加減에 準한 方文이다.
8. 禁忌 : 別로 없다.

[評價]

藿香正氣散은 四時不正之氣를 治할 수 있는 通用方文으로 널리 使用하는 바 效果가 크다. 本 疾病은 安靜을 해도 잘 치유된다.

5. 毒蛇咬傷 治療法

△ 提出者 : 慶南 蔚州 보생한의원 金 一 萬

1. 傷病名 : 毒蛇咬傷
2. 主要症狀 : 호흡곤란, 실신상태, 현오, 심장마비, 24時間內 死
3. 治療實績 : 每 여름마다 평균 50~60人 치료
4. 效能效果 : 하기 처방의 10첩 복용이면 재발(蛇毒 증상)이 전혀 없고 그 후 아무런 지장이 없음
5. 副作用, 禁忌 : 石雄黃의 과량에 부작용이 있을 수도 있으나 지금까지 부작용 없었음
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加味敗毒散~柴胡, 前胡, 羌活, 獨活, 枳殼, 桔梗, 川芎, 赤茯苓 各 1錢(4g), 白朮, 元甘 各 6錢(22g), 石雄黃 6分(2g), 貝母 8分(2.2g) 薄荷 少許
7. 加減活用 : 白朮, 元甘은 10錢까지 가능. 石雄黃을 加함에 주의 要
8. 學術的 根據 : 『東醫寶鑑』, 『醫學入門』

   口傳으로 옛날부터 石雄黃은 蛇와 상극으로 피해가며 白朮도 노인(옛날 노인)들이 白朮을 깎아서 주머니에 차고 다니면 뱀이 침범하지 못하는 점에서 石雄黃과 白朮이 主要藥이며 貝母도 蛇毒에 好.
9. 秘藏된 來歷 : 蛇咬傷에 노끈으로 부위를 묶는데 묶을 필요가 하등 없으며 어떤 경우는 심하게 묶어서 血이 通하지 않아서 또 찢어 놓아서 살이 썩어 들어가는데 묶을 필요가 없다.

   또 붓는데 겁을 내는데 붓는 것에 겁날 필요가 없으며 24時間 內의 심장마비방지의 해독작용에 이 약을 투여 후 24시간 지나면 생명에는 안정되며 계속 투여하면 부기도 바로 빠지고 어떤 경우는 蛇毒은 다 나았는데 물린 부위 상처(찢어 놓아 썩고 곪는데) 치료가 더욱 힘드는 경우가 있으며 咬傷 환자가 거의가 꽉 잘라 묶어서 오면 그것을 풀고 치료하는 것이 좋음.

또 湯藥의 찌거기를 咬傷부위에 태워서 연기를 쏘이거나 뜸질을 하거나 하는 것도 좋으나 뜸질은 상처 부위에 균이 들어 갈 염려가 있으므로 찌거기를 응건하여 태우면서 훈을 하는 것이 더욱 좋음.

※ 치료방법 : 蛇毒 즉 蛇咬환자가 오면

① 石雄黃末(분말)을 益元散을 각각 5分, 1錢을 찬물에 먹인다.

② 鍼을 놓아도 좋고 안 놓아도 좋으나 시술하지 않고도 유효함

③ 급하게 달여서 식후에 자주자주 번복하여 복용시킨다.

※ 한 번에 많이 복용하면 蛇毒과 약과의 相克作用에 의하여 토한다.

※ 蛇毒에 中毒되면 속이 메스껍고 구토, 호흡곤란, 심장마비로 24時間 內에 死함에 방지 目的으로 특효함을 알려 드립니다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 毒蛇咬傷
2. 診斷 : 毒蛇에 依한 咬傷
3. 症狀 : 呼吸困難, 失身狀態, 心臟痲痺
4. 治療法 : 水煎服用. 1일 3~4次 分服시킨다.
5. 應用 : 蛇毒이 身體全面에 확산되지 못하도록 응급 조치해야 하며 白朮과 元甘草를 10錢까지 증가시켜서 使用해도 加함
6. 用法 : 年令에 따라서 다르지만 可及的이면 하루 몇 차례씩 分服.
7. 藥理 : 除毒作用, 和中, 理氣, 解毒의 作用이 있다.

本方은 敗毒湯을 基礎로 해서 除毒의 效果가 큰 元甘草와 蛇가 禁忌하는 白朮 및 石雄黃의 適切한 配合으로 된 處方이다.

8. 禁忌 : 石雄黃이 毒藥이므로 注意를 要하여 用量에 신경을 써야 한다.

[評價]

『東醫寶鑑』에 根據를 둔 方文으로 使用할 수 있는 處方이며 특히 이 石雄黃은 蛇와 相克이며 白朮 또한 옛 노인들의 口傳처럼 뱀이 침범하지 못하는 相克作用이 있는 것으로 적절한 加味 方文이나 石雄黃이 毒藥이므로 신중히 삼가서 使用해야 할 것으로 안다.

6. 風瘡, 疹癬, 癮疹 紫白癜風 治療法

△ 提出者 : 京畿 平澤 全漢醫院 全 鳳 和

1. 傷病名 : 風瘡, 疹癬, 癮疹 紫白癜風
2. 主要症狀 : 指間及 腕關節部肱窩 臀部 大腿內側에 特利한 瘙痒感
3. 治療實績 : 개선

	效果			
	完治	현저한 效果	症勢 好轉	未詳
11月中 10名	8		1	1
所要月數	7	3	2	

4. 副作用, 禁忌 : 鷄, 猪, 酒 炙, 鷄卵 等 禁함
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   枳殼, 赤芍, 前胡, 柴胡 各 5分, 荊芥, 薄荷, 牛蒡子, 蒼朮 各 6分, 獨活, 干蚕, 連交 各 7分에 川芎, 羌活 各 8分, 蟬退, 甘草 各 3分, 生干 水煎
6. 加減活用 : 上部甚者 加桔梗, 下部甚者는 牛膝, 木果
7. 服用方法 : 病左則食遠服, 病左不則空心服 1日 2貼 再湯 3回
8. 學術的 根據 : 杏林發刊 『古今實驗方』中에서
9. 其他事項 : 調査書類를 2回나 中央會로 發送한 바 있음

[審査內容]

1. 傷病名 : 風瘡, 疹癬, 癮疹 紫白癜風
2. 診斷 : 소양성 皮膚炎
3. 症狀 : 指間及, 腕關節部肱窩, 臀部, 大腿內側에 特利한 소양감
4. 治療 : 水煎服用 하는데 1日 3回 分服시킨다.
5. 應用 : 急性熱病의 除熱(疹癬, 風瘡, 痘瘡) 전반적인 皮膚疾患에 應用

6. 用法 : 病在則食遠服, 病在下則空心服. 1일 3회 分服함
7. 藥理 : 此方은 三焦의 實火, 內外皆熱일 때 情熱, 消炎, 除毒, 活血, 順氣之作用으로 津液이 枯渴하여 皮膚가 소양이 甚할 鎭靜하는 作用도 있다고 본다.
8. 禁忌 : 別로 없다.

[評價]

臨床에서 흔히 쓰이는 處方으로서 좋은 加減法이라 할 수 있다. 四物湯을 合하여 써보면 더욱 効가 난다.

7. 두드러기 (癮疹) 治療法

△ 提出者 : 江原 原州 경희한의원 李 在 弘

1. 傷病名 : 두드러기(癮疹)
2. 主要症狀 : 全身에 직경 5~10㎜의 붉은 반점이 생김(특히 手足에 甚)
3. 效能效果 : 51才의 女. 4貼으로 즉요(完治됨)
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 滑石 5.625g, 甘草 3.75g, 石膏, 黃芩, 桔梗 各 2.625g, 防風, 川芎, 當歸, 赤芍藥, 大黃, 麻黃, 薄荷, 連交, 芒硝, 荊芥, 白朮, 梔子 各 1.875g, 金銀花, 玄蔘, 蟬退 各 3.75g
5. 加減活用(修治法 또는 技法) : 足三里, 合谷, 曲池(呼吸補瀉法)
6. 服用方法 : 1日 2回 食後 1시간(湯煎)
7. 學術的 根據 : 『漢方臨床 四十年』(朴炳昆 著) p 438

[審査內容]

1. 傷病名 : 두드러기(癮疹)
2. 診斷 : 蕁麻疹
3. 症狀 : 全身에 직경 5~10㎜의 붉은 반점이 생김. 特히 手足에 甚
4. 治法 : 水煎服用하는데 1日 數回에 分服시킴이 좋다.
5. 應用 : 本方은 皮膚疾患 전반에 應用, 특히 食中毒한 癮疹에 다용
6. 用法 : 1日 2回 食後 1時間(湯煎)
7. 藥理 : 消炎, 溫脾, 淸熱, 和胃之作用이 있으며 特히 玄蔘, 蟬退, 連交 등의 淸血, 凉血作用이 매우 크다.
8. 禁忌 : 기름기 있는 飮食과 消化에 支障이 있는 것을 禁함

[評價]

一般的인 蕁麻疹에 아주 좋은 治療處方이 될 수 있으며 또한 皮膚疾患에 널리 使用할 수 있는 것으로 思料됨

8. 蕁麻疹 (두드러기) 治療法

△ 提出者 : 강원 삼척 崔信漢醫院 崔 燦 奎

1. 傷病名 : 蕁麻疹(두드러기)
2. 主要症狀 : 外因性, 內因性으로 甚한 瘙痒症, 全部에 두드러기
3. 治療實績 : 約 30餘名 治療한 결과 잘 治療됨
4. 效能效果 : 병력과 服用量에 따라 차이가 있으나 約 80%는 治療
5. 副作用, 禁忌 : 副作用은 없으며 治療效果가 우수함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 黃芪 11.25g, 白芍, 桂枝 各 7.5g, 甘草, 當歸, 川芎, 葛根, 熟地黃, 荊芥, 玄蔘, 枳殼, 牛蒡子, 金銀花, 陳皮, 前胡, 羌活, 獨活 各 3.75g, 入薑 3, 入棗 2
7. 加減活用 : 비교적 가감 없이도 잘 治療됨
8. 服用方法 : 1貼煎服, 2貼 再湯. 甚則 1日 4回 조식, 중식, 석식, 잘 때, 輕則 1日 3回 조식, 중식, 석식

[審査內容]

1. 傷病名 : 蕁麻疹
2. 診斷 : 蕁麻疹
3. 症狀 : 甚한 瘙痒症을 가져오며 全身에 두드러기가 돋는 증상
4. 治法 : 水煎服用하는 것으로 1日 數回에 分服시킴이 좋다.
5. 應用 : 전반적 皮膚疾患에 共히 應用할 수 있는 處方이다.
6. 用法 : 1貼水煎服, 2貼再湯. 甚則 1일 4회 分服, 輕則 1일 3회 食後服
7. 藥理 : 消炎, 鎭靜, 解熱, 淸血, 凉血, 補益氣之 作用이 있다.
8. 禁忌 : 副作用은 거의 없으며 效果가 좋다.

[評價]

本方은 大補元氣하며 消炎, 消食하며 淸熱하며 臨床에 活用해도 좋은 處方이라고 思料됨

9. 紫斑病 治療法 附 甲狀腺腫 治療法

△ 提出者 : 全南 光州 光州漢醫院 丁 仕 聲

1. 主要症狀 : 2種의 處方인데 1種은 紫斑病의 處方이고 2種은 甲狀腺腫의 處方
2. 治療實績 : 여러 患者를 完治했음
3. 效能效果 : 約 70%
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 急慢性 紫斑病에 對한 處方

(1) 加味治風調血湯~眞阿膠洙 2錢, 當歸身, 川芎去油, 薏苡仁炒, 威靈仙, 白芷, 防己, 黃柏, 蒼朮, 南星水炮, 羌活, 桂枝 各 1錢, 眞犀角, 三七根 各 5分, 紅花, 甘草灸 各 3分

上記 처방에 對한 症狀 : 紫斑病에 對한 特效方, 症狀, 急慢性 紫斑病으로써 內臟出血性 紫斑病 또는 四肢皮肤□膜毛細血管少, 點出血性 紫斑病에 特效方累試驗한 處方. 紫斑病의 病名을 西洋醫學說의 用語이고 漢方學說에서는 中國醫學의 大辭典에 依한 肌衄이란 用語가 즉 紫斑病과 同하다고 보아서 本院에서는 風濕痰火의 不調和의 作用에 依한 原因이라고 보고 上記의 처방 加味治風調血湯을 使用해 본 결과 많은 효과를 거두고 있다.

*用量 : 5貼 ~ 10貼 ~ 20貼 可量. 1日 2貼으로 再湯까지 3回 服用

(2) 急慢性 甲狀腺腫症에 對한 處方

加味淸心解盉湯~麥門冬, 便香附子(各 2錢), 紫蘇葉(1錢 5分), 黃芪, 當歸, 半夏(干製), 赤茯苓(各 1錢), 川芎, 官桂, 厚朴(薑製), 白芷, 元防風, 烏藥, 白芍藥, 檳榔, 枳殼, □木杏(各 7分), 人蔘, 甘草, 桔梗(各 5分)

* 症狀 : 甲狀腺腫大症에 特效方 症狀, 單純性肥大症, 結節性肥症=急性·慢性甲狀腺腫瘍, 心臟 憂鬱症, 不安焦燥恐怖, 消化不良, 不眠症, 乳

癌, 其他類似癌症等에 有名 治療

* 結果 大效

* 重症은 수개월 服用으로 完治됨. 1日 2貼으로 3回 煎服함. 午前食間으로 煎服, 初湯, 午後食間으로 煎服初湯, 夜間食間으로 煎服 再湯

5. 服用方法 : 1日 2貼式 2貼合 再湯. 1日 3~4煎服
6. 秘藏된 來歷 : 本人이 累試累驗한 經驗에 依한 處方임
7. 其他事項 : 治療實績의 結果는 書面으로 다 쓸 수가 없으므로 생략하고 간단히 處方만 기재함

[審査內容]

1. 傷病名 : 紫斑病
2. 診斷 : 紫斑病(肌衄)
3. 症狀 : 急慢性 紫斑病으로서 內臟出血性 또는 四肢皮肤□膜毛細血管, 小點出血性 등이 있다.
4. 治療法 : 水煎服用시키는데 1일 數回 分服시킴이 좋다.
5. 應用 : 風濕痰火가 原因이 되어오는 疾患에 本 처방을 應用.
6. 用法 : 1일 3회 食後 服用
7. 藥理 : 調血, 消炎, 散凡, 鎭痛, 補血之作用이 있다.
8. 禁忌 : 별로 거의 없다.

[評價]

本處方의 內容을 治風調血湯을 基礎로 하여 加減한 것으로서 散風, 補血, 消炎, 鎭痛을 目的으로하여 活血을 促進시키게 한 것이다. 風濕痰火의 不調和의 作用에 依한 原因으로 보고 處方을 應用하는 것으로 좋은 效果가 期待되고 있다.

10. 疥癬 治療法

△ 提出者 : 京畿 始興 부곡한의원 金 象 日

1. 傷病名 : 疥癬
2. 主要症狀 : 主로 陰部濕潤한 場所에 好發. 特히 指間이 甚하고 瘙痒極甚, 丘疹, 膿疱를 生함
3. 治療實績 : 30年間 常用하였음
4. 效能效果 : 100%로 不治率 없음
5. 副作用, 禁忌 : 陰裏囊 等 연약한 피부에 濃厚하게 塗布하면 피부염을 유발하므로 주의를 요하고 陰囊部位發生엔 大腿內面만 塗布함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 硫黃 300瓦, 雄黃, 白□綠礬 各 75瓦, 영사, 乳香, 沒藥 各 37.5瓦, 巴豆, 信石 各 3.7瓦
7. 加減活用 : 大風子, 木別子 各 75瓦을 加하여 一般 搔痒性皮膚 疾患에 應用하여 特效함
8. 服用方法 : 약품 共爲細末淸油 調和(每 2錢重) 每夜 臨臥時 擦患處 4~5일 중지, 6日만에 洗患處 着新衣
9. 學術的 根據 : 中華民國 3年冬月 上海共和書局判憎補 『本草備要』에 君藥인 硫黃, 白礬 等이 다 疥癬약이고 使藥 全部가 살충제임
10. 學術會 등 發表 : 紙上 發表없음
11. 秘藏된 來歷 : 本方은 京畿道 龍仁郡 新葛 世稱 조막손 이약국(現在死亡) 秘藏약방으로 약방使動이 新葛 洋醫師 權泰鶴에 傳하고 本人이 權醫師로부터 傳受

[審査內容]

1. 傷病名 : 疥癬
2. 診斷 : 疥癬
3. 症狀 : 主로 陰部濕潤한 場所에 發生을 잘하며 特히 指間이 甚하고,

搔痒極甚 丘疹膿瘍을 生함

4. 治療 : 蜜丸제품하여 丸으로 服用하는 藥物投與와 洗患處
5. 應用 : 大風子, 木別子 各 75才를 加하여 一般 搔痒性 皮膚疾患에 應用하여 效果가 있다.
6. 用法 : 本 內容의 藥品供給細末淸油調和 每夜 臨臥時 擦丸處 4日~5日中止 6日만에 洗患處를 도포한다.
7. 藥理 : 消炎, 鎭痛, 鎭靜, 除膿 等의 作用이 準한다.
8. 禁忌, 副作用 : 陰囊등의 연약한 皮膚에는 濃厚하게 塗布하면 皮膚炎을 發生하므로 注意를 要하고 陰囊部位發生엔 大腿內面만 塗布하는 것이 좋다.

[評價]

本 處方은 極히 毒性藥物이 많은 硫黃과 巴豆, 信石 등의 劇藥이 내포되어 있기에 使用上의 각별한 注意를 要함으로 臨床에 누구나 活用하기에는 어려운 듯 하다.

11. 皮膚病(瘙痒症) 治療法

△ 提出者 : 慶南 蔚山 德成漢醫院 金 秉 甲

1. 傷病名 : 皮膚病(瘙痒症)
2. 主要症狀 : 疥癬症과 同一함 (風熱瘡疥, 頭面瘡疹)
3. 治療實績 : 경남 울산시 서부동 510 表順瑞 35歲, 5년 이상되었음
4. 效能效果 : 병원에서 1년이상 치료하여 효과없음. 한 劑로 治療.
5. 副作用, 禁忌 : 副作用 없음. 鷄猪酒麵
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 蒼耳子 2錢, 滑石 1錢7分, 甘草 1錢2分, 金銀花, 玄蔘 各 1錢, 石膏, 黃芩, 桔梗, 蟬退 各 7分, 防風, 川芎, 當歸, 赤芍, 大黃, 麻黃, 薄荷, 連翹, 芒硝 各 5分, 荊芥, 白朮, 梔子 各 4分
7. 服用方法 : 食後 2時間
8. 學術的 根據 : 『方藥合編』 34項. 皮膚病 治療로 살균제를 사용하여도 治療가 되지않음. 濕熱을 除去하여햐 治療가 됨. 累驗한 結果 特效.

[審査內容]

1. 傷病名 : 皮膚病(瘙痒症)
2. 診斷 : 一般的 皮膚科 疾患으로써 瘙痒症을 갖는 丘疹, 膿疱.
3. 症狀 : 風熱瘡疥, 頭面瘡疹 搔痒性皮膚炎
4. 治療法 : 水煎服用하는 것으로서 1日 數回 分服시킴이 좋다. 藥物治療
5. 應用 : 一般的 搔痒性 皮膚疾患에 應用할 수 있다.
6. 用法 : 1日 3回 食後服用
7. 藥理 : 除濕, 殺菌, 消炎, 淸熱之作用, 『方藥合編』에 基礎를 둔 處方으로 濕熱을 除去하는데 유도하는 藥理作用 藥物을 加減시켰다.
8. 禁忌 : 鷄猪酒麵. 別로 副作用은 없다.

[評價]

臨床에서 많이 쓰이는 處方으로서 좋은 加減法이라 할 수 있다.

12. 瘀血 治療法

△ 提出者 : 忠南 大田 保命漢醫院 金 裕 一

1. 傷病名 : 瘀血
2. 主要症狀 : 打撲傷, 落傷, 血結, 腰, 胸, 腹, 脇痛 諸瘀血症
3. 治療實績 : 1000 餘名
4. 效能效果 : 單純 瘀血症만은 100%
5. 副作用, 禁忌 : 豚肉
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :

   瘀血湯 - 當歸尾 18.75gm, 乾地黃, 金銀花, 赤芍藥, 香附子 各 56.25gm, 紅花, 蘇木, 桃仁, 玄胡索, 靑皮, 川芎, 白芥子, 甘草 各 3.75gm
7. 加減活用 : 便秘에 加大黃, 枳實, 蒼朮 各 3.75g, 肋膜疼痛에 加玉蜀鬚, 臭角刺, 穿山甲 角 3.75g
8. 服用方法 : 酒水相半煎服 輕者 6貼, 重者 20貼. 食間 1日 3回
9. 學術的 根據 : 『方藥合編』上統 諸傷門 當歸鬚散 加減應用
10. 秘藏된 來歷 : 先親께서 應用
11. 其他事項 :

[審査內容]

1. 傷病名 : 瘀血
2. 診斷 : 打撲傷
3. 症狀 : 打撲傷, 落傷, 血結, 脇痛, 諸般瘀血症
4. 治療 : 酒水相半煎 服用 1日 3~4회 分服시키는 것이 좋다.
5. 應用 : 肋膜疼痛에 活用해도 좋은 效果가 난다.
6. 用法 : 1日 3回, 酒水相半煎 食間服用
7. 藥理 : 活血, 破瘀血, 順氣, 通氣, 循環之作用

8. 禁忌, 副作用 : 豚肉을 禁. 副作用은 거의 없다.

[評價]

本 方文은 『方藥合編』 基礎를 둔 處方으로 적절한 加減을 한 것으로서 臨床家들에게 흔히 사용하는 좋은 處方이다.

13. 盲腸炎, 夜盲症 治療法

△ 提出者 : 京畿 安養邑 廣濟漢醫院 柳 錫 熙

1. 傷病名 : 夜盲症
2. 主要症狀 :
3. 治療實績 : 1953. 2. 3 朴○○ 8歲男
4. 效能效果 : 神效
5. 副作用, 禁忌 : 禁忌 無
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 肥兒蕩(本方) - 夜明沙(박쥐똥) 또는 박쥐(蝙蝠)을 가루를 만들어 7.75g
7. 加減活用 :
8. 服用方法 : 1日 1回 1個月
9. 學術的 根據 :
10. 秘藏된 來歷 : 家傳 父 秘藏
11. 其他事項 :

1. 傷病名 : 盲腸炎
2. 主要症狀 :
3. 治療實績 : 1974. 3. 7. 鄭○○ 36歲 女, 1960. 11. 7. 리○○ 57세 男
4. 效能效果 : 神效
5. 副作用, 禁忌 : 禁忌 無
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 牧丹皮 18.75g, 薏苡仁, 金銀花, 桃仁, 玄胡索, 木通, 龍膽 11.25g.
7. 加減活用 :
8. 服用方法 : 1日 1回 1個月
9. 學術的 根據 :
10. 秘藏된 來歷 : 家傳 父 秘藏

11. 其他事項 : 지금은 의료시설이 완비되어서 수술도 됩니다마는 개업전후는 상당 인기를 끌었습니다. 지금도 수술을 못하겠다는 사람을 치료하였습니다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 盲腸炎
2. 診斷 : 마크반씨 포인트에 痛症과 發熱, 惡寒, 下腹引痛
3. 症狀 : 惡寒, 發熱, 下腹引痛, 惡心, 嘔吐
4. 治療法 : 水煎服用하는 것으로 1日 數回 分服
5. 應用 : 消炎鎭痛에 共히 應用할 수 있다.
6. 用法 : 1日 數回 分服 水煎服用
7. 藥理 : 消炎, 鎭痛, 殺菌, 除膿之作用이 있다.
8. 禁忌, 副作用 : 기름기 있는 음식을 금하며 鷄猪酒麵을 禁食

[評價]

本 處方은 構成이 强力한 消炎 및 鎭痛, 解熱作用이 있으므로 急性 盲腸炎에 충분히 臨床에 適用할 價値가 있다고 思料됨.

14. 癇疾症 治療法

△ 提出者 : 京畿 安養邑 廣濟漢醫院 柳 錫 熙

1. 상병명 : 癇疾症
2. 主要症狀 :
3. 治療實績 : 1958. 3. 11. ○○○ 16歲 남 神效, 1973. 6. 7. 金○○ 24歲 여 良好, 1975. 1. 1. 申○○ 24歲 남 (半快癒)
4. 效能效果 : 神效
5. 副作用, 禁忌 : 無
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 芎藥甘草湯(本方) - 天麻, 古本, 釣鉤藤, 靑皮, 木果 各 3.75g, 鐵花粉 18.75g,
7. 加減活用 :
8. 服用方法 : 1日 2回 약 3개월 복용
9. 學術的 根據 :
10. 秘藏된 來歷 : 父
11. 其他事項 :

* 鐵花粉製造方法 : 藥酒 1斗 2升에 무쇠를 多數 求하여 유리 같이 갈아서 줄그릇위에 덧혀서 門앞에서 2, 3개월 두었다가 논이 된 후 이것을 내어서 구어 粉을 만들 것

※ 禁酒藥 : 滑石(忠州産) 雨水臘雪水에 七次製 22.50g, 甘草(元) 가루로 만들어 3.75g 합하면 六一散(益元散)이 됩니다. 그것을 1日 3回 冷水에 服用함. 約 2, 3개월이면 食事를 잘 하고 술을 싫어하게 됩니다. 그러므로 주사 甚한 사람들만이 服用하여 效果를 보았습니다. 酒客은 술 끊는 약이라하면 먹지 않습니다. 그러므로 補藥이라 속여서 먹이면 됩니다. 술먹는 사람 대개가 위장이 약하므로 잘 먹습니다.

1955. 1. 3. 李○○ 45歲 男 神效, 1967. 2. 2. 金○○ 27歲 男 神效
1975. 10. 1. 申○○ 24歲 男 神效 外 100여명 있음

[審査內容]

1. 傷病名 : 癎疾
2. 診斷 : 發作時에 短叫聲을 내며 顔面蒼白에 이어서 瞳孔이 散才되며 對光反應이 消失되고 痙攣은 强直性이며 이어서 間代性이 된다. 叫聲을 지르며 同時에 意識 完全 消失된다. 發作은 暗示의 영향을 받지 않으며 外界로부터의 자극의 어떤 것이나 영향력이 없고 또 泡沫性의 唾液을 내뿜고 간격을 두고 發作은 反復된다. 정신적 變化가 일어나며 後에 智力減退가 온다.
3. 症狀 : 本症은 痙攣의 有無나 精神症狀에 따라 大發作, 小發作 또는 癲癎 類似 症의 3型으로 區別한다.
4. 治法 : 本症의 漢方的 原因이 痰, 火, 驚을 가장 基本的 要因으로 보고 있으므로 祛痰, 淸火, 除驚之劑를 中心으로 治療의 基本이 必要하다. 그러므로 芍藥甘草湯에 加 釣鉤藤, 靑皮, 木果, 鐵花粉 등의 藥材를 加하여 水煎 服用 시킨다.
5. 應用 : 癎疾者의 治療劑로써 應用될 수 있다.
6. 用法 : 1일 2회(약 3개월 服用) 年令에 따라 增減하되 1일 4-5회 以上으로 分服시킴이 좋다.
7. 藥理 : 芍藥甘草湯으로서 淸肝, 淸火, 和痰, 除驚, 祛風하는 作用이 있고 加하는 藥材들의 作用이 本症에 充分히 加入할 수 있다.
8. 禁忌 : 長期 服用에 再考해야 할 것이다.

[評價]

『方藥合編』에 있는 元方으로 흔히 쓰이는 處方이며 加하는 藥材로서도 適當한 것들이다.

<부 인 과>

1. 子宮筋腫(漢方名 腸覃症, 月事時下) 治療法

△ 提出者 : 서울 中區 聖信漢醫院 李 聖 宿

1. 傷病名 : 子宮筋腫(漢方名 腸覃症, 月事時下)
2. 主要症狀 : 姙娠後 6개월 된 것과 恰似하고 밀어보면 部位가 移動되며, 月經이 있다.
3. 治療實績 : 患者 5人中 有效者 3名(稀少한 病이므로 確實한 統計는 漢方病院에서나 可能함)
4. 效能效果 : 筋腫을 分娩하였음
5. 副作用, 禁忌 : 惡心(或者에 限해서). 禁忌 - 鷄, 猪, 마늘 등
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 桂枝茯苓丸料加鱉甲甘草
   桂枝 4.0g, 茯苓 5.0g, 牧丹皮 4.0g, 桃仁 5.8g, 芍藥 5.0g, 鱉甲 4.0g, 甘草 2.0g 以上의 比例로 梧子大로 蜜丸함
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 桂枝茯苓丸料에다 淺因에서는 鱉甲, 甘草, 2味를 加入하였음
8. 服用方法 : 1回 50丸씩 1日 3回 分服하되 約 30~40일간에 有效
9. 學術的 根據 : 安西 安周氏의 漢法의 臨床과 處方에서 힌트를 얻었음
10. 學術會 등 發表與否 : 醫林誌 1972. 3. 10 발행한 제 90호에 發表
11. 秘藏된 來歷 : 子宮筋腫하면 本來 稀少한 病이며 洋方에서는 手術을 勸奬하나 上記한 漢方療法으로 無難이 成功되므로 自信을 얻어 本方을 秘藏케 되었음
12. 其他事項 : 本方은 筆者의 愛用方이다. 하지만 患者를 많이 다루지 못한 關係上 確率을 把握치 못하였음이 有感이다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 子宮筋腫

2. 診斷 :

① 一般診斷 手拳大 以上으로 增大한 子宮筋腫은 腸診上 腫瘤를 認知할 수 있으나 粘膜下筋腫, 浸潤性筋腫 또는 腫瘤가 鷄卵大 以下의 것 등은 診斷에 衣해서 確認한다.

② 鑑別 診斷

子宮筋腫은 子宮癌, 卵巢筋腫, 胞狀奇胎 등과의 鑑別을 腰한다.

3. 症狀 : 初期에는 何等의 臨床症狀이 없으며 腫瘤가 增大되어 發見되는 例가 많다. 그러나 粘膜下筋腫의 경우 등에는 過多月經, 腹痛, 또는 不正出血을 일으키는 일이 있고 筋腫이 增大되면 인접 器管에 壓迫症狀이 나타난다. 稀少하게는 惡性變化를 일으키는 일이 있으므로 注意를 要한다.

4. 治療法

① 處方內容- 桂枝 4g, 茯苓 5g, 牧丹皮 4g, 桃仁 5.8g, 芍藥 5g, 鱉甲 4g, 甘草 2g

② 特異治療-洋方에서는 筋腫除去術 또는 子宮除去術을 行한다.

5. 應用

上記한 處方은 『金匱要略』에 所載한 桂枝茯苓丸의 加減方으로 女性의 內性器炎症 및 腫瘍등에 廣範하게 活用할 수 있다.

6. 用法

桂枝茯苓丸의 用法은 원래는 鷄卵大로 作丸하여 每回 1丸씩 水煎服하는 것이나, 近來에는 梧子大로 蜜丸하여 1回에 50丸씩 服用하거나 또는 上의 分量을 1貼으로 作하여 水煎服한다. 1日 3回 食前 또는 空服에 服用한다.

7. 藥理

桂枝茯苓丸의 適用目標는 瘀血이다. 따라서 本方은 通經, 活血, 破瘀, 消積의 效能이 있다.

8. 禁忌, 副作用

鷄肉, 豬肉, 마늘을 금하며 或者는 惡心을 일으킨다.

[審査 評價]

1. 發表者는 子宮筋腫과 腸覃을 同病으로 보았으나 審査者의 所見에 依하면 子宮筋腫은 漢方病名 石瘕와 類似하고 腸覃은 오히려 卵巢筋腫에 該當하는 것으로 思料된다.
2. 發表者는 主要症狀으로 妊娠 5, 6個月 된 것과 恰似하고 밀어보면 部位가 移動되며 月經이 있다 하였는데 이것은 『東醫寶鑑』 등 古典에 始如鷄子 久如孕胎 按之堅 推之移 月事時下.....
   云云 이러한 記錄에 根據한 것으로 思料되거니와 이것은 腸覃의 症狀으로 卵巢筋腫의 臨床症狀과 合致되는 것이라 보여진다. 子宮筋腫은 子宮의 平滑筋纖維가 以上 增殖하여 增大하는 것으로 腹診上 밀어보아도 部位가 移動할 수는 없다. 또한 月事時下란 文句의 解釋도 不正出血로 보기 보다는 腫瘍이 있으면서도 月經은 正常으로 發來한다는 뜻으로 解釋함이 妥當하리라 思料되어 上의 古典의 記錄은 有莖筋腫의 臨床症狀에 合致하는 것이라 思料된다.
3. 發表者는 效能效果에 項에서 筋腫을 分娩하였다 하였으나 上에서도 言及한 바와 같이 筋腫은 子宮筋 自體의 增殖이므로 分娩 또는 剝離될 수가 없으므로 發表者가 체험한 것은 胞狀奇胎나 葡萄狀奇胎 등 所謂 漢方의 鬼胎에 對한 錯誤가 아닌가 推測된다.
4. 그러나 上方은 瘀血症을 나타내는 桂枝茯苓丸에 藥力을 陰器로 引導하는 鱉甲을 加하였으므로 子宮 및 그 附屬器의 腫瘍 및 炎症에 廣範하게 活用할 수 있다고 思料된다.

2. 難産 治療法

△ 提出者 : 경북 상주 경주한의원 박 윤 호

1. 主要症狀 : 難産
2. 治療實績 : 當歸, 川芎 各 18.75g, 澤瀉, 赤茯苓, 桑白皮, 枳殼, 檳榔, 木通去節 各 3.75g, 加益母草 11.25g 尤好
3. 效能效果 : 屢試屢驗
4. 副作用, 禁忌 : 無
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 三陰交瀉 合谷補
6. 服用方法 : 臨産時 空心服
7. 秘藏된 來歷 : 昔日西門醫秘方으로 1875년 祖父(의생)任으로부터 傳受하여 至今 保藏 活用함

※ 評價

・治 走馬痰, 內腫神方, 屢試百中 (祖父任의 傳受)

石灰 3~4次水飛細末 7.5g, 白芥子研末 1.875g 以上 2種을 作2包하여 淡酒에 日再服(朝夕)

未膿者는 1日 1包, 已膿者는 1日 2包式

未膿者 10包, 已膿者 20包服이나 以差爲度할 것

(石灰는 慶北 聞慶 石灰가 第1好品)

・此藥을 服用中 雄倭鷄一首弔死去腸하고 土硫黃 1斤 넣고 堅傳하야 烹食하면 尤好

・治 痰痛神方(神經痛) 祖父任의 傳受 : 草烏 9.375g, 骨痰草 7.5g, 牛膝, 貝母, 知母, 黃柏, 甘草 2.625g,

右干汁 米糊丸 每 5個式 和酒下하되 몸에 藥의 反應이 甚할 境遇에는 1丸을 減하고 反應이 없을 때는 1丸~2丸 程度 加하여도 似可

・治 白帶下症

海螵蛸 去殼 4兩 水飛作末하여두고 每空心服으로 大薊 4750g을 煎해

서 藥水에 1日 3回로 每 7.5g式 調服 屢試屢効如神

・治 赤白痢神方(屢試屢驗) 祖父任에게 傳受

樗根白皮(小白皮) 33.70g, 地楡 18.75g, 御米殼(鶯米殼) 15.0g, 檳榔, 肉豆久, 甘草 各 3.75g

・治 吐血, 血刃血, 咳唾痰血(咳血), 咳血

蘿蔔을 取汁하여 塩을 少許 調服하면 卽止如神

[審査內容]

1. 傷病名 : 難産

2. 診斷

望, 聞, 問, 切 등 四診法外에 主로 레오폴드 腹診法을 使用하며 경우에 따라서는 內診, 特히 雙合診 등에 依해 難産의 類型을 鑑別한다.

3. 症狀

難産이라 함은 正常分娩이 아닌 異常分娩의 總稱이다. 異常分娩은 크게 分娩時期의 異常과 分娩要素의 異常으로 分類한다.

4. 治療法

(1) 處方 - 當歸, 川芎 各 18.75g, 澤瀉, 赤茯苓, 桑白皮, 枳殼, 檳榔, 木通(去節) 各 3.75g, 益母草 11.25g

(2) 特異療法-上에 例示한 表에서 보는 바와 같이 難産의 類型은 多樣하다. 따라서 간단한 分娩介助나 藥物의 補助로 不可能한 경우는 外科的인 措置에 依據한다.

5. 應用

上記한 處方은 補血, 行血, 和血의 效能을 가진 芎歸湯에 行氣, 滑胎하는 藥材를 加味한 處方으로 分娩促進의 目的으로 活用할 수 있으리라 思料된다.

6. 用法

水煎服하여 1日 3回 服用하며 分娩이 遲延될 때는 服用 回收를 增加하여도 無防하다.

7. 藥理

補血, 活血, 行血, 祛瘀의 效能이 있고 子宮收縮을 促進한다고 思料

8. 禁忌, 副作用

臨産日이 아니면 服用을 禁하여야 한다.

[審査評價]

1. 發表者는 難産에 屢試屢驗하였다 하였으나 難産의 類別 및 程度는 多種多樣하므로 모든 難産을 上記한 處方藥으로 모두 解決할 수는 없으리라 思料된다.
2. 다만 上에 例示한 表中에서 娩出力이 弱하여 오는 難産에는 效力이 있을 것으로 思料된다. 그러나 産道 및 胎兒와 그 附屬物의 異常에 依한 難産에는 何等의 臨床的 意義가 없다고 判斷된다.

※ 白帶下症 治療法

1. 傷病名 : 白帶下症
2. 診斷 : 白帶下의 漢方病因은 大部分 濕에 起因하나 臨床時는 寒熱을 辨證하여야 하며, 또한 機能性인지 機質性인지의 鑑別도 必要하며 病變의 局處도 確認함이 重要하다.
3. 症狀

白物이 流下하여 外陰部를 汚染하고 陰部搔痒, 發赤疼痛을 일으키고, 病變이 子宮에 있으면 下腹痛이 있고 尿道에 感染이 되면 小便이 淋數하고 急性은 寒熱을 發한다.

4. 治療法

處方內容-海螵蛸(去殼) 7.5g, 大薊 47.5g

5. 應用

帶下治療는 證에 따라 辨證論治함이 原則이나, 上記한 處方은 主로 海螵蛸의 燥濕作用과 大薊의 淸熱除濕作用에 期待하는 것이라 思料된다.

6. 用法

海螵蛸는 去殼해서 粉末로 하고 이것을 每回 7.5g의 大薊 47.50g의 煎

水로 調服한다. 1日 3回 空心에 服用한다.

7. 藥理

海螵蛸와 大薊는 各各 收斂과 止血의 效能이 있어서 帶下流出을 收攝할 수 있다고 思料된다.

8. 禁忌, 副作用

上의 處方은 收斂性은 强하나 淸熱消炎作用은 比較的 없다고 思料되어 急性炎症의 경우는 禁하는 것이 좋다고 思料된다.

[審査評價]

1. 上方은 收斂作用이 主目標이므로 何等의 臨床症狀을 나타내지 않은 機能性帶下나 晩蟬頸管炎의 帶下流出을 收攝하는데는 有效할 것으로 思料된다. 그러나 急性 炎症으로 因한 帶下 例하여 急性子宮頸部炎, 急性膣炎의 경우는 帶下의 量이 增加하여도 上方을 單獨으로 使用함은 適合치 않으리라 思料된다.

3. 子宮下垂와 脫出性 治療法

△ 提出者 : 江原道 橫成 天一漢醫院 李 東 允

1. 傷病名 : 子宮下垂와 脫出症 兼 脫肛症
2. 主要症狀 : 上同
3. 效能效果 : 全効
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 補中益氣湯 加 赤石脂(本方) 黃芪 5.625g, 人蔘 7.5g, 白朮 7.5g, 甘草 7.5g, 當歸身 3.75g, 陳皮 3.75g, 升麻 2g, 柴胡 2g, 加 赤石脂 3.75g
5. 加減活用 : 年令에 따라 適宜加減
6. 服用方法 : 1日 3回 午前 10時, 午後 15時, 22時
7. 學術的 根據 : 『漢方診療之實際(日版)』 株式會社(南山堂) 婦人科 262項과 外科의 肛門直腸 出血

[審査內容]

1. 傷病名 : 子宮下垂 및 脫出症
2. 診斷 : 內診으로 確認한다.
3. 症狀 : 下垂의 경우는 下腹 및 陰門의 重壓感이 있고 脫出症의 경우는 子宮이 膣腔으로 脫出된다.
4. 治療法

   處方 : 黃芪 5.625g, 人蔘 7.5g, 白朮 7.5g, 甘草 7.5g, 當歸身 3.75g, 陳皮 3.75g, 升麻 2g, 柴胡 2g, 赤石脂 3.75g
5. 應用

   上의 處方은 李東垣의 補中益氣湯에 赤石脂를 加味한 處方이다. 그러므로 中氣下陷에 依한 諸疾患 例하여 子宮下垂 및 脫肛 등에 廣範하게 活用할 수 있다.
6. 用法

水煎하여 1日 3回 服用한다.

7. 藥理

補中, 益氣, 升擧의 效能이 있고 여기에 다시 赤石脂의 收斂性을 配合한 것이라 思料된다.

8. 禁忌 및 副作用

骨盤底筋群의 裂傷에 依한 子宮下垂 및 脫出에는 該當되지 않는다.

[審査 評價]

1. 中氣下陷, 子宮筋의 弛緩, 無力 등에 依한 下垂에는 有效할 것으로 思料된다.
2. 子宮底筋群의 裂傷에 依한 子宮脫出에는 效力이 없을 것으로 思料된다.

4. 慢性 子宮內膜炎 治療法

△ 提出者 : 서울 麻浦 德成漢醫院 金 利 中

1. 傷病名 : 慢性 子宮內膜炎
2. 主要症狀 : 赤白濁膿瘍의 分泌物多量下, 月經過多, 腰痛, 月經時 疼痛, 氣鬱
3. 治療實績

효과 / 구분	效果			
	완 치	현저한 효과	증세호전	미 상
진료환자(30名)	15名(50%)	9名(30%)	3名(10%)	3名(10%)
평균치료기간	20日	20日	20日	20日

4. 效能效果 : 婦人赤白帶下가 그치고 下腹痛症이 없어지고 心血, 收斂이 되었음
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 克應丸
   熟地黃, 赤芍藥, 當歸 各 75g, 赤石脂, 龍骨, 川芎, 牡蠣, 赤茯苓, 牧丹皮, 楝根白皮, 艾葉 各 37.5g
6. 加減活用 : 消化不良 加 白朮 75g, 砂仁 37.5g, 鬱怒傷肝 發熱脇痛에는 加柴胡 56g, 梔子, 靑皮 各 37.5g, 赤石脂, 煅醋淬牡蠣, 煅酒淬艾葉製
7. 服用方法 : 細末하여 醋糊丸, 梧子大 1日 3回, 1回 50丸. 食前 2時間 服用함. 消化不良時에는 食後 1時間 服用
8. 學術的 根據 : 趙憲泳 著 『婦人病 治療法』 40~47페이지, 121페이지
   杏林書院 張介賓 著 『景岳全書』
9. 秘藏된 來歷 : 趙憲泳 著 『婦人病 治療法』 冊子에서 拔取하여 約 10餘名의 帶下症 患者에게 5日間式 無料 投藥한 結果 3名의 患者가 輕減하다하여 20日間 繼續

無料 投藥한 즉 6名이 完治됨을 보고 그때부터 지금까지 約 5年間 愛用中

[審査內容]

1. 傷病名 : 慢性 子宮內膜炎
2. 診斷 : 望, 聞, 問, 切 四診 및 腹診, 內診에 依해 診斷하며 경우에 따라서는 Smear Method 또는 Kolpaskopie를 함이 좋다.
3. 症狀 : 赤白濁 및 膿瘍의 分泌物이 多量으로 流下하고, 月經過多, 腰痛, 月經時疼痛, 氣鬱 등의 症狀이 있다.
4. 治療法 : 熟地黃, 赤芍藥, 當歸 各 75g, 赤石脂, 龍骨, 川芎, 牡蠣, 赤茯苓, 牧丹皮, 楮根白皮, 艾葉 各 37.5g
5. 應用 : 消化不良에는 白朮 75g, 砂仁 37.5g을 加하고 鬱怒傷肝, 發熱, 脇痛에는 柴胡 56g, 梔子, 靑皮 各 37.5g, 赤石脂(煆 : 醋碎), 牡蠣(煆 : 醋碎) 艾葉(製)를 加한다.
6. 用法 : 細末하여 醋糊露로 梧子大의 丸을 만들어 1日 3回, 1回 50丸씩 복용한다.
7. 藥理 : 本方은 『景岳全書』 및 趙憲泳著 『婦人病 治療法』에 所載한 克應丸으로 補血, 行血, 收斂, 消瘀, 祛濕 등의 效能이 있어 子宮內膜炎症에 消炎, 收斂의 效能이 있을 것으로 思料된다.
8. 禁忌, 副作用 : 胃弱者는 多少의 消化障碍가 있을 것으로 思料된다.

[審査 評價]

慢性 子宮內膜炎등에 廣範하게 活用할 수 있는 處方이라 思料된다.

5. 下血 治療法

△ 提出者 : 江原道 春川 洪川漢醫院 李 鍾 九

1. 傷病名 : 下血
2. 主要症狀 : 神經性 下血, 經度不順下血, 流産, 下血
3. 治療實績 : 10年 使用 良好
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 歸脾湯 - 當歸, 龍眼肉, 酸棗仁, 遠志, 人蔘, 黃芪, 白朮, 白茯神 各 1錢, 木香 5分, 甘草 3分, 地楡, 荊芥黑炒, 防風, 升麻 各 1錢, 香附子, 大薊, 槠根白皮 各 1~2錢

※ 下血量에 따라 槠根白皮, 大薊를 增減

· 神經性에 있어서는 鮮紅色 下血

四物湯加減法 - 當歸, 川芎, 白芍藥, 熟地黃 各 2錢半, 生地黃, 白朮, 黃芪, 阿膠珠, 茯苓, 梔子, 地楡, 荊芥黑炒, 香附子, 甘草, 乾干黑炒 各 1錢. 甚則 大薊, 槠根白皮 1~3錢.

※ 遺産後 葸然暴. 下□ 3개월 若干 下血

四物湯加減方 - 當歸, 川芎, 白芍藥, 熟地黃, 黃芪, 槠根白皮 各 1錢半, 香附子 1錢半, 荊芥黑炒, 乾干黃炒, 白朮, 白茯, 地楡, 砂仁, 山査, 艾葉 各 1錢, 升麻, 防風, 甘草 各 5分

經度時葸然暴下 性下血, 又崩漏性, 炎症甚者 槠根白皮, 大薊 1~3錢

※ 近間 槠根白皮는 木皮가 大部分인데 根皮를 使用함이 良好

5. 學術的 根據 : 歸脾湯, 四物湯 活用

[審査內容]

1. 傷病名 : 下血
2. 診斷 : 四診에 依해 確認하고 機能出血과 不正出血을 鑑別함이 중요
3. 症狀 : 發表者는 神經性 下血, 經度不順의 下血, 遺産後의 下血로 三分하였거니와 經過不順의 下血이란 過多月經을 指稱하는 것이 아닌가 思料되고, 遺産後의 下血은 大部分 胎兒附屬物 및 胎盤片의 殘留에 起因하거나 子宮收縮不全에 起因하는 것도 있다. 神經性 下血이란 七情所傷에 依한 不正出血을 指稱하는 것이 아닌가 思料된다.
4. 治療法
   ① 處方(1) : 當歸, 龍眼肉, 酸棗仁, 遠志, 人蔘, 黃芪, 白朮, 白茯苓 各 4.0g, 木香 2g, 甘草 1.2g, 地楡, 荊芥(黑炒), 防風, 升麻 各 4.0g, 香附子, 大薊, 椵根皮 各 8.0g
   ② 處方(2) : 當歸, 川芎, 白芍藥, 熟地黃 各 10.0g, 生地黃, 白朮, 黃芪, 阿膠珠, 茯苓, 梔子, 地楡, 荊芥(黑炒), 香附子, 甘草, 乾干(黑炒) 各 4.0g
   ③ 處方(3) : 當歸, 川芎, 白芍藥, 熟地黃, 黃芪, 椵根白皮 各 6.0g, 香附子 6.0g, 荊芥(黑炒), 乾干(黑炒), 白朮, 白茯苓, 地楡, 砂仁, 山査, 艾葉 各 4.0g, 升麻, 防風, 甘草 各 2.0g
5. 應用

   處方(1)은 思慮傷脾, 七情損傷을 治療하는 歸脾湯에 止血劑를 加味한 것이고, 處方(2)와 (3)은 똑같이 補血, 行血, 和血의 主方인 四物湯에 止血劑를 加味한 것이다. 따라서 諸般의 性器出血에 廣範하게 活用할 수 있으리라 思料된다.
6. 用法 : 水煎하여 1日 3回 服用한다.
7. 藥理 : 處方(1)은 補血, 安身, 健脾, 收斂, 止血의 效能이 있고 處方(2)와 (3)은 같이 補血, 和血, 收斂, 止血의 效能이 있다.
8. 禁忌, 副作用 : 特別한 禁忌는 없으나 安靜을 要함

[審査 評價]

1. 女性 性器出血 및 過多月經에 廣範하게 活用할 수 있는 처방이라 思料된다.

2. 出血이 甚할 때 大薊, 小白皮를 增減함은 止血의 效能을 增大하기 위함이다.

6. 黃帶, 白帶(子宮內膜炎 및 附屬疾患) 治療法

△ 提出者 : 釜山 東來 高麗漢醫院 金 基 南

1. 傷病名 : 黃帶, 白帶(子宮內膜炎 및 附屬질환)
2. 主要症狀 : 小腹冷痛, 白色帶下, 黃色帶下, 月經不調, 倦怠, 虛弱
3. 治療實績 : 子宮疾患에 依한 黃白帶下症에 虛實을 不拘하고 約 90%의 卓效를 期함
4. 效能效果 : 藥效가 迅速하고 虛實症間에 拘碍를 받지 아니함
5. 副作用, 禁忌 : 副作用은 無함. 禁忌는 매운 음식, 커피, 過飮
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 人蔘, 陳皮, 白朮, 杜冲炒, 海螵蛸, 龍骨, 樗根白皮蜜炙, 白茯苓 各 5.625g, 甘草炙 3.75g
7. 加減活用 : 樗根白皮가 味苦하므로 鷄冠花(맨드라미꽃)를 換入해서 同等한 效果가 있음. 萬若 赤白帶下 또는 赤帶下일 境遇에는 鷄冠花, 蓮子肉 各 5.625g, 黃芩酒炒 2.625g을 上記 處方에 加味하여 投用하면 卓效함. 腹痛 加 乾干炒 3.75g
8. 服用方法 : 1日 2貼 再湯3服
9. 學術的 根據 : 婦女百病驗方選集 119項 下段 (杏林書院版)
10. 秘藏된 來歷 : 處方內容이 四君湯 本方에 依據한 加味方이므로 採用한 結果, 虛實鑑別 없이 卓效方임을 治驗함

[審査內容]

1. 傷病名 : 黃帶, 白帶 (子宮內膜炎 및 附屬疾患)
2. 診斷 : 여기에서의 黃帶 및 白帶는 子宮 및 그 附屬器의 炎症에 依한 것이므로 診斷은 四診 및 內診에 의하여 病變의 局處 및 程度를 確認한다.
3. 症狀 : 小腹冷痛, 白色帶下 또는 黃色帶下, 月經扶助, 倦怠, 虛弱
4. 治療法 : 人蔘, 陳皮, 白朮, 杜冲, 海螵蛸, 龍骨, 樗根白皮(蜜炙), 白茯苓 各 5.62g, 甘草(炙) 3.75g

5. 應用 :

赤白帶下 또는 赤帶下일 경우에는 鷄冠花, 蓮子肉 各 5.625g,黃芩(酒炒) 2.625g을 加味하고 腹痛이 있으면 乾干(炒) 3.75g을 加味한다. 단, 鷄冠花는 槔根白皮와 同等한 效果가 있다.

6. 用法

水煎하여 1日 3回 空心에 복용함

7. 藥理

本方은 健脾, 補氣의 代表方인 四君子湯 加味方으로 血從氣의 理致를 活用한 處方이라 思料된다.

8. 禁忌, 副作用

別無

[審査內容]

1. 大體로 帶下는 濕에 起因하고 濕은 脾에서 主管하므로 補氣, 健脾하는 四君子湯에 除濕하는 白茯苓, 收斂하는 海螵蛸, 龍骨, 消炎 및 除濕熱하는 小白皮를 加味한 處方槪念을 合理的이라 思料된다.

2. 다시 熱에는 黃芩, 蓮子肉을 冷에는 乾干을 加味하여 活用함도 辨證理論上 妥當하다고 思料된다.

7. 産後諸症 治療法

△ 提出者 : 慶北 盈德 僉天漢醫院 金 根 永

1. 傷病名 : 産後諸症
2. 主要症狀 : 氣血虛耗, 脾胃刦弱, 或 惡露木行, 或 去血過多, 口乾心煩, 喘急心腹 疼痛, 頭眩眼黑, 耳鳴, 不語, 昏睡不省人事(竝皆治)
3. 主要症狀 : 産後, 或 搔把後 此에 兩後 20年 患者數 數百名에 無不皆効
4. 效能效果 : 子宮機能 正常回復, 子宮內部 損傷이 此藥 服用에 正確하게 速治됩니다.
5. 副作用, 禁忌 : 副作用 없음. 飮食은 禁忌없고, 3週間 微汗出로 調理를 期必要함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 當歸酒洗 6g, 川芎, 白芍藥酒炒, 熟艽, 白朮炒, 白茯苓, 香附子 各 4g, 陳皮, 乾干炒黑 各 3g, 甘草灸 2g, 入薑3棗2, 枳殼, 砂仁, 厚朴, 山査, 玄胡索, 秦艽 各 4g
7. 加減活用 : 去血過多 倍 川芎, 當歸, 乾干. 氣虛 加人蔘 3g, 兩脇肋痛 加靑皮, 肉桂. 吐痰 加半夏, 貝母. 咳嗽不止 加五味子, 桑白皮. 昏睡, 口噤不語 加荊芥穗. 小服鎭痛 加桃仁, 紅花, 蘇木. 甚者 三稜, 逢朮竝酒炒. 有汗加黃芪, 口乾 加麥門冬. 惡露不行 加益母草, 牧丹皮, 桃仁入童便及酒
8. 服用方法 : 1日 2貼. 再煎. 食後 1時間 徵取汁
9. 學術的 根據 : 丁茶山先生所著 未及公行行世者也 云 孫原翼 叙于 素主新鑑
10. 秘藏된 來歷 : 小生이 開業時 前人이 所藏한 稀責冊이라 自處한 것을 抄□取得한 것임
11. 其他事項 : 搔把 手術者는 5貼이면 定하고 當日부터 服用可. 正産이면 産後로 부터 服用始作으로 20貼에서 2劑, 3劑 繼續 服用하여도 좋음

[審査內容]

1. 傷病名 : 産後諸症
2. 診斷 : 四診에 의하여 合併症의 有無를 確認한다.
3. 症狀

   氣血虛耗, 脾胃劫弱 外에 惡露不行, 去血過多, 口乾, 心煩, 喘急, 心腹痛, 頭眩眼黑, 耳鳴, 不語, 昏睡不省人事 등의 症狀이 合併 또는 併發.
4. 治療法

   當歸(酒洗) 6g, 川芎, 白芍藥(酒炒), 熟艽, 白朮(炒), 白茯苓, 香附子各 4g, 陳皮, 乾干(炒黑) 各 3g, 甘草(灸) 2g, 枳殼, 砂仁, 厚朴, 山査, 玄胡索, 秦艽 各 4g, 生干 3片, 大棗 2枚
5. 應用

   去血過多에는 當歸, 川芎, 乾干을 倍增하고 氣虛에는 人蔘 3g을 加味하고 兩脇肋痛에는 靑皮, 肉桂를 加하고, 吐痰에는 半夏, 貝母를 加하고 咳嗽不止에는 五味子, 桑白皮를 加하고, 昏睡, 口噤, 不語에는 荊芥穗를 加하고 小腹鎭痛에는 桃仁, 紅花, 蘇木을 加하되 甚하면 三稜, 蓬朮(竝醋炒)를 加하고 有汗에는 黃芪를 加하고 口乾에는 桃仁, 童便 및 酒를 加한다.
6. 用法 : 水煎하여 1日 3回 食後 1時間에 服用한다.
7. 藥理

   産後諸病은 大部分 氣血虛弱, 惡血妄行, 飮食過傷에 起因하는데, 古人은 이를 産後病의 三源이라 하였다. 本方의 方劑構成은 基本的으로 氣血을 雙補하는 八物湯에 調氣, 行滯하는 數種의 弱을 加味한 것이다.
8. 禁忌, 副作用

   禁忌事項이 없으며 約 3주간 調理하고 服藥後에는 微汗을 誘導한다.

[審査 評價]

本方은 氣血을 雙補하는 八物湯 또는 産後調理劑인 補氣湯과 立方의 趣旨가 大同하다고 思料되어 産後調理用으로 廣範하게 活用할 수 있을 것으로 評價됨

8. 急慢性 子宮內膜炎症(實症) 治療法

△ 提出者 : 경기도 의정부 李漢醫院 李 應 世

1. 傷病名 : 急慢性 子宮內膜炎症(實症)

2. 主要症狀 : 發熱, 充血性 下腹, 壓重感, 疼痛, 膿瘍惡臭, 帶下, 排尿頻數痛, 腰腸筋 緊張

3. 治療實績 :

效果 / 區分	效果				備考
	完治	현저한 효과	증세호전	미상	
患者數	8 名	2 名	2 名	2 名	計 14 名
완치 및 호전기간	20~30 日		7 日	5 日	

4. 效能效果 : 子宮內膜의 炎症이 甚하여 切除手術을 要한 者, 筋腫으로 手術을 要한 者, 不腹部諸炎症

5. 副作用, 禁忌 : 無. 禁忌, 肉食

6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 桂枝茯苓湯 + 當歸芍藥散 加 大黃, 瓜婁仁, 白芍藥, 桂枝, 白茯苓, 牧丹皮, 桃仁, 當歸, 川芎, 白朮, 澤瀉 3.75g

7. 加減活用 : 筋腫 加 鱉甲 3.75g, 唐木香, 檳榔 1.875g

8. 服用方法 : 1日 3回 空服 服用

9. 學術的 根據 : 『漢方診療의 實際』 263p. 桂枝茯苓湯, 大黃牧丹皮湯, 當歸芍藥散証의 合方으로 子宮炎証의 종합 치료방

[審査內容]

1. 傷病名 : 急慢性 子宮內膜炎(實症)

2. 診斷

實症이라 指摘하였으므로 腹診上 瘀血証을 確認할 수 있으며 按之하면 痛甚의 反應이 나타난다고 思料된다.

3. 症狀

發熱 充血性의 下腹疼痛, 膿瘍性의 帶下가 있고 惡臭가 나며 尿意가 頻數하고 排尿痛이 있고 腰部와 腸이 緊張된다.

4. 治療法

白芍藥, 桂枝, 白茯苓, 牧丹皮, 桃仁, 當歸, 川芎, 白朮, 澤瀉, 瓜婁仁, 大黃 各 3.75g

5. 應用 : 筋腫에는 鱉甲 3.75g, 唐木香, 檳榔 各 1.875g을 可用한다.

6. 用法 : 水煎하며 1日 3回 空服에 服用한다.

7. 藥理

本方은 『金匱要略』에 所載한 桂枝茯苓丸, 大黃牧丹皮湯, 當歸芍藥散의 合方으로 當歸芍藥散을 除外한 2方은 모두 實證性의 瘀血治療專門方劑이다. 따라서 本方은 瘀血, 破瘀, 消炎의 效能이 있다.

[審査 評價]

實症 및 瘀血証을 나타내는 急性 子宮 및 그 附屬器의 炎症에는 病變의 腫瘤에 相關없이 廣範하게 活用할 수 있다.

9. 子宮內膜炎(帶下方文) 治療法

△ 提出者 : 부산 중구 염한의원 염 홍 무

1. 傷病名 : 子宮內膜炎(帶下方文)
2. 主要症狀 : 下腹左方觸塊, 刺痛, 引痛, 腰痛, 肥滿, 年少女人帶下症
3. 治療實績 : 多濕 肥滿하고 體力 强健한 젊은 婦人들에게 治驗한 例는 約 3百 餘件에 達함
4. 效能效果 : 肉類와 過勞를 避하여 服用한 患者의 約 95%.
5. 副作用, 禁忌 : 久病, 虛弱者, 中年以上의 瘦弱婦女 或 泄痢者
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 蓮子肉去心 1斤, 五倍子炒 10兩, 桃仁去尖 8兩 以上 3味 作丸
7. 加減活用 : 製粉機에서 나온 粉末을 바로 製丸機에 넣어 作丸을 하거나 蜂蜜을 1斤 程度 넣어도 可함
8. 服用方法 : 梧子大爲丸. 空心 5~10丸 溫水呑下
9. 學術的 根據 : 子宮에 瘀血 또는 溫熱을 除去하고 固攝과 收斂과 排泄을 兼한 處方으로 볼 수 있음
10. 秘藏된 來歷 : 언제부터인지는 모르나 祖上代代로 물려내려온 方文으로서 家門 널리 써왔고 또 治驗과 治效로서 至今에 이르러서도 作成者는 愛用하고 있음

[審査內容]

1. 傷病名 : 子宮內膜炎(帶下)
2. 診斷

   四診 및 內診에 의해 診斷하며 경우에 따라서는 Smear method 또는 Kolpaskopie를 兼行한다.
3. 症狀

   下腹左側에서 堅塊를 触知할 수 있고 刺痛 또는 引痛을 느끼고 腰痛

이 있다. 특히 肥滿人 年少者의 帶下症에 用한다.

4. 治療法

蓮肉(去心) 600g, 五倍子(炒) 400g, 桃仁(去心) 320g

5. 應用

主로 多濕한 肥滿體質, 體質이 强健한 젊은 婦人들의 子宮內膜炎(帶下)에 應用된다.

6. 用法

粉末하여 藥만으로 製丸을 하거나 製丸이 안 될 때는 練蜜 600g을 配合하여 製丸한다. 梧子大의 丸藥을 每回 5~10丸씩 1日 2回 空心에 濕水로 呑下한다.

7. 藥理

本方은 健脾하는 蓮肉, 收斂하는 五倍子, 破瘀하는 桃仁, 3味로 構成되었다.

8. 禁忌, 副作用

肉類와 過勞를 避하고 久病 및 虛弱者, 中年 以上의 瘦弱婦人 또는 泄痢者는 服用을 禁한다.

[審査 評價]

1. 本方은 方劑構成이 比較的 簡單하면서도 急性 또는 實證性의 子宮內膜炎 또는 帶下症에 適應할 수 있도록 成方되었다고 思料된다.
2. 本方은 多濕한 肥滿人, 體力이 强健한 젊은 婦人에게 應用함이 效果的이다.
3. 久病, 虛弱者 또는 中年 以上의 瘦弱者, 泄痢者의 경우는 活用할 수 없다.

10. 經行腹痛, 不孕, 中風治療法

△ 提出者 : 서울 성동 金星漢醫院 金 長 烈

가. 癰疽諸般惡瘡神效

內消散 : 知母, 貝母, 天花粉, 白芨, 半夏, 穿山甲, 皂角刺, 乳香 各 1錢

나. 行經後 腹痛 及 無子婦人孕胎法

1) 處方 : 六合丸 - 便香附酒炒 8刃, 乾干炮, 白芍藥, 當歸, 川芎 各 3刃, 玄胡索, 逢朮, 肉桂 各 1刃, 細末醋糊丸, 梧子大而空心 18~19丸式 1日 2次 服之

2) 應用 : 寒熱則加 黃芩, 腰痛則加 牛膝

다. 中風治療法

1) 主要症狀 : 右半身不遂 屬氣虛及濕疼

2) 處方 : 祛風除濕湯 - 白朮 2錢, 白茯苓, 當歸酒洗, 陳皮, 赤芍藥, 半夏, 烏藥, 蒼朮, 枳殼, 羌活, 黃連酒洗, 黃芩酒洗 各 1錢, 人蔘, 川芎, 桔梗, 防風 各 8分, 白芷 7分, 炙甘草 5分, 干 5片

라. 中風治法

1) 症狀 : 左半身不遂屬血虛死血

2) 處方 : 加減潤燥湯 - 白芍藥酒炒 2錢, 當歸 2錢, 白茯苓, 白朮, 南星, 半夏, 天麻 各 1錢, 生地黃酒炒, 乾地黃炒, 陳皮塩水炒, 牛膝酒洗, 酸棗仁炒, 黃芩 各 8分, 黃柏酒炒 3分, 炙甘草 4分, 紅花酒洗, 薄荷 各 6分, 防風, 羌活, 桃仁 各 6分

[審査內容]

1. 傷病名 : 經行腹痛
2. 診斷

四診에 의해 確認하고 機質性의 경우는 病變의 種類를 判別해야 한다.

3. 症狀

月經期의 下腹痛을 말하는데 經前, 經中, 經後의 腹痛으로 分類한다.

4. 治療法

使香附(酒炒) 320g, 乾干(炮), 白芍藥, 當歸, 川芎 各 120g, 玄胡索, 蓬朮, 肉桂 各 40g

5. 應用

發表者는 行經後腹痛 및 無子婦人의 孕胎에 適한다 하였는데 擦컨대 本方(六合湯)은 氣滯, 血凝으로 因한 經行腹痛에는 廣範하게 應用될 수 있으리라 思料되며 氣滯, 血凝으로 因한 卵管閉塞 등에도 活用할 수 있으리라 思料된다. 但, 寒熱이 있으면 黃芩을 加하고 腰痛이 있으면 牛膝을 加한다.

6. 用法

細末하며 醋糊로 梧子大의 丸을 만들어 每回 18~19丸씩 1日 2回 空心에 服用한다.

7. 藥理

補血, 行氣, 逐寒, 破積의 效能이 있다고 思料된다.

8. 禁忌, 副作用

別로 없음

[審査 評價]

1. 本方은 經後腹痛 뿐만 아니라 氣滯, 血凝에 의한 月經痛 및 月經不利에는 廣範하게 活用할 수 있는 것으로 思料된다.

2. 無子婦人은 孕胎할 수 있다 하였으나 그 機轉 및 效果에 對해서는 確實한 根據의 提示가 要求된다 하겠다.

11. 神經痛, 丹毒, 中風 및 枇杷 治療法

△ 提出者 : 경남 울주군 朴漢醫院 朴 祥 根

1. 神經痛

關節炎에 특히 痛症 關節腫病에 濕布方法 감자 濕布가 濕布는 如何한 痛症에도 有效. 腹痛肋膜炎 其他一切, 疾痛有效(馬鈴薯)

*用法 - 감자는 皮 그대로 강판에 갈아서 물기를 조금 짜버리고 同量의 小麥粉(밀가루)와 濕合. 반죽을 조금 단단케 하여(녹게하지 말 것) 患部에 부칠 수 있는 크기의 布에 2分 두께로 펴서 그 위에 엷은 천이나 白紙를 덮어서 患部에 부치며, 다음에 엷은 비니루로 마르지 않게 싸둔다. 寒冷한 것이 싫으면 濕하게 하여 濕布하되 慢性病은 濕하게 하고 急性病은 冷한 것이 좋다.

2. 丹毒에 特效한 鰌(미꾸라지) 濕布法

前記 감자 濕布로 濕하지 않게 하여 治癒될 수 있는 것은 이 鰌濕布로서 有效하며 特히 赤色 腫痛丹毒, 手指瘭疽, 關節炎, 面疔, 無名腫淋巴腺炎 顎下腺腫痛, 乳腫, 打撲痛, 捻挫, 骨折 等으로 腫痛에도 止痛消腫됨

*用法 - 미꾸라지를 數匹 求하여 刀로서 裂하여 骨을 버리고 外皮部分으로 腫處에 붙인다. 當處에 熱이 많으므로 鰌魚가 잘 乾燥하나 乾燥하기 前에 갈아 붙인다. 乾燥하면 잘 뜯어지지 않아 困難하다. 붙일 場所가 넓을 時는 2, 3마리씩 실로 엮어서 흐르지 않게 붙인다.

3. 中風

卒中 以後에 民間藥으로서 柿澁(뜷은 감즙)과 蘿蔔根汁 服用.

柿澁은 가을 前에 뜷은 감汁을 짜서 保管하는데 옛날에는 藥甫나 投網 만드는 분들이 網에 塗하느라고 準備하지만 至今은 求하기 難함

*服法 -柿汁 1勺, 生蘿葍根汁(무우汁) 1勺 合하여 1日 2回~3回 空服 7日間 服用後 7日間 休藥. 又7日服後 7日休藥 반복함. 계속 복용해도 무방함. 柿汁으로 治療한 中風은 再發이 없다고 함

4. 枇杷葉療法

이 療法은 萬病에 有效하다 함. 各 家庭療法으로 권장함. 生枇杷葉에는 靑酸이란 毒藥成分이 含有한다고 함.

適應症은 萬病에 有效. 肋膜炎, 小兒麻痺로서 步行不能兒, 腹膜炎, 肺結核, 小兒 夜尿症, 카리에쓰 瘰癧, 流走痰腫, 膿瘍破와 其他 各病速效

*用法 - 枇杷靑葉中厚葉을 갈여(古藥) 布片으로 닦는다.(水洗치 말 것) 光澤이 있는 部分을 火로 조금 구어서(炙) 2枚 合쳐서 10회 정도 부빈다. 이것을 1枚式 兩手로 갈어 患處에 대어 조금 눌여서 문지른다. 10회 정도 문지른 後에 他處에 옮겨 10회 정도 문지른다. 腹部면 6, 7分 程度 腹部 全體를 문지른다. 腹部, 背部 등 全體를 차례로 하되 腹部에만 大葉 쯤 使用됨. 使用時 마다 葉을 合하여 조금 炙하여 문지른다. 葉中에 있는 靑酸成分이 조금 炙함으로서 外部로 出한다고 한다. 癌患者에게도 有效 云云함

※ 枇杷葉은 庭園樹로 栽培함

[審査內容]

1. 傷病名 : 神經痛
2. 診斷 : 問診 및 壓診 등에 의해 疼痛의 局在를 確認하고 疼痛의 性質을 鑑別한다.
3. 症狀 : 主로 關節部의 疼痛, 류마티스性 疼痛, 肋間神經痛, 肋膜炎으로 因한 脇痛 등을 말한다.
4. 治療法 : 馬鈴薯(감자)를 利用한 溫濕布法이다.
5. 應用 : 一切의 神經痛에 應用하며 특히 關節炎, 肋膜炎, 肋間神經痛, 關節류마티즘 등에 外用劑로 適用한다.
6. 用法 : 감자(馬鈴薯)를 깨끗하게 닦되 去皮하지 않은 채로 강판에 갈

아서 물기를 조금 짜 버린 다음 同量의 小麥粉(밀가루)와 濕合하여 단단하게 반죽을 한다. 이것을 患部에 부칠 수 있는 크기의 가제에 5㎜정도의 두께로 고르게 펴서 患部에 가제 1枚 혹은 엷은 白紙 1枚를 놓은 다음 그 위에 붙이고 다시 엷은 비닐을 덮어 乾燥를 防止한다. 大體로 慢性病은 溫濕布를 하고 急性 혹은 局所에 熱感이 있으면 冷濕布를 施行한다.

7. 藥理

小麥의 主除客熱劑와 馬鈴薯의 溫和鎭痛藥으로써 各種 疼痛 및 急迫症狀에 緩解作用을 한다.

6. 禁忌

外用劑이며 毒劇藥이 아님으로 특별한 禁忌는 없을 것으로 思料된다.

[評價]

內服藥과 同時에 外用劑를 兼用하면 治效가 迅速할 것으로 思料되며 鎭痛, 消炎,緩和作用의 效果가 있을 것으로 기대된다.

※ 丹毒 治療法

1. 傷病名 : 丹毒
2. 診斷 : 連鎖狀의 丹毒에 의한 眞皮膚急性炎症이다. 視診에 의해 確認할 수 있으며 其他 膿皮症에 屬하는 病變과의 鑑別을 要한다.
3. 症狀

惡寒, 高熱 등의 全身症狀이 있으며 赤色 腫痛을 發한다.

4. 治療法

鰌(미꾸라지)를 利用한 濕布法을 行한다.

5. 應用

鰌濕布法은 馬鈴薯濕布로서 效果가 微弱하거나 無效한 丹毒, 手指瘭疽, 急性關節炎, 面疔, 淋巴腺炎, 顎下腺腫, 乳腫, 打撲痛, 捻挫痛, 骨折 등 主로 表在性의 急性 腫痛에 有效하다.

6. 用法

미꾸라지를 칼로 쪼개서 뼈를 除去한 후 넓게 벌려서 外皮部分으로 腫處에 붙인다. 當處에 熱이 많아 鰌魚가 잘 乾燥하며 乾燥하면 잘 뜯어지지 않으므로 乾燥하기 前에 새 것으로 갈아붙인다. 腫處가 넓을 경우는 2~3마리씩 실로 엮어서 흘러내리지 않게 붙인다.

7. 藥理

外用時에 文獻的으로는 能益氣 解酒毒 消渴緩胃하는 作用을 하나 內服時의 藥理이며 詳細한 藥理는 알 수 없으나 古來로 民間에서 使用되고 있는 点으로 미루어 鎭痛, 消炎, 除毒, 散瘀의 效能이 있는 것으로 推測된다.

8. 禁忌

없음

[評價]

內服藥과 兼用하면 一切의 表在性 腫痛에 有效할 것으로 思料된다.

※ 中風 治療法

1. 傷病名 : 中風(卒中風)
2. 診斷

中風은 腦出血, 軟化症, 栓塞症 등에 의한 一切의 神經痲痺 및 感覺運動障害를 가리킨다.

3. 症狀

前驅症으로는 高血壓, 動脈硬化 등을 隨伴하는 일이 많다. 일단 卒中後에는 半身痲痺 또는 口眼喎斜, 言語障害를 남기며 甚하면 意識不明 또는 死亡에 이르기도 한다.

4. 治療法

柿澁과 蘿蔔根汁을 服用한다.

5. 應用

一切의 中風에 應用한다.

6. 用法

柿汁(뜷은 감즙) 10cc를 合하여 1日 2~3回씩 空心에 服用한다. 服用法은 7日間 服用하고 7日間 休藥을 反復한다. 단, 계속 服用하여도 無防하다.

7. 藥理

柿澁의 主成分은 主로 탄닌酸으로 收斂이 강하고 蘿蔔의 主成分은 주로 디아즈 타제로 火痰, 消積, 淸熱의 效能이 있으나 어떠한 機轉에 의해 中風에 有效한지 는 알 수 없다.

8. 禁忌

柿澁의 收斂性이 便秘를 惡하지 않을까 하는 憂慮가 있으나 特別한 禁忌 및 副作用은 없을 것으로 思料된다.

[評價]

民間에서 卒中後에 多用되고 있으므로 活用해 볼 必要는 있을 것으로 認定되나 效果의 確實性은 알 수 없다.

※ 枇杷葉療法

1. 適應症

肋膜炎, 小兒痲痺, 腹膜炎, 肺結核, 小兒夜尿症, 카리에스, 瘰癧, 走馬痰腫, 膿瘍 및 其他 各病에 應用한다.

2. 用法

枇杷나무의 靑色 厚葉을 깨끗한 헝겊(布片)으로 깨끗하게 닦아서 光澤이 있는 部分을 불(火)에 조금 구어서(炙) 2枚를 合쳐서 10回 程度 비벼서 이것을 兩手에 갈라 대고 患處를 문지른다. 문지를 때는 약간 놀러서 문지르고 同一 部分에는 約 10회 정도 문지른 後에 他處로 옮긴다. 腹部면 6, 7分 程度에 걸쳐 全腹部을 문지를 수 있다. 이와 같이 하여 患處 全身을 차례로 문지른다. 使用時에는 반드시 불에 구어서 사용한다.

3. 藥理

枇杷葉에는 靑酸이 含有되어있다고 하며 使用時에 炙하는 것은 葉中

의 靑酸이 滲出하여 皮膚에 摩擦할 때 皮膚에 쉽게 浸透케 하기 위해서라 한다.

[評價]

本 枇杷葉療法은 靑酸의 治病效果라 思料되며 靑酸은 毒劇藥으로 過量을 使用하면 死亡하는 것이나 適量을 使用하면 防腐, 鎭痛, 祛痰의 效能이 있는 것으로 一切의 炎症 및 疼痛에 外用法으로 應用하는 것은 無防하리라 思料된다. 本 療法이 癌腫에도 有效하다하니 追試의 價値가 있다 생각된다.

12. 腎虛耳聾, 眼白苔, 臍狀動悸, 內痔出血 治療法

△ 提出者 : 京畿 水原 東南漢醫院 金 在 鳳

1. 상병명 : 腎虛因右耳聾

・加味六味地黃湯

熟地黃 4錢(15.0g), 山藥, 山茱萸 各 2錢(7.5g), 白茯苓, 牧丹皮, 澤瀉 各 1錢半(5.625g) 加 枸杞子, 天麻, 元防風 各 2錢(7.5g), 甘菊, 蔓荊子 各 1錢半(5.625g)

・ 食後 3시간후 服用. 1일 2첩 再湯까지 3回 服用.

・ 約 1齊 完治 (約 17年前 經驗妙方)

2. 상병명 : 眼白苔

(內服) 乾地黃 3錢(11.25g), 當歸身, 白芍藥, 川芎 2錢半(9.375g), 榛皮 2錢(7.5g) 大黃 1錢半(5.625g)

1日 2貼 再湯까지 3회 服用

・榛皮 = 물푸리나무皮

・食後 1時間半 10貼 完治(外用) 兼 態膽眞品 少量을 溫水에 풀어서 세 방울씩 1日 2回 程度眼入 有效(約 17년전 經驗妙方)

3. 臍狀動悸

元柴胡 3錢(11.25g), 白茯苓, 桂枝 各 2錢半(9.375g), 半夏, 黃芪 各 3錢(7.5g), 黃芩 3錢(11.25g), 龍骨末, 牡蠣分 各 1錢半(5.625g), 大黃 1錢(3.75g), 葛根 2錢(7.5g)

・1日 2貼. 食後 2時間半. 約 1제 정도 복용완치(約 17年전 經驗妙方)

4. 內痔出血, 腸出血

白礬 1兩 細末 37.50g, 石雄黃 5錢 細末 混合하여 少量式 1日 3回 食後 2時 間半服用(兼用) 一葉草 8錢 ~1兩式 煎服

・一葉草는 岩틈에 나는 풀
・食後 3時間半 1일 2회
・ 約 10일間 服用 完治(約 17년전 經驗妙方)

[審査內容]

1. 傷病名 : 耳聾症
2. 診斷 : 四診에 依헤 確診한다.
3. 症狀 : 耳聾은 귀머거리를 말한다.
4. 治療法 : 熟地黃 15.0g, 山藥, 山茱萸 各 7.5g, 白茯苓, 天麻, 元防風 各 7.5g, 甘菊, 蔓荊子 各 5.625g
5. 應用 : 耳는 胃經에 屬하므로 대개의 耳聾은 腎虛에 原因이 있으며 本方 또한 腎虛症에 應用하는 六味地黃湯을 主劑로 하고 있다.
6. 用法 : 水煎하여 1日 3回씩 食後에 眼用하며 約 1제면 有效하다.
7. 藥理 : 本方은 滋腎, 補陰하는 六味地黃湯에 祛風, 通脉, 開竅하는 藥과 藥力을 上으로 引導하는 藥을 配合한 方劑이다.
8. 禁忌 : 氣虛者, 男弱者는 效用이 없을 것으로 본다.

[評價]

腎虛에 機能性의 耳聾症에는 有效할 것으로 思料된다.

※ 眼白苔 治療法

1. 傷病名 : 眼白苔
2. 診斷

   眼白苔라 함은 瞳孔에 白色 混濁物이 增殖하여 視力에 障害를 招來하는 角膜 水晶體 硝子體의 病度를 絲稱하는 것이 아닌가 思料된다.
3. 症狀

   瞳孔에 白色 混濁物이 增殖하여 눈이 부시거나 視力에 障害가 온다.
4. 治療法

   ① 內服藥 : 乾地黃 11.25g, 當歸身, 白芍藥, 川芎 各 9.375g, 椿皮 7.5g,

大黃 5.625g

② 外用 : 熊膽 点眼法

5. 應用

一切의 眼球混濁 및 白苔에 應用한다.

6. 用法 : 內服藥은 水煎하여 1日 3回씩 食後 1時間에 服用한다.

外用藥은 內服藥과 兼하여 熊膽 眞品을 少量씩 溫水에 풀어서 1回 3방울씩 1日 2回 点眼한다.

7. 藥理 : ① 內服藥은 補血, 補肝하는 四物湯에서 熟地黃을 乾地黃으로 代하고 消炎, 收斂하는 榛皮(물푸레나무皮)와 淸熱, 散瘀하는 大黃을 加한 方劑이고

② 熊膽은 淸熱, 消 破結의 效能이 있다.

8. 禁忌 : 熊膽은 点眼하는 것이므로 雜物이나 異物이 混合되지 않은 眞品을 選定하여 用하여야 한다.

[評價]

眼病은 大部分 肝熱과 血虛에 起因하므로 補血, 補肝하는 四物湯에 消炎, 收斂하는 陳皮와 淸熱散瘀하는 大黃을 加味한 本方은 一切의 眼病에 有效할 것으로 思料되며 熊膽은 그 淸熱散瘀, 破結하는 效能으로 眼病에 多用되고 있다.

※ 內痔出血 治療法

1. 傷病名 : 內痔出血
2. 診斷 : 內痔는 直腸內에 靜脈瘤가 形成되어 炎症을 일으킨 것으로 이것이 破裂하면 便血을 일으킨다.
3. 症狀 : 後重感, 排便痛, 大便不利의 症狀이 있고, 때로 大便時에 大出血을 일으킨다.
4. 治療法 : 白礬(細末) 37.5g, 石雄黃(細末) 18.75g, 一葉草 30.0g~37.5g
5. 應用 : 內痔 및 直腸出血에 用한다.
6. 用法 : ① 白礬, 石雄黃 細末은 1日 3回 食後 2時間半에 少量씩 服用

하고 ② 一葉草는 水煎하여 1日 2回 食後 3時間半에 服用한다.

7. 藥理 : ① 白礬은 黃酸알미늄, 칼륨 등을 含有하고 殺蟲, 解毒, 鎭痛, 消炎, 收斂 등의 效能이 있어 主로 惡瘡, 瘰癧 및 其他 外科疾患에 外用藥으로 使用함이 常例이나 內服時에는 石雄黃에 毒劇性分인 三硫化, 砒素가 含有되어 있으므로 常用量인 0.7~2g을 超過하여서는 안될 것이다.

8. 禁忌 : 石雄黃의 常用品을 超過치 않도록 함이 重要하다.

[評價]

1. 白礬, 石雄黃은 多少의 有毒成分이 있기는 하나 常用量을 準守하면 그 消炎, 收攝, 解毒, 殺蟲의 效能으로 內痔로 因한 硬結을 軟化하고 消炎, 止血의 效果가 있을 것으로 期待된다.

2. 뿐만 아니라 白礬은 除酸, 生肌의 效能이 있으므로 一切의 胃腸潰瘍이나 胃腸 出血에도 有效한 것으로 思料된다.

3. 本方은 油脂에 混合하여 膏藥을 만들면 外用劑로 一切의 惡瘡에도 使用할 수 있다.

13. 打撲 肋膜炎, 蟲垂炎 治療法

△ 提出者 : 江原 横成　天一漢醫院　李　秉　允

1. 肋膜炎

(現　症) 脇痛, 咳嗽時도 刺甚痛, 喘息, 發熱 或 全身倦怠, 咳嗽

(處方名) 加味培增芎夏湯(十中 七～八 有效)

川芎 7.5g, 半夏 7.5g, 赤茯苓 7.5g, 陳皮 3.75g, 靑皮 2g, 枳殼 3g, 白朮 8g, 甘草 3g, 香附子 3.75g, 杏仁 2g, 玄胡索 3g, 金銀花 6～8g,

喘或甚時 加 蘇子 6g, 咳甚 杏仁 3.75g, 氣實 枳殼 3.75g

2. 蟲垂炎 及 盲腸炎

(現　症) 腹痛, 胃腸症狀, 通例發熱 或 惡心, 嘔吐, 惡寒戰慄, 疼痛激甚或 盲腸部 甚痛

(處方名) 加減淸腸湯(十中 七～八 有效)

金銀花 18.75g, 當歸 10g, 玄蔘 3.75g, 地楡 3.75g, 麥門冬 3.75g, 薏苡仁 3g, 黃芩 3g, 甘草 3.75g 或(加減) 牧丹皮 3g, 桃仁 2g, 白芷 3g, 白茯苓 3.75g

3. 打撲으로 胸腹 脇痛

(現　症) 上同 氣血凝結

(處方名) 加味順氣活血湯(十中九 完癒)

香附子 9.375g, 烏藥 3.75g, 當歸 5.685g, 赤芍藥 7.5g, 陳皮 3.75g, 桂皮 3g, 桃仁 2g, 唐木香 3g, 甘草 3.75g

年令에 따라 隨症 適宜 加減할 것

[審査內容]

1. 傷病名 : 打撲傷
2. 診斷 : 여기에서의 打撲傷은 體表部의 傷處를 말함이 아니고 打撲 및 跌사 損傷으로 비록 外部에 傷處는 없으나 內로 氣血이 凝結하여 所謂 멍이 든 狀態를 말한다.
3. 症狀 : 打撲損傷에 依해 內로 氣血이 凝結하면 胞腹脹痛, 脇痛, 背痛, 大便不通, 昏暈, 氣短喘悶, 四肢 및 全身不能屬伸을 症狀을 招來할 수 있다.
4. 治療法 : 香附子 9.375g, 烏藥 3.75g, 當歸 5.68g, 赤芍藥 7.5g, 陳皮 3.75g, 桂皮 3g, 桃仁 2g, 唐木香 3g, 甘草 3.75g
5. 應用 : 一切의 打撲損傷으로 氣血이 凝結한 경우 年令 및 症狀에 따라 隨症加減 하여 用한다.
6. 用法 : 水煎하여 1日 3回 空心에 服用한다.
7. 藥理 : 上方(順氣活血湯)은 順氣劑와 活血劑가 고루 配合되었으나 順氣에 重點을 둔 方劑라 할 수 있다.
8. 禁忌 : 別無할 것으로 思料된다.

[評價]

打撲損傷에 依한 瘀血은 血病이나 上方은 直接 逐瘀의 方法을 用하지 않고 順氣시킴으로서 活血을 圖謀한 方劑로서 氣順性緩하므로 小兒, 婦女, 老弱者의 外傷에도 부담없이 活用할 수 있으리라 생각된다. 『內經』에 말한 血送氣 血送血의 理致에 充實한 良方이라 思料된다.

14. 走馬痰, 神經痛, 白帶下, 赤白痢 治療法

△ 提出者 : 慶北 尙州 慶州漢醫院 박 윤 호

1. 治 走馬痰

內腫神方 屢試 百中 (祖父任의 傳受)

石灰 3~4次 水飛 醋炒細末 7.5g, 白芥子炒硏末 1.875g 以上 2種을 作2包하여 淡酒에 日 再服(朝夕)

- 未膿者는 1日 1包, 已膿者는 1日 2包式
- 未膿者 10包, 已膿者 20包限이나 以差爲度할 것(石灰는 慶北 聞慶石灰가 第1好品)
- 此藥을 服用中 雄倭鷄一首弔死去腸하고 土硫黃 1斤 넣고 堅傳하야 烹食하면 尤好

2. 治 痰痛神方(神經痛) (祖父任의 傳受)

草烏 9.375g, 骨痰草 7.5g, 牛膝, 貝母, 知母, 黃柏, 甘草 2.625g, 右干汁 糊丸 平豆大 每 5個式 和酒下하되 몸에 藥의 反應이 없을 때는 1丸 ~ 2丸 程度 加하여도 可

3. 治 白帶下症

海螵蛸 去殼 4兩 水飛作末하여 두고 每空心服으로 大薊 47.50g을 煎해서 此藥 水에 1日 3回로 每 7.5g式 調服 屢試屢効如神

4. 治 赤白痢 神方(屢試屢驗) 祖父任에게 傳受

樗根白皮(小白皮) 33.70g, 地楡 18.75g, 御米殼(鴛米殼) 15.0g, 檳榔, 肉豆久, 甘草 各 3.75g

- 治 吐血, 血刃血, 咳唾痰血(咳血), 咳血

蘿蔔을 取汁하여 塩을 少許 調服하면 卽止如神

[審査內容]

1. 傷病名 : 走馬痰
2. 診斷 : 走馬痰은 急發性 筋炎을 말한다.
3. 症狀 : 高熱과 脫力感이 主症狀이고 侵犯된 全身의 筋肉이 疼痛하고
4. 治療法 : 石灰(3, 4次水 醋炒細末 7.5g), 白芥子(炒硏末) 1.875g을 2包로 作包한다.
5. 應用 : 走馬痰腫 및 內腫에 用한다.
6. 用法 : ① 未膿者는 1日 1包, 已膿者는 1日 2包를 淡酒에 服用한다.
   ② 未膿者는 10包, 已膿者는 20包면 大槪 治癒되나 不治時는 完治될 때까지 服用한다.
   ③ 上記 藥을 服用中에 雄倭鷄 一首를 弔死하여 去腸하고 土硫黃 600g을 넣고 堅縛하여 烹熟하여 服用하면 尤好하다.
7. 藥理 : 石灰는 性이 寒하고 白芥子는 辛熱하며 石灰는 淸熱, 破結, 軟堅의 힘이 强하고 白芥子는 祛痰 作用이 强하여 藥性의 配合은 合理的이라 하겠다. 특히 解毒, 治瘡, 破瘀, 活血하는 硫黃과 健脾 補榮衛하는 雄鷄의 配合服用은 走馬痰에 對한 治療와 脾氣를 補함으로서 脫氣를 防止하는데 有效할 것으로 思料된다.
8. 禁忌 : 石灰는 性이 大寒하므로 普通은 火煅品을 用하는 것이 常例이나 上方에는 生用하는데 特徵이 있다. 石灰는 主로 平素陽經 및 足陽明經의 實火를 瀉하는 作用이 있으므로 實熱이 아닌 경우에는 使用할 수 없다.

[評價]

藥性으로 보아서는 瀉火軟堅, 通脉, 祛解毒, 殺蟲, 排膿의 效能이 認定되므로 追試해 볼 價値가 있다고 思料된다.

※ 痰痛 治療法

1. 傷病名 : 痰痛(神經痛)
2. 診斷 : 四診에 依해 確認한다.

3. 症狀 : 遍身 및 四肢 骨節의 疼痛, 痲痺, 冷感 등의 症狀을 나타낸다.
4. 治療法 : 甘草 9.375g, 龍膽草 7.5g, 牛膝, 貝母, 知母, 黃柏, 甘草 各 2.625g
5. 應用 : 本方의 主劑는 草烏이다. 草烏는 辛熱有毒하므로 風寒濕 등 寒冷性의 一切 神經痛에 應用할 수 있다.
6. 用法 : 上記한 藥材를 混合粉末하여 生干汁을 混入한 풀로 藥豆大의 丸을 만들어 每回 5丸씩 淡酒에 服用한다.
7. 藥理 : 草烏는 通脉, 祛寒濕, 鎭痛의 效能이 있어 一切의 冷寒濕으로 因한 痺痛症에 널리 活用된다. 그 外에 龍膽草, 牛膝로 祛痰, 除濕하고 知母, 黃柏으로 淸熱, 滋陰하고 甘草로 緩和, 解毒한다.
8. 禁忌 : 熱로 因한 神經痛에는 適用할 수 없으며 過量의 服用을 禁

[評價]

寒冷性의 神經痛, 風寒濕에 起因한 遍身 및 關節, 筋肉의 疼痛에 廣範하게 活用할 수 있을 것으로 思料된다.

15. 打撲 隨落 打觸傷 等(附 腦震盪) 治療法

△ 提出者 : 忠南 大田 普康漢醫院 鄭 仁 源

1. 處方 :

活血導痰湯 - 當歸尾, 牛膝, 南星, 獨活 各 2錢 5分, 赤芍藥, 香附子, 烏藥, 蘇木, 穿山甲, 黃土炙細硏末, 皂角刺 各 1錢, 紅花 8分, 桃仁 7分, 桂心 6分, 大黃 酒蒸 3分, 甘草 5分

*入酒1盞煎水에 和童便1盞服 如大便이 5일이상 不通이면 大黃을 入至 2錢, 芒硝 2錢 煎服이면 一服에 卽通이니 次回에는 硝黃을 減半 或少入

2. 治療法 :

重傷者는 1個月間 內에 每日 3回服 以上하되 1貼을 再湯. 再湯時에도 必入酒 必和便. 輕者는 1~2주일 내에 治癒라. 大勢癒 後 길게 調理藥으로 左에 藥入酒를 長服이 好.

* 藥酒方(効 解瘀血, 活血, 健筋骨, 通經絡, 治風疾)

* 處方 : 藥酒方 骨碎補末密水拌蒸(忌鐵) 3錢, 丁香皮細剉 1錢 5分, 紅花, 白芥子硏, 蘇木細切 各 1錢, 石菖蒲切, 甘草切 各 5分, 態膽있으면 入 1~2分上의 藥을 琉璃大甁一升入에 酒에 入하여 우러난 後에 飮酒나 間酒로 隨意量飮하되 安酒(肴)는 生鷄卵 同服하면 尤好이다.

3. 外治 :

急時에 爲按摩, 摩擦 或以手拳으로 輕輕 打下하여 經穴筋脈이 停滯不通인 곳 劇疼處를 流通케 함이니 이것이 震動療法이라 할 수 있다. 又는 筋骨 交入處 凹凸交鉗處 等에는 以拇指로 重壓輾磨를 日日하고 又는 針을 刺하되 不必經穴이고 以手指로 按하여 覺劇疼處를 間日 或

3~5일間式 맞되 患者의 氣力하여 行할 것이요 不可過針이다.

4. 飮食 :

輕傷刺는 如常飮食할 수 있으나 重傷者는 死血이 入肝流入脇腹하여 腹中이 오그라들고 가슴이 막혀 밥을 먹을 수 없고 全身이 결리고 아파 꼼짝을 못하여 運身을 할 수 없어 밥이나 藥水나를 먹을 수 없어 正臥或은 側臥하여 以竹管(파이프) 等으로 깨죽(荏子), 깨米飮을 吸入하여야 한다. (和入 牛乳, 鷄卵 尤好)

5. 腦震盪 :

若以 腦振盪이면 內服藥은 依如前方이고 拳打는 腦에는 避할 것이며 外罨法으로 以將生高鷄하여 毛羽가 留한 것으로 割腹하여 熱氣있는 것으로 곧 罨益于頭腦上하여 冷却되어 식거든 곧 또 냄비 위(銑上)에 다시 더웁게 데워서 다시 찜질하기 反復한다. 이렇게 하면 患者는 골속이 시원하고 氣分이 좋다. 이 效力은 活血治風冷으로 體溫이 保溫回復術이며 破傷風이 除去된다. 次에 鳥雞에 全體骨을 取作末, 自然銅 末과 丸을 하여 酒에 呑下하면 健骨, 繼骨, 合骨이 되므로 好하다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 打撲傷

2. 診斷 : 四診에 依해 確認함

3. 症狀 :

打撲 隨落 등으로 死血이 內에 凝結하면 遍身不能屈伸, 肋通, 腹脹通, 大便不通, 飮食不入 등의 症狀을 發하며 腦震盪을 일으키면 頭重, 眩暈, 眠昏, 精神昏迷 등의 症狀이 나타난다.

4. 治療法 :

① 活血導痰湯 : 當歸尾, 牛膝, 南星, 獨活 各 10g, 赤芍藥, 香附子, 烏藥, 蘇木, 穿山甲(黃工炙, 硏細末), 皂角刺 各 4g, 紅花 3.2g, 桃仁 2.8g, 桂心 2.4g, 大黃(酒蒸) 1.2g, 甘草 2g

② 藥酒方 : 骨碎補(爲末蜜水拌蒸, 忌鐵) 12g, 丁香皮(細剉) 6g, 紅花, 白芥子(研), 蘇木(細切) 各 4g, 石菖蒲(切), 甘草(切) 各 2g, 熊膽 0.4~0.8g

5. 應用 :

隨落, 打撲, 打觸 등에 依한 死血內 全身不能屈伸, 腦震盪 등에 應用하며 萬若 大便이 5日 以上 不適인 경우는 活血導痰湯에 大黃 8g, 芒硝 8g을 加하여 煎服하면 1服用으로 大便이 疏通한다. 大便이 通한 후에는 大黃, 芒硝의 量을 半減한다. 病勢가 好轉된 뒤에는 藥酒方을 隨時로 飮用하여 調理한다.

6. 用法 :

① 活血導痰湯 本方은 重傷初期에 治하는 方劑로서 水煎時에 반드시 酒 1컵을 넣고 服用時에는 반드시 童便 1컵을 섞어서 服用한다. 重傷者는 約 1個月 輕傷者는 1~2週內에 治癒되며 1日 3回씩 服用한다.

② 藥酒方 : 上記한 藥材를 酒1升에 浸漬하여 藥性分이 우러나면 隨時로 服用하되 生鷄卵을 安酒로 하면 좋다.

③ 外治法 : 內痔와 同時에 外治法을 兼行하면 治效가 더욱 迅速하다. 外治法은 一種의 震動療法으로 患處를 手掌으로 가볍게 釘打하는 方法이다. 萬若 患處가 凹凸한 곳은 手拇指로 重壓輾磨하며 或은 疼痛處에는 鍼治를 輕하게 行한다. 이것은 死血이 內에 結滯하여 流通치 못함을 疏通케 하는데 도움이 된다.

④ 腦震盪의 外治法 : 腦震盪이 되었을 경우는 震動療法을 避하고 外罨法을 應用한다. 이것은 일종의 찜질로서 닭의 털을 뽑지 말고 그대로 割腹하여 熱氣가 있는 것으로 頭部에 덮어 씌워서 찜질을 해서 만약 熱氣가 식으면 냄비에 넣어 데워서 다시 찜질을 反復한다. 이것은 腦에 活血, 治風, 保溫의 效果가 있다. 여기에 다시 鳥鷄의 全體骨만을 뽑아 自然銅末과 함께 丸을 지어 酒調服하면 健骨, 合骨의 效果가 있다.

7. 藥理 :

上記한 治法들은 活血, 導痰行氣, 散瘀, 淸熱, 健筋骨, 通絡의 效果를

지닌 合理的인 處方들이다.

8. 禁忌 : 別無

[評價]

活血, 祛瘀, 通脉하는 湯劑와 藥酒 및 外治法의 兼用은 線合的이고 合理的인 臨床運營이라 하겠다.

16. 癮疹 및 盲腸炎 治療法

△ 提出者 : 慶南 三千浦 복양漢醫院 金 洙 瑢

1. 盲腸炎 處方 : 當歸湯 - 當歸 4錢, 金銀花, 蒲公英, 黃芪 各 2錢5分, 甘草 1錢 5分, 牧丹皮, 白芷, 牛膝, 桔梗, 皂角刺 各 1錢, 大黃 2錢
   · 急性 : 2~3貼 以上 · 慢性 : 6~7貼
2. 癮疹治療 特效方
   가. 處方 : 加味四物湯 - 當歸 2錢 5分, 川芎 2錢 5分, 白芍藥酒炒 2錢 5分, 熟美片 2錢 5分, 金銀花 1錢 5分, 連翹 1錢 5分, 白鮮皮 1錢 5分, 蟬退 1錢 5分, 牛蒡子 1錢
   나. 用法 : 皮膚間 血濁으로 四時 發疹者에 病輕者는 1齊, 病重者는 2~3劑 用之. 一般的 飮食中毒으로 發疹者는 淸肌散 2~3貼 用之

[審査內容]

1. 傷病名 : 癮疹
2. 診斷 : 食中毒性인지 血濁症인지의 鑑別이 必要하다.
3. 症狀 : 顆粒狀 또는 片狀의 斑疹이 皮膚에 發疹하고 때로는 瘙痒感
4. 治療法 : 當歸 10g, 川芎 10g, 白芍藥酒 10g, 熟地黃 10g, 金銀花 6g, 連翹 6g, 白鮮皮 6g, 蟬退 6g, 牛蒡子 4g
5. 應用 : 一切의 血虛, 血濁으로 因한 癮疹, Allergy性 皮膚炎
6. 用法 : 水煎하여 1日 3回 空心에 服用한다.
7. 藥理 : 本方은 補血, 淸血하는 四物湯에 祛風除濕熱, 淸肌, 治瘡하는 數種의 藥材를 合한 것이다.
8. 禁忌 : 飮食積滯者는 服用을 禁한다.

[評價]

血虛 및 瘀淸, 濕熱에 依한 癮疹 및 一切 皮膚疾患 有效할 것.

17. 楊梅瘡(梅毒 및 皮膚病 濕疹) 治療法

△ 提出者 : 서울 鐘路區 人齊漢醫院 金 潤 熙

1. 病名 : 楊梅瘡(梅毒 及 皮膚病(濕疹))
2. 症狀 : 梅毒 男女 共히 陰部에 瘙痒症과 瘡症이 됨.
   皮膚病 - 全身瘙痒 及 濕疹瘡症
3. 治療法 : 藥物療法
   處方 : 上帶鹿茸 20.0, 白靈砂 2.0, 黃丹, 石雄黃, 鍾乳粉 各 1.0, 琥珀, 乳香, 枯百合, 血竭, 密佗僧, 靑皮 各 0.7, 甘草 0.5, 土麝香 0.4
   *萬若 唐麝香은 3倍重
   * 重量例 - 2.0=2g, 20.0=20g, 2.0=20g 比率
   上記 處方藥物을 細末하여 糯米糊丸, 綠豆大로 作丸하여 朝夕 食後 1時에 溫水服. 服用分量 - 仁劑 (東子堂), 劑胃散 茶半匙에 4丸-10丸까지 服(1包 分量임)
   ※ 分量은 患者體質과 症狀에 따라서 適當히 加減함
4. 禁忌 : 豬肉, 鷄肉, 酒, 冷水, 性交
5. 注意 : 服藥中에 口疳者는 藥物服用을 中止하고 甘豆湯 或은 豬肉을 차게 식혀서 먹습니다. 皮膚病者는 上記 丸藥을 服用하면서 水銀軟膏를 塗布함
   * 治療期日 : 普通 10日 或은 1個月 ~ 2個月 程度 治療

[審査內容]

1. 傷病名 : 楊梅瘡
2. 診斷 : 楊梅瘡은 3大慢性病 中의 하나로 일컬어지는 梅毒性의 皮膚病 및 結毒瘡腫을 말한다. 그러므로 四診 外에 血淸檢査를 實施하여 梅毒反應을 確認함이 좋다.
3. 症狀 : 梅毒은 感染 後 潛伏期가 길며 初期에 治療하지 않으면 血

行을 타고 全身의 各 臟器 및 組織에 病變을 일으키며 胎兒에게도 體內 感染을 일으킨다.

4. 治療法 : 鹿茸(上帶) 20.0g, 白灵砂 20g, 黃丹, 石雄黃, 鍾乳粉 各 10g, 琥珀, 乳香, 枯白礬, 血竭, 密佗僧, 靑皮 各 0.7g, 甘草 0.5g, 土麝香 0.4g (萬若 土麝香이 없으면 唐麝香 3倍重을 代用한다.)
5. 應用 : 梅毒性의 瘡腫, 發疹, 結毒 및 其他 惡性 皮膚瘙痒, 濕疹, 惡瘡 등에 用한다.
6. 用法 : 上記한 處方藥을 細末하여 糯米糊로 綠豆大의 丸을 만들어 朝夕으로 食後 1時間에 1回 4~10丸까지 服用하며 體質에 따라 適宜 增減한다.

   * 治療期間은 1~2個月이며 完治時까지 繼續 服用한다.
7. 藥理 : 本方은 殺蟲, 解毒, 治瘡腫하는 藥에 鹿茸을 加한 것이 特徵으로 鹿茸은 抗菌性을 增加시켜 身體의 自然治癒를 補助하는데 도움을 주며 麝香은 灵砂, 雄黃密佗僧 등의 藥毒으 緩和하고 通竅하는 作用을 한다.
8. 禁忌 : 本方은 毒劇藥이 많으므로 服用中에 口病이 생기면 服藥을 中止하고 甘豆湯 或은 豬肉을 服用하여 解毒을 시켜야 한다. 特히 服藥量이 過하면 水銀中毒을 招來할 念慮가 있으므로 注意를 要한다. 皮膚 및 體表의 濕疹 및 惡瘡에는 水銀軟膏를 塗布한다.

[評價]

抗生物質이 開發되기 以前에는 梅毒에 水銀 및 上方과 같은 毒劇藥에 依한 驅梅劑가 多用되었으나 近來에는 藥性이 毒하고 그 毒作用이 可恐하여 主로 抗生劑에 依해 治療하는 傾向을 보이고 있다. 그러나 上記한 類의 方藥이 驅梅의 效果는 있으므로 細心한 注意下에 適用하면 어느 程度의 驅梅效果는 있을 것으로 思料된다.

18. 梅毒 治療法

△ 提出者 : 慶南 三千浦 해동漢醫院 金 泰 根

1. 鹿茸散 : 水銀 2刃, 石雄黃 2錢, 硫黃 2錢, 黃腦 5分, 百草霜 2錢(釜底 숯검정), 麝香(雲南産 2錢, 土産 1錢 , 唐産 5分)

＊ 製法 :

① 水銀은 잘 죽이고(硫黃을 넣어서 갈면 잘 죽일 수 있다.) 또 他藥品도 粉末로 갈아서 모두 갈아 섞어서 完全 粉末로 하여 和紙(창호지)를 適當히 잘라펴서 藥쑥을 비비어 종이 위에 놓고 이상 粉末한 藥을 약쑥 위에다 조금씩 놓고 담배를 몰 듯이 몰아 가지고 풀칠을 해가지고 봉한다.

② 담배처럼 말아 놓은 藥品을 患者에게 新聞紙를 고깔 帽子 같은 것을 만들고 머리에 쓰고 말아 놓은 藥에다 불을 붙여 그 연기를 입으로 마시게 하고 코로 내뿜게 한다. 그리고 종종 물을 조금씩 마시게 하여 목을 축이게 하여 모두 약이 타질 때까지 되풀이한다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 梅毒
2. 診斷 : 四診 및 犯病理檢查에 依해 確診한다.
3. 症狀 : 梅毒菌의 侵犯部에 따라 楊梅瘡, 結毒, 癬, 下疳, 槿痃, 便毒등으로 分類한다.
4. 治療法 : 水銀 80g, 石雄黃, 硫黃 各8g, 童腦 2g, 百草霜 2g, 麝香(雲南産 8g, 土産 4g, 唐産 2g)
5. 應用 : 一切 梅毒病에 應用한다.
6. 用法 : ① 水銀과 硫黃을 混合하여 갈아서 죽인 다음 他藥의 粉末과 골고루 混合하여 和紙(창호지)를 적당히 잘라서 펴놓고 그 위에 葉을 비벼서 얇게 펴고 그 위에 上記한 藥을 조금씩 뿌려 卷煙 말 듯이 하

여 풀로 봉한다.

② 담배 모양으로 편 藥卷煙에다가 불을 붙여 患者로 하여금 吸煙하여 그 연기를 코로 내뿜게 한다. 이때 患者의 머리에는 新聞紙로 고깔모양의 帽子를 만들어 씌워서 煙氣를 飮用하여 上疳을 防止한다.

7. 藥理 : 本 治療法의 主劑는 亦是 水銀이나, 水銀은 殺蟲, 驅梅의 效果가 强하나 그 毒性이 또한 猛烈하므로 近來에는 多用하지 않는다.

8. 禁忌 : 水銀으로 因한 毒의 被害가 猛烈하므로 注意를 要하여 中毒症候가 나타나면 速히 解毒指導를 取해야 한다.

[評價]

抗生劑가 나오기 前에는 多用된 驅梅療法이었으나 近來에는 水銀中毒의 副作用 때문에 忌避하는 傾向이 있으나 適切하여 活用하면 驅梅의 效果는 期待할 수 있을 것으로 思料된다.

19. 乾癬, 白禿瘡, 手足水蟲 頭面 牛癬 治療法

△ 提出者 : 慶南 蔚州 朴漢醫院 朴 祥 根

1. 處方 : 石雄黃 1.845g(5分), 枯白礬 1.125g(3分), 大 黃 5.625g(1錢 5分)
   輕 分 1.875g(5分), 巴 豆 0.750g(2分), 信 石 1.125g(3分)
2. 用法 : 上記 各 藥을 合하여 粉末하되 巴豆는 別途로 두고 其外藥을 合粉末하고 巴豆는 單獨으로 잘 갈아서 他藥 粉末과 合해야 함. 但, 巴豆를 去油치 않고 使用함
   使用時는 眞油 2滴 或은 3滴에 藥末 赤豆大쯤 油에 合하여 患處에 문지른다. 2~3분간 塗擦한다. 1日 1回, 3回쯤 用하면 頭面 等 患處에 좁쌀낫 같은 小泡(水泡)가 生할 時는 藥을 中止케 함. 그 後 結痂하여 中毒, 其他가 治癒됨
3. 注意 : 上記 藥은 毒劇藥이 多함으로 慾心내어 過多히 발라서는 안 된다. 乳兒들의 손발이 닿지 않은 곳에 貯藏과 아이들이 빨지 않도록 注意
   ※ 一名 圓型 소매점, 頭部, 기계毒 等에(但 癰疽, 濕疹에는 不用) 新藥 軟膏等에 不治皮膚病 類種에 有效

[審査內容]

1. 傷病名 : 乾癬, 白禿瘡, 手足水蟲, 頭面, 牛癬
2. 診斷 : 上記한 病症들은 大部分 一種의 桿菌性 皮膚疾患이다.
3. 症狀 : 化膿되는 일은 거의 없고 大部分 乾性의 落屑, 脫毛, 瘙痒 등을 主症侯로 하고 慢性의 經過를 보인다.
4. 治療法 : 石雄黃 1.845g, 枯白礬 1.125g, 大黃 5.625g, 輕分 1.875g, 巴豆 0.750g, 信石 1.125g
5. 應用 : 化膿性의 癰疽, 濕性, 滲出性의 皮膚疾患에 通用할 수 있다.
6. 用法 : 上記한 藥을 合하여 粉末로 하되 巴豆는 別途로 갈아서 混合한

다. 使用 時는 眞理 2滴~3滴에 藥末 小量(赤豆大의 量)을 混合하여 患處를 2~3分間 塗擦한다. 1日 1回씩 3回程度 治療하면 患處에 粟粒大의 小泡疹이 生하며 이것이 結痂하여 落屑하면 治癒된다.

7. 藥理 : 本方은 殺菌, 敗毒, 腐蝕의 效能이 있으나 毒性이 强하다.
8. 禁忌 : 毒劇性이 强하므로 1日 1回 以上의 施療 및 過用은 禁하고 服用을 禁한다.

[評價]

乾性의 惡性 皮膚疾患에 外用劑로 效果가 迅速할 것으로 思料되나 毒劇性이므로 過用 및 內服은 禁해야 한다.

20. 不姙症(受胎調節) 治療法

△ 提出者 : 京畿道 楊洲　東昌漢醫院　朴　東　浩

1. 要旨 : 受胎調節方과 人生保健長壽에 弘益되는 早服法을 後面에 記錄하여 參考에 提出함

2. 受胎調節方 凡性交는 夫婦 沐浴淸潔하고 撫戱快感直前에 臥位를 女上男下하고 首尾를 相接하여 尤先女爲 口吮男精하여 與男蚕服하고 男爲舌舐女液하여 男女虛弱한 者가 相互飮服한 則 是謂早服從事라 不性家族計劃을 百分 完遂요 夫婦生活 乾薑에도 最大補藥이라 故로 東西古今識者는 秘此不言也라.

中國 宋時에 朱夫子 早服不爲后悔書에 日此身이 未有衰損而加以儉養하는 것이 是謂 早服而重積德이라

早服者는 早覺未衰而嗇之也라 女某此身은 已衰耗가 如破屋相似하다.

蜼欲修養이나 亦何 能有益耶아 泄精早服이 長生久視道

解說 : 精液을 蚕服하다는 文獻은 『東醫寶鑑』內 景篇 一卷 十七張(項) 攝養要訣 太乙眞人七禁 文日一者는 少言語하여 養內氣하며 二者는 戒色慾 養精氣 三者는 薄滋味養血氣하며 四者는 燕精液養藏氣하며 五者는 莫瞋怒養肝氣하며 六者 美飮食養胃氣하며 七者는 小思慮養心氣하라 此文中 四者는 精液을 삼켜서 藏氣를 기르라 하였고 또 藏氣는 무엇인가 하면 同篇 十二張에 腦爲隨海上丹田은 藏氣之府也하였다.

그런 즉 精液을 삼켜서 上丹田(藏氣) 즉 腦髓를 補養한다는 뜻이 됨 又云 神生於氣, 氣生於精

(朱子書出文은 全秉薰 著 『精神學通編』 上卷 十二張에 記載)

3. 人口調節子副方(『扁鵲心書』 五六張)

婦人이 血旺氣衰則多子하고 氣旺血衰則無子라 若髮黑, 面色光潤하며 肌膚滑澤하며 月液隱毛稀하면 乃氣衰血旺也닌 主多子하고 若髮黃 面無光彩

하며 肌肉이 粗澁하며 月夜隱毛多하면 乃氣旺血衰也라.主無子라 若交合時에 女液이 生至하고 男精이 后衝者는 乃至開衰精也니 主成男하고 若男精이 生至하고 女液이 後來者는 乃精開衰也 主成女라 若男女 精液不齊至者는 不成胎라 함

一貼 服用 則 紝后 第3日이 되나 水約后 60時間內에 交媾하면 主成男也. 其后 姙娠 2個月 約 8週內에 加減他黃湯 12貼을 9日間 空心服用하면 轉女爲男也라 處方調經種玉湯 九烝地黃 香附子炒 各 5.25g, 當歸酒洗, 吳茱萸湯泡, 川芎 各 3.75g, 白芍藥, 白茯苓, 陳皮, 玄胡索, 牧丹皮, 乾薑炒 各 3.0g, 官桂, 艾葉炒黑 各 1.875g, 治婦人 無子往不調 空心服 待經至之日하여 服之하며 間日 一貼 藥盡交媾라 함

4. 處方 : 加減地黃湯 - 九蒸熟地黃 15g, 生山藥, 山茱萸 11.25g, 白芷 7.5g, 白茯苓 3.75g, 香附子 2.25g, 人蔘 1.875g, 紅花 0.375g(1人分) 12貼 經書 2個月 后 日2回 再湯까지 9時間 空心服 則 轉女爲男也라 牟衡奎傳方을 試用効果 有 3人에 有效結論, 上記 諸論은 本人이 開業 40여년간 淺薄한 經驗이나 諸賢께서 硏究할 參考 資料로 提供함

*避姙家族計劃 政府豫算 34億원이라 하며 補藥으로서 鹿茸이 들면 20貼에 14~5萬원이라 하는데 上記 受胎調節方 人口調節子副方을 實踐躬行하면 國家經濟와 保健長壽에 弘益된가 思料 添記함

[審査內容]

1. 傷病名 : 不姙症
2. 診斷 : 臨床上 2年 以上 姙娠이 안되면 不姙이라 한다.
   이 때 우선 基礎體溫 測定에 依해 排卵의 有無를 確認하고 다시 卵管造影을 施行하여 卵管의 疏通與否를 檢査한다.
   排卵과 卵管에 異常이 없을 때는 子宮內膜 檢査를 施行한다.
3. 症狀 : 姙娠이 되지 않는다.
4. 治療法
   1) 處方內容 : 熟地黃(九蒸), 香附子(炒) 各 5.25g, 白芍藥, 白茯苓, 陳

皮, 玄胡索, 牧丹皮, 乾薑(炒) 各 3.0g, 官桂, 艾葉(炒黑) 各 1.875g

5. 應用 : 上記한 處方은 無子 經不調者에게 寬用하는 調經種玉湯으로 日經不調 不姙症에 應用할 수 있다. 但 轉女爲男 또는 男兒를 願할 때는 姙娠 2個月 以內에 下의 處方을 用한다는 古典의 記錄이 있다.

轉女爲男方의 內容 : 熟地黃(九蒸) 15g, 生山藥, 山茱萸 各 11.25g, 白芷 7.5g, 白茯苓 3.75g, 香附子 2.25g, 人蔘 1.875g, 紅花 0.375g

6. 用法

1) 調經種玉湯은 經至日로부터 12貼을 服用하고 交媾하라 하였으니 이 時期는 大體로 排卵期에 該當한다 할 수 있다.

2) 轉女爲男方은 月經后 2個月에 12貼을 作하여 1貼으로 再湯까지 1日 2回 服用하면 轉女爲男이 된다 하였다.

7. 藥理

1) 調經種玉湯은 大體로 補血補氣하는 方劑에 溫宮 遂寒 行氣 消瘀之劑를 加味하여 成方된 것으로 虛寒成의 月經不調에 活用할 수 있을 것으로 思料된다.

2) 轉女爲男方은 基本方劑가 六味地黃湯에서 決薄, 牧丹皮를 去하고 香附子, 人蔘, 紅花를 小加한 것으로 方劑 全體의 效能은 역시 補陰成이 强하다 하겠다.

8. 禁忌, 副作用 : 兩方의 모두 胃弱者는 易滯泄痢의 傾向을 나타낼 수 있을 것이라 思料됨

[審査評價]

1. 調經種玉湯은 一般的으로 不姙症에 널리 寬用되고 있기는 하나 確實하게 排卵을 促進하거나 卵管을 疏通시킬 수 있는지의 與否는 긍정하기 어렵다 思料된다.

2. 轉女爲男方이 古典의 記錄대로 確實한 效力이 있는지는 알 수 없다. 다만 染色體說에 依하면 受精時에 이미 男女의 性差가 確定된다고 하였으니 이에 對한 確固한 反論이 證明되지 않고는 姙娠 2個月后의 轉女爲男이란 語不成說이라 하겠다.

21. 子宮炎 및 癒着胎盤 治療法

△ 提出者 : 忠南 洪城 대발漢醫院 李 義 弼

1. 傷病名 : 子宮炎
2. 主要症狀 : 子宮出血, 子宮內膜炎及 陰部搔痒
3. 治療實績 : 子宮內膜炎 30餘名, 胎盤殘留 20餘名
4. 效能效果 : 子宮炎 70&, 胎盤殘留 90%
5. 副作用, 禁忌 : 酒, 鷄肉, 豚肉
6. 子宮炎 處方內容 : 加味龍膽瀉肝湯

   元防風, 薏苡仁 各 18.75g, 柴胡, 澤瀉, 車前子, 木通, 黃芩, 生地黃 各 1.875g

   常侍 桂枝茯苓湯과 竝用하면 子宮內 痛症에 더욱 有效함

[審査內容]

1. 傷病名 : 子宮炎
2. 診斷 : 四診 및 內診 등에 依해 診斷한다.
3. 症狀 : 寒熱往來 下腹疼痛, 帶下 등의 症狀이 있다.
4. 治療法

   防風, 薏苡仁 各 18.75g, 柴胡, 澤瀉, 草龍膽 各 3.75g, 赤茯苓, 當歸, 梔子, 車前子, 木通, 生地黃 各 1.875g
5. 應用

   上記한 處方은 龍膽瀉肝湯加味方으로 濕熱을 處理하는 代表方이다. 따라서 濕熱이 旺盛한 子宮 및 그 附屬器의 炎症과 尿道 및 膀胱의 炎症에 廣範하게 活用할 수 있으리라 思料된다. 단 瘀血을 兼服한다.
6. 用法 : 水煎하며 1日 3回 空心에 服用한다.
7. 藥理 : 龍膽瀉肝湯은 淸熱, 除濕, 瀉肝, 通利의 效能이 있다.
8. 禁忌, 副作用 : 實熱証이 아닌 者는 服用을 禁함

[審査評價]

1. 本方은 濕熱이 旺盛한 實証性의 帶下 및 陰癢, 陰腫, 陰痛, 尿淋 등 症狀에 廣範하게 活用할 수 있는 方劑이다.
2. 그러나 虛寒性의 子宮炎症에는 服用할 수 없다.

※ 胎盤殘留處方

桂枝茯苓湯 - 牧丹皮 9錢, 赤茯苓 3錢, 桂枝 7錢, 白芍藥 5錢, 桃仁 5錢

左記 藥은 搾피 手術後 子宮出血이 不止하여 瀕死 直前에도 此藥을 5貼이면 卽時 止血이 되며, 此後 補血이면 良好

[審査內容]

1. 傷病名 : 癒着胎盤
2. 診斷 : 四診 및 內診에 依해 確診한다.
3. 症狀 : 子宮收縮이 不全하고 出血이 멎지 않으며 때로는 下腹疼痛이 있다.
4. 治療法 : 桂枝, 牧丹皮, 赤茯苓, 白芍藥, 桃仁 各 9.375g
5. 應用 : 本方은 作丸服用하나 여기서는 水煎하며 1日 3回 空心에 服用
6. 藥理 : 活血, 破瘀, 消積의 效能이 있다.
7. 禁忌, 副作用 : 瘀血證이 아닌 경우는 服用을 禁한다.

[審査評價]

搔爬 및 分娩后에 惡血이나 胎盤片이 殘留하여 腹痛과 出血이 계속될 때 活用할 수 있다.

<침 구 과>

1. 疼痛疾患 治療法

△ 提出者 : 서울 永登浦區 林鐘國漢醫院 林 鐘 國

1. 傷病名 : 疼痛疾患
2. 主要症狀 : 正頭痛, 眉稜骨痛, 漏風痛, 脫紅症
3. 治療實績 : 參考 別紙 "대한 한의학회지" 添加
4. 效能效果 : 鎭痛, 收斂 (機能抗進)
5. 副作用·禁忌 : 貧血症, 低血壓, 姙婦
6. 鍼灸療法 : 合谷穴을 主治穴로 한 鍼灸療法
7. 加減活用 : 학회지 參考 (修治法 또는 技法)
8. 學術的 根據 : 『東醫寶鑑』 鍼灸篇
9. 學術會 등 發表與否 : 第 1回 全國 대한한의학술대회
10. 秘藏된 來歷 : 『東醫寶鑑』에 收錄된 "合谷穴의 臨床的 分類 硏究" (論文內容)

※ 발표지 : 大韓漢醫學會誌 別冊 第 12 卷 第 1 號 通卷 43號 1975年 3月號 大韓漢醫學會 發行

『東醫寶鑑』에 나타난 合谷穴의 臨床的 分類 硏究

一. 序論

韓國의 鍼灸療法의 基礎理論이 西紀 561年(高句麗 平原王 3年)에 中國으로부터 『黃帝內經』이 輸入된 後이며 그 後 散發的으로 들어온 醫書들에

영향을 받아 鍼灸療法으로 定立되었던 것이다.

明代의『醫學綱目』,『醫學入門』,『古今醫鑑』,『萬病回春』,『醫學正傳』과 元代의 『衛生寶鑑』,『得效方』,『東垣十書』,『丹溪心法』, 宋代의 『資生經』, 唐代의 『千金方』, 西晋의 『甲乙經』 등의 醫書로서 우리나라에 貢獻했으며 특히 鍼灸應用의 硏究醫書로 活用하여 내려오다가 이들 醫書內容 中 臨床應用 가치가 豊富한 治療法들을 拔萃하여『東醫寶鑑』中 鍼灸篇을 西紀 1613年 集成하였던 것이다.

이와 같은 『東醫寶鑑』은 西紀 1596年(宣祖 29年)까지 輸入된 醫書들中에서 臨床的 價値와 考證的 資料를 뒷받침할 수 있게끔 하여 西紀 1613年(光海君 5年)에 太醫 許浚 先生이 完成하였으며 鍼灸篇을

※ 1974年 6號 漢方春秋誌 要旨發表

※ 1974年度 漢醫師 補修敎育 敎材

包含한 綜合臨床醫書의 決定版인 것이다.

一般的으로 鍼灸療法의 臨床應用에 있어서 主治穴과 補助穴의 治療經穴로 區分된다. 그러나 經穴의 應用選擇方法과 運用은 多樣性을 지니고 있다고 認定된다.

이와 같은 見地에서 鍼灸療法에 있어서 合谷穴을 主治穴로 한 施術의 共同見解 造成을 위해서 臨床的으로 使用頻度가 높은 合谷穴이 『東醫寶鑑』 內容上에 나타난 31種 疾患(症勢別)에 多角度로 運用되고 있어 이에 基礎를 삼아 많은 臨床醫들이 여러 疾患에 主治穴로 愛用하고 있어 이에 著者는 合谷穴과 이에 따르는 補助穴을 臨床的 應用으로 比較觀察하여 合谷穴이 各 疾患治療에 優秀한 效果를 나타내었기에 이에 報告하는 바이다.

二. 文獻調査

合谷穴이 應用된 疾患(分類, 整理), 『東醫寶鑑』 內容上 各部門에서 合谷穴을 應用하는 31種 疾患

① 衄血의 治療

合谷, 上星, 風府, 啞門, 內庭, 手三里, 照海

② 暴瘖의 治療

合谷, 陽谷, 通谷, 天鼎, 期門, 支溝, 湧泉

③ 不能言語의 治療

合谷, 陽交, 支溝, 期門, 湧泉, 通谷

④ 傷寒不汗出의 治療

合谷, 復溜, 二穴, 瀉法

⑤ 月經閉의 治療

合谷, 三陰交, 中極, 腎俞, 四滿, 足三里

⑥ 裏急後重의 治療

合谷, 外關

⑦ 痢疾의 治療

合谷, 足三里, 陰陵泉, 中脘, 關元, 天極, 神闕, 中極

⑧ 編正頭痛의 治療

合谷, 絲竹空, 風池, 中脘, 解谿, 足三里

⑨ 正頭痛의 治療

合谷, 百會, 上星, 神庭, 太陽

⑩ 眉稜骨痛의 治療

合谷, 攢竹, 神庭, 頭維, 解谿

⑪ 眼睛痛의 治療

合谷, 風府, 風池, 通理, 申脈, 照海, 大敦, 竅陰, 至陰

⑫ 障醫의 治療

合谷, 手三里, 命門, 肝俞, 光明-----灸治

睛明, 四白, 太陽, 百會, 商陽, 厲兌, 光明-----瀉血

⑬ 漏風症의 治療

合谷, 臨泣

⑭ 耳鳴症의 治療

合谷, 耳門, 中渚, 大陵, 液門, 上關, 完骨

⑮ 耳聾症의 治療

合谷, 中渚, 外關, 聽宮, 商陽, 中衝

⑯ 鼻寒 不聞香臭의 治療

合谷, 迎香, 上星, 人中, 風府, 百會, 百勞

⑰ 鼻流臭穢의 治療

合谷, 曲差, 上星, 人中, 迎香

⑱ 口瘡의 治療

合谷, 承漿, 人中, 長强

⑲ 齒痛의 治療

合谷, 風府, 承漿 , 內庭

⑳ 喉開症勢의 治療

合谷, 少商, 尺澤

㉑ 咽喉腫痺의 治療

合谷, 上星, 足三里, 少商

㉒ 五指痛 및 痲痺의 治療

合谷, 陽池, 外關

㉓ 臂膊痛 및 痲痺의 治療

合谷, 肩髃, 手三里, 外關, 肩井, 曲池

㉔ 脫肛의 治療

合谷, 大腸俞, 百會, 長强, 肩井, 氣衝

㉕ 治風八穴

合谷, 風池, 肩髃, 環跳

㉖ 半身不遂의 治療

合谷, 百會, 風池, 環跳, 風市, 三里 (上下) 絶骨 灸

㉗ 口噤의 治療

合谷, 人中, 頰車, 百會, 承漿, 翳風 鍼灸

㉘ 皮膚痲痺의 治療

合谷, 太潤

㉙ 全身 皮膚의 治療

合谷, 曲池, 三里(上下), 絶骨, 行間, 委中

㉚ 催産과 難産 및 下死胎의 應用

合谷(補), 三陰交(瀉), 太衝(補)

㉛ 小兒疳眼의 治療

合谷(灸治)

三. 比較觀察法

1. 合曲穴 單獨 鍼治療 効果와 合谷과 其他穴과의 併用鍼治療効果 및 合谷을 除外한 穴과의 治療効果의 比較

(※ 合谷과 其他併用經穴을 以下 併用이라 稱하고 合谷을 除外한 經穴을 以下 其他 穴이라 稱함)

『東醫寶鑑』에 收錄된 合谷穴을 應用한 31種의 疾患에 對한 임상적 効果를 觀察하기 위하여 各 疾患別 合谷 單獨 鍼治療와 其他 鍼治를 各各 無作爲로 同一한 症例數로 선정한 總 327例 男女 區別없이 快治, 有效認定, 無效로 구분하여 비교 관찰하였다.

2. 觀察期間

1964年 5月 18日～ 1974年 6月 5日 (10年間)

구분 \ 질병	합곡 단독 치료예				합곡 및 기타 경혈병용 치료예				기타 경혈			
	환자수	쾌유	유효인정	무효	환자수	쾌유	유효인정	무효	환자수	쾌유	유효인장	무효
① 衄血	15	10	4	1	15	12	3		15	5	6	4
② 暴瘖	6	3	2	1	6	4	1	1	6	1	4	1
③ 不能言語	20	9	8	3	20	15	3	2	20	5	13	2
④ 傷寒不汗出	5	3	1	1	5	3	1	1	5	1	2	2
⑤ 月經閉	70	37	14	19	70	51	12	7	70	15	50	5
⑥ 裏急後重	10	5	4	1	10	6	3	1	10	4	3	3
⑦ 痢疾	8	4	3	1	8	5	2	1	8	1	5	2
⑧ 偏頭痛	100	65	30	5	100	75	20	5	100	40	55	5
⑨ 正頭痛	80	56	23	1	80	43	34	3	80	30	31	19
⑩ 眉稜骨痛	80	57	19	4	80	44	29	7	80	21	49	10
⑪ 眼睛痛	13	8	3	2	13	5	6	2	13	2	7	4
⑫ 障醫	7	5	1	1	7	4	2	1	7	1	1	5
⑬ 漏風症	50	45	4	1	50	41	8	1	50	10	35	5
⑭ 耳鳴	100	69	27	4	100	72	19	9	100	41	45	14
⑮ 耳聾症	10	4	6		10	6	3	1	10	2	4	4
⑯ 鼻寒・不聞香臭	20	11	5	4	20	16	3	1	20	5	7	8
⑰ 鼻流臭穢	20	10	6	4	20	18		2	20	3	15	2
⑱ 口瘡	5	3	2		5	5			5	2	1	2
⑲ 齒痛	50	37	6	7	50	46	3	1	50	18	20	12
⑳ 喉閉症	30	18	10	2	30	21	8	1	30	7	20	3
㉑ 咽喉腫痺	17	15	2		17	16	1		17	10	2	5
㉒ 五指痛	70	51	12	7	70	64	4	2	70	4	65	1
㉓ 臂膊痛	33	25	3	5	33	23	7	3	33	9	20	4
㉔ 脫肛	17	14	3		17	13	4		17	5	9	3
㉕ 治風	50	41	6	3	50	45	4	1	50	10	35	5
㉖ 半身不遂	70	34	21	15	70	45	10	15	70	15	16	39
㉗ 口噤	9	2	4	3	9	4	3	2	9	2	1	6
㉘ 皮膚痲痺	30	7	20	3	30	9	15	6	30	5	13	12
㉙ 全身皮膚炎	5	2	1	2	5	3	1	1	5	1	1	3
㉚ 催産難産	12		5	7	12	5		7	12			12
㉛ 疳眼	3			3	3		2	1	3		2	1

四. 治癒比較의 効果

合谷穴 單獨 鍼治療時의 効果와 併用鍼治療 및 其他穴 鍼治療 効果를 觀察 比較하였더니 다음과 같았다.

① 衄血治療例 : 衄血 45例中 合谷單獨鍼治療 15例에서 快治 10例, 有效認定 4例, 無效 1例였으며 併用鍼治療는 15例中에서 各各 12例, 3例, 0例였으며 其他穴 鍼治療는 各各 5例, 4例이었고 併用 鍼治療例와 合谷穴 單獨鍼治療例의 完快 數가 各各 12例와 10例로 近少한 差異였으며 其他 鍼治療 5例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

② 暴瘖治療例 : 暴瘖症 18例中 合谷穴 單獨治療 6例中 快治 3例, 有效 2例, 無效 1例였으며 併用 鍼治療는 6例中 各各 4例, 1例, 1例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 1例, 4例이었고 合谷穴 單獨鍼治療와 併用穴鍼治療例의 完快數가 各各 3例와 4例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 1例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

③ 不能言語의 治療 : 不能言語症 60例中 合谷丹毒鍼治療에서 20例에서 快治 9例, 有效 3例, 無效 3例이었으며 併用 鍼治療는 20例中 各各 15例, 3例, 2例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 5例, 13例, 2例이었고 合谷單獨鍼治療와 併用穴 鍼治 療例의 完快數가 各各 9例와 15例로 한 것이었으며 其他 經穴 鍼治療 5例에 比하여 顯著한 差異가 있었다.

④ 傷寒不汗出의 治療 : 傷寒不汗出症 15例中 合谷單獨鍼治療 5例에서 快治 3例, 有效 1例, 無效 1例였으며 併用鍼治療 5例中 各各 3例, 1例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療 各各 1例, 2例, 2例이었어 合谷穴 單獨鍼治療와 併用鍼治療例의 完快數가 各各 3例와 3例로 同一置였으며 其他經穴 鍼治療 1例에 比하여 현저한 差異를 나타냈다.

⑤ 月經閉의 治療 : 月經閉症 210例中 合谷 單獨 鍼治療 70例에 快治 37例, 有效 14例, 無效 19例였으며 併用 鍼治療는 70例中 各各 51例, 12例, 7例였으며 其他 經穴鍼治療는 各各 15例, 5例이었고 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 37例와 51例로 가까웠으며 其他 經穴鍼治療 15例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑥ 裏急後重의 治療 : 裏急後重 症勢 30例中 合谷穴 單獨 鍼治療 10例에서 快治 5例, 有效 4例, 無效 1例였으며 併用鍼治療는 10例中 各各 6例, 3例, 1例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 4例, 3例, 3例이었고 合谷穴 單獨鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 5例와 6例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 4 例에 比하여 현저한 差異를 나타냈다.

⑦ 痢疾의 治療 : 痢疾症勢 24例中 合谷穴 單獨鍼治療 8例에서 快治 4例, 有效 3例, 無效 1例였으며 併用穴 鍼治療 8例中 各各 5例, 2例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 1例, 5例, 2例이었고 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 4例와 5例로 近少한 差異이었으며 其他經穴 鍼治療 1例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑧ 偏頭痛의 治療 : 偏頭痛 症勢 300例中 合谷穴 單獨 鍼治療 100例에서 快治 65例, 有效 30例, 無效 5例였으며 併用穴 鍼治療는 100例中 各各 75例, 20例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 40例, 55例, 5例이었고 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完治數가 各各 65例와 75例로 近少한 差異였으며 其他經穴 鍼治療 40例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑨ 正頭痛의 治療 : 正頭痛 症勢 240例中 合谷穴 單獨 鍼治療 80例에서 快治 56例, 有效 23例, 無效 1例였으며, 併用穴 鍼治療는 80例中 各各 43例, 34例, 3例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 30例, 31例, 19例이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 56例와 43例 인데 反해 其他經穴 鍼治療 30例에 比하여 많은 差를 나타냈다.

⑩ 眉稜骨痛의 治療 : 眉稜骨痛 症勢 240例中 合谷穴 單獨鍼治療 80例中에서 快治 57例, 有效 19例, 無效 4例였으며 併用穴 鍼治療 80例中 各各 44例, 29例, 7例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 21例, 49例, 10例였으며 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 57例와 44例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 21例에 比하여 많은 差異가 있다.

⑪ 眼睛痛의 治療 : 眼睛痛(症勢)의 39例中, 合谷穴 單獨鍼治療 13例에서 快治 8例, 有效 3例, 無效 2例였으며 併用 鍼治療는 13例中 各各 5例, 6例, 2例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 2例, 7例, 4例이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 8例와 5例로 近少한 差異었으며 其他 經穴 鍼治療 2例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑫ 障醫의 21例中 合谷穴 單獨鍼治療 7例에서 快治 5例, 有效 1例, 無效 1例였으며 併用穴 鍼治療는 7例中 各各 4例, 2例, 1例였으며 其他經穴 鍼治療는 各各 1例, 1例, 5例이었어 合谷穴 丹毒鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 5例와 4例로 近少한 差異였으며 其他經穴 鍼治療 1例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑬ 漏風症의 治療 : 漏風症 150例中 合谷穴 單獨 鍼治療 50例에서 快治 45例, 有效 4例, 無效 1例였으며 併用穴 鍼治療는 50例中 各各 41例, 8例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 10例, 35例, 5例이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治 療例의 完快數가 各各 45例와 41例로 近少한 差異였으며 其他 經穴鍼治療 10例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑭ 耳鳴症의 治療 : 耳鳴症 300例中 合谷穴 單獨鍼治療 100例에서 快治 69例, 有效 27例, 無效 4例였으며 併用 鍼治療는 100例中 各各 72例, 19例, 9例였으며, 其他 經穴 鍼治療는 各各 41例, 4例, 14例이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治 療例의 完快數가 各各 69例와 72例로 近少한 差異였으며 其他經穴 鍼治療 41例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑮ 耳聾症의 治療 : 耳聾症 30例中 合谷穴 單獨鍼治療 10例에서 快治 4例, 有效 6例, 無效 0例였으며 併用穴 鍼治療는 10例中 各各 6例, 3例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 2例, 4例, 4例이었어 合谷穴 單獨鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 4例와 6例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 2例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑯ 鼻塞 · 不聞香臭症勢의 治療 : 鼻塞 · 不聞香臭 症勢 60例中 合谷 單獨 鍼治療 20例에 快治 11例, 有效 5例, 無效 4例였으며 併用穴 鍼治療는 20例에 快治 11例, 有效 5例, 無效 4例였으며 併用穴 鍼治療는 20例中 各各 5例, 7例, 8例이었어 合谷穴 單獨鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 11例와 16例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 5例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑰ 鼻流 臭穢 症勢의 治療 : 鼻流 臭穢 症勢 60例中 合谷穴 單獨 鍼治療 20例에서 快治 10例, 有效 6例, 無效 4例였으며 併用穴 鍼治療는 20例中 各各 18例, 0例, 2例이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 10例와 18例로 近少한 差異였으며 其他 鍼治療 3例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑱ 口瘡症勢의 治療 : 口瘡症勢 15例中 合谷 單獨 鍼治療 5例에서 快治 3例, 有效 2例, 無效 0例였으며 併用穴 鍼治療는 5例中 各各 5例, 0例, 0例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 2例, 1例, 2例 이었어 合谷穴 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 5例, 3例로서 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 2例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑲ 齒痛의 治療 : 齒痛 150例中 合谷穴 單獨 鍼治療 50例에서 快治 37例, 有效 6例, 無效 7例였으며 併用穴 鍼治療는 50例中 各各 46例, 3例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 18例, 20例, 12例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 37例와 46例로 近少한 差異였으며

其他 經穴 鍼治療 18例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

⑳ 喉閉症의 治療 : 喉閉症 90例中 合谷 單獨 鍼治療 30例에서 快治 18例, 有效 10例, 無效 2例였으며 併用穴 鍼治療는 30例中 各各 21例, 8例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 7例, 20例, 3例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 18例와 21例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 7例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

㉑ 咽喉腫痺의 治療 : 咽喉腫痺의 51例中 合谷 單獨 鍼治療 17例에서 快治 15例, 有效 2例, 無效 0例였으며 併用穴 鍼治療는 17例中 各各 10例, 2例, 5例이었어, 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 15例와 16例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 10例에 比하여 현저한 差異를 나타냈다.

㉒ 五指痛 및 痲痺의 治療 : 五指痛 및 痲痺의 210例中 合谷 單獨 鍼治療 70例에서 快治 51例, 有效 12例, 無效 7例였으며 併用穴 鍼治療는 70例中 各各 64例, 4例, 2例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 4例 , 65例, 1例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數는 各各 51例와 64例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 4例에 比하여 많은 差異가 있다.

㉓ 臂膊의 治療 : 臂膊痛 99例中 合谷 單獨 鍼治療 33例에서 快治 25例, 有效 3例, 無效 5例였으며 併用穴 鍼治療는 33例中 各各 9例, 20例, 4例이였어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 25例와 23例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 9例에 比하여 많은 差異가 있다.

㉔ 脫肛의 治療 : 脫肛의 51例中 合谷 單獨 鍼治療 17例에서 快治 14例, 有效 3例, 無效 0例였으며 併用穴 鍼治療는 17例中 各各 13例, 4例, 0例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 5例, 9例, 3例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數는 各各 14例와 13例로 近少한 差異였으며 其他

經穴 鍼治療 5例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

㉕ 風症의 治療 : 風症의 150例中 合谷 單獨 鍼治療 50例에서 快治 41例, 有效 3例였으며 併用穴 鍼治療는 50例中 各各 45例, 4例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 10例, 35例, 5例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 各各 10例, 35例, 5例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療의 完快數가 各各 41例와 45例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 10例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

㉖ 半身不遂의 治療 : 半身不遂 症勢 210例中 合谷 單獨 鍼治療 70例에서 快治 34例, 有效 21例, 無效 15例였으며 併用穴 鍼治療는 70例中 各各 45例, 10例, 15例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 15例, 16例, 39例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 34例와 45例로 近少한 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 15例에 比하여 많은 差異를 나타냈다.

㉗ 口噤의 治療 : 口噤의 27例中 合谷穴 單獨 鍼治療 9例에서 快治 2例, 有效 4例, 無效 3例였으며 併用穴 鍼治療는 9例中 各 4例, 3例, 2例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 2例, 1例, 6例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 2例와 4例로서 差異였으며 其他 經穴 鍼治療 2例와 비교하여 보면 別差異가 없었다.

㉘ 皮膚痲痺의 治療 : 皮膚痲痺 30症例中 合谷 單獨 鍼治療 30例에서 快治 7例, 有效 20例, 無效 3例였으며 併用穴 鍼治療는 30例中 各各 9例, 15例, 6例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 5例, 13例, 12例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 7例와 9例로서 其他 經穴 鍼治療 5例와 서로 뚜렷한 差異라고는 볼 수 없다.

㉙ 全身皮膚炎 : 全身皮膚炎 15例中 合谷 單獨 鍼治療 5例에서 快治 2例, 有效 1例, 無效 2例였으며 併用穴 鍼治療는 各各 1例, 1例, 3例이었어 合

谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數가 各各 2例, 3例로 其他 經穴 鍼治療는 1例에 比하여 僅少한 差異였다.

㉚ 催産 및 難産 : 催産 30例中 合谷 單獨 鍼施術 12例에서 快治 0例, 有效 5例, 無效 7例였으며 併用穴 鍼施術은 12例中 各各 5例, 0例, 7例였으며 其他 經穴 鍼施術에서는 各各 0例, 0例, 0例, 12例이었어 合谷 單獨 鍼施術과 併用穴 鍼施 術例의 完快數는 各各 0例, 5例로서 其他 經穴 鍼施術 0例에 比하여 신통치 못하였다.

㉛ 疳眼을 治療 : 疳眼의 9例中 合谷 單獨 鍼治療는 3例에서 快治 0例, 有效 0例, 無效 3例였으며 併用穴 鍼治療는 3例中 各各 0例 , 2例, 1例였으며 其他 經穴 鍼治療는 各各 0例, 2例, 1例이었어 合谷 單獨 鍼治療와 併用穴 鍼治療例의 完快數는 0例와 0例로서 其他 經穴 鍼治療와의 比較에서도 一同할 無爲로 되었다.

五. 臨床症例

1) 病例報告

患者姓名 : 金 ○ 植 48歲

性　　別 : 男

職　　業 : 영등포 모자동차학원 총무과장

1972. 7. 15. 初診 當時에 밝혀진 病歷으로는 7年前부터 五指에 痲痺症勢가 서서히 進行하면서 冷感 때문에 무더운 伏中에도 털장갑을 끼고 있었으며 찬물이나 鐵物에 手足을 대면 전류가 통하는 것 같이 저리다고 主訴하고 知覺鈍痲에 이루고 있었고 發病前까지는 毒酒를 좋아 알콜 中毒者임을 問診에서 확인되었다.

鍼治療를 着手하여 15日間 八邪穴에 每回 30分間의 留鍼으로 施術하였으나 別로 效果가 없어 經穴選擇을 변경하여 ㉒와 ㉘을 併行한 施鍼으로 7日 經過後 患者의 主訴가 손바닥에 熱感(掌熱)을 느끼기 시작하면서 30日

동안 投藥없이 鍼治療로 完療되었다.

2) 耳鳴症의 治療所見 : 一般化되어가는 合谷穴의 多樣한 臨床運用은 四關穴(合谷, 太衝) 施術을 위시하며 上肢痲痺 齒痛을 主로 身體 上位痛症의 鎭痛에 運用되는 主治穴임을 前述한 分類上으로 認定할 수 있고 臨床的 價値가 廣範圍하며 특히 著者는 耳鳴 患者群여서 ⑭의 方法을 選擇하여 特別 빠른 治療 效果를 얻을 수 있었고 이들 對象들의 內容은 S.M 副作用으로 誘發한 耳鳴症이 2~3日 程度의 施術로 耳鳴症勢가 쉽게 消失될 수 있었다.

이밖에도 습관성 약물의 過用으로 일어난 耳鳴症과 神經症에서 併發한 耳鳴에도 적용하여 이 때는 다른 耳鳴 治療보다는 時日이 다소 연장되었으나 症勢 除去가 容易하였다. 그러나 高血壓의 耳鳴과 腎虛에 속한 卽更年期障碍의 老人性 耳鳴症에는 反應이 거의 없었다.

3) 頭痛의 治療 所見

神經症에서 흔히 일어나는 頭痛은 거의 緊張性으로 認定되었으며 胃腸障碍를 수반한 頭痛 症勢와 不眠症에 걸려있는 神經症 患者群에서 偏頭痛과 正頭痛 鍼治療에는 ⑧과 ⑨를 常用하였으며 이 方法은 보편화 시킬만한 應用價値가 있음을 臨床經驗으로 確認되었다.

특히 偏頭痛에 있어서는 週期的인 發作이기 때문에 痛症이 가장 심한 시간에 施鍼할 때 더욱 빠른 效果를 볼 수 있었다.

그러나 偏頭痛은 反復되는 痛症 때문에 正頭痛보다는 治效日이 연장되게 마련이었고 이것은 患者의 性格들에 많은 差異를 갖고 患者別로의 多角的인 검토가 必要하였다.

4) 合谷과 三陰交의 應用 : 手陽明大腸經(金) 上의 合谷穴은 보편화 되어 있는 消化器 疾患의 利用뿐만 아니라 原穴의 價値로 多樣하게 活用할 수 있는 經穴이며 ⑤의 方法을 應用하여 요사이 많은 對象으로 避妊劑 長期服用으로 因한 月經量 減血 또는 間歇的인 月經閉 症勢에 憂愁한 效果를

발휘함을 經驗하였다. ㉚에 있어서는 合谷을 補하고 三陰交를 瀉하면 催産 또는 難産에 主治 方法으로 規定하고 있어 著者는 月經 豫定 10日前의 婦人 12名(30歲 以后)을 對象으로 避妊方法의 目的을 試圖하여 5例는 成功하였다.

(合谷은 留鍼, 三陰交는 皮內鍼 또는 迎隨補瀉法) ⑤와 ㉚의 運用을 結付시켜 볼 때 合谷穴에 三陰交가 따르고 있으며 三陰交는 肝, 腎, 脾 3經의 交會處로 陰血을 主로 하고 있고 血은 補하여야 함이 原則인데 瀉하는 것은 禁物이고 反治이며 血衰作用이 된다.

合谷은 大腸經의 原穴과 肺의 府로 氣를 主로 하기 때문에 合谷을 補하고 三陰交를 瀉함은 血衰氣旺하여 避妊作用을 可能케 할 수 있는 原理로서 妊娠될 수 있는 生理는 血旺氣少에 選行하는 反治 鍼效果로 설명된다. 때문에 이것은 앞으로 더 한층 共同硏究課題로 해결되어야 하며 成功率이 높아지는 날 避妊劑를 服用하지 않고서도 世界的인 人口 暴增의 고민을 덜어주는데 貢獻할 것을 의심치 않는다.

六. 總括 및 考察

『東醫寶鑑』은 지금으로부터 378年前 集成된 漢方醫學의 綜合醫書로서 韓國의 醫療寶鑑이라고 하기 보다는 世界的인 漢方醫書로 손꼽을 수 있게끔 널리 보급되어 있는 실정이다. 鍼灸篇 뿐만 아니라 各科의 分類와 診斷投藥 方法이 모두 收錄되어 있어 漢方醫學을 硏究하고 臨床에 적용할 때 빼놓을 수 없는 貴重한 資料인 것이다.

著者는『東醫寶鑑』上에 나타난 合谷穴이 가장 많이 出現하여 응용되고 있어 이 醫書가 臨床運用의 歷史的 活用期間이 長久한 背景으로 하고 있어 이에 基礎를 삼아 31種 疾患을 對象으로 著者는 患者 總 3027名을 臨床硏究 方法에 適選하였다.

(無作爲選定 疾患別) 合谷穴 單獨鍼治療, 併用穴 鍼治療, 其他 經穴 鍼治료로 區分하여 比較觀察한 結果는 合谷穴 單獨 鍼治療가 併用穴 鍼治료보다 優勢한 快治療患은 ⑨正頭痛, ⑩眉稜骨痛, ⑬漏風症, ㉓臂膊痛, ㉔脫肛

이다. ㉙全身皮膚炎, ㉚催産 및 難産과 下死胎, ㉛疳眼 3疾患의 治效가 시원치 않았다.

이것으로 보아 合谷穴은 臨床적으로 重要한 價値를 지니고 있고 合谷穴이 施術됨으로서 31種 疾患에 가장 좋은 結果를 얻을 수 있음을 確認하였다.

七. 結論

『東醫寶鑑』에 收錄된 31種 疾患을 合谷 單獨 鍼治療 效果와 合谷穴과 其他 記錄된 것의 併用 鍼治療의 效果 및 合谷을 除外한 其他穴만을 應用한 鍼治療法의 治癒效果를 觀察하여 다음과 같은 結果를 얻었다.

1) 合谷 單獨 鍼治療만으로 좋은 效果를 얻은 疾患例는 ⑨正頭痛, ⑩眉稜骨痛, ⑬漏風症, ㉓臂膊痛, ㉔脫肛症이었으며

2) 合谷 單獨 鍼治療와 其他經穴의 併用鍼治療가 좋은 例는 ⑤月經閉症, ④耳鳴症, ⑲齒痛, ㉒五指痛 및 痲痺, ㉖半身不遂였으며

3) 合谷穴을 除外한 其他 經穴만을 應用한 鍼治療 效果는 合谷을 併用한 例보다 훨씬 못하였다.

以上으로 合谷穴은 『東醫寶鑑』에 收錄된 治療經穴 中 가장 重要한 治療穴이며 더욱이 上體 疾患의 主治療穴히면 其他穴은 補助穴임이 確認할 수 있었다.

[審査內容]

1. 傷病名

ㄱ. 正頭痛　ㄴ. 眉稜骨痛　ㄷ. 漏風症　ㄹ. 脫肛症

2. 診斷

ㄱ. 神經性 및 打撲 등으로 誘發된 正頭痛

ㄴ. 神經性 및 七情鬱結로 因한 眉稜骨痛

ㄷ. 漏腺炎 및 漏風症이 原因이 된 落漏 및 眼眶 痛症

ㄹ. 脫肛症으로 因한 肛門 疼痛

3. 症狀

ㄱ. 頭部의 正中部 疼痛

ㄴ. 眉稜部 限局性 疼痛

ㄷ. 眼漏 및 疼痛

ㄹ. 脫肛 및 疼痛

4. 鍼灸 治療法

ㄱ. 正頭痛 : 合谷, 百會, 上星, 神庭, 太陽

ㄴ. 眉稜骨痛 : 合谷, 攢竹, 神庭, 頭維, 解谿

ㄷ. 漏風症 : 合谷, 臨泣

ㄹ. 脫肛症 : 合谷, 太陽兪, 百會, 長江, 肩井, 氣衝

5. 應用

成人 및 幼老人 등에 應用하며 迎隨補瀉 鍼法을 應用한다.

6. 用法

迎隨補瀉法을 包含하여 呼吸 補瀉 및 留鍼術도 無防.(留鍼 30~40分)

7. 藥理

藥物 投與보다 簡便하고 速效이다. 循經理論에 適當하다.

8. 禁忌, 副作用

姙娠婦, 貧血症, 低血壓, 心臟衰弱

[審査 評價]

合谷穴이 上體疾患의 主治療穴이란 點은 循經理論에 衣하여 說明이 可能하다. 提出者의 오랜 臨床統計로서의 價値性이 높이 評價된다. 合谷穴을 主治穴로 포함하여 疼痛에 置重함은 좋은 着眼이었다. 1613년에 大集成한 『東醫寶鑑』의 收錄 그 自體가 臨床的 價値가 豊富한 內容만을 拔萃하였음을 前提로 할 때 合谷穴을 포함시켜 運用한 것은 좋은 標準을 삼았다고 볼 수 있다.

2. 痲疹(Measles) 治療法

△ 提出者 : 京畿 議政府　朴漢醫院　朴　慶　燁

1. 傷病名 : 痲疹(Measles)
2. 主要症狀 : 發病 第 4, 5日에 皮下紅斑이 發疹
3. 治療實績 : 50%는 發疹되어 豫後 良好, 50%는 發疹않고 解熱 完治됨
4. 效能效果 : 豫后 良好
5. 副作用・禁忌 : 全無함
6. 處方內容 : 俠谿(足少陽膽經), 鍼瀉(省啄術施行)
7. 學術的 根據 : 『鍼灸實用經穴學』(本間祥白著) 237p

※ 痲疹發病 第 4, 5日에 皮下紅斑이 發疹不進時에 俠谿鍼瀉하여 發疹도 하지 않고 解熱되어 平濕으로 平時와 如히 神奇하게 完治됨. 施術後 20年이 經過하여도 再發함을 못 보았음 完全免疫된 것으로 思料됨

[審査內容]

1. 傷病名 : 痲疹(Measles)
2. 診斷 : 發病 第 4~5日에 이르는 동안 發熱과 皮下紅斑이 發疹된다.
3. 症狀 : 發熱과 發疹
4. 治療法 : 俠谿(膽經)穴을 鍼施術한다. 手技는 省啄術(瀉法)
5. 應用 : 50%의 發疹일 때 응용하면 豫後 良好하고 50%는 發疹않고도 解熱 完治된다.
6. 用法 : 省啄術 및 其外의 瀉法
7. 藥理(作用) : 膽經의 熱을 除去하는 說明이 可能하다.
8. 禁忌 및 副作用 : 全無
9. 審査評價 : 仔細한 統計成績 報告가 缺如되었다. 痲疹의 鍼療法에 있어서 治療 乃至 免疫이 될 수 있다는 点을 發見한 사실을 높이 평가하며 좀더 계속적인 硏究 檢討를 要한다.

3. 喘息의 治療法

△ 提出者 : 서울特別市 西大門區 신한의원 심 재 록

1. 傷病名 : 喘息의 治療法
2. 主要症狀 : 기관지 천식 또는 心臟性 喘息
   · 鷄肉이나 魚類, 花粉, 먼지 等이 誘發되어 體細胞 內에서 化學的 觸媒로서 組成된 某種의 酵素의 異常作用으로 誘發되거나 毒感이나 緊張까지도 그 要因이 된다.
   發喘하면 氣道氣管支의 淋巴節에서 粘液分泌와 氣道의 筋肉이 收縮되어 空氣의 움직임을 妨害하므로 甚한 咳嗽와 胸이 조이는 느낌과 顔面이 蒼白하여진다. 이때 肺가 膨脹하고 목, 胸, 腹의 筋肉이 緊張되므로 呼吸의 苦痛을 느낀다.
3. 治療實績 : 3500名

   스텐레스 鐵製針 0.3×50㎜를 使用하여 電壓 12.5V, 150～200㎂의 脉波電流로 症狀을 觀察하면서 繼續的 通電을 한다.
   別寢은 胸部에 天突(CV_{22}), 膻中(CV_{17}), 中府(L_1), 腹部에 氣海(CV_6), 背部에 大椎(CV_{14}), 風門(B_{12}), 膏肓(B_{38}), 手에 內關(P_6), 神門(H_7)인데 全穴 刺針 후 症狀緩和 時까지 繼續的으로 治療한다.
   * 結論 : 喘息의 症狀이 緩和될 때까지 刺針通電하여 다음과 같은 治療結果를 얻었다.
   · 刺針通電 2分부터 胸部에 淸凉感이 생겼다.(輕度效果)
   · 3～5分후에는 呼吸이 緩和되었다.(좋은 效果)
   · 3～9分후에는 完全히 症狀이 없어짐을 觀察했다. (完全效果)
   古今을 通하여 針刺療法은 持續性이 弱한 缺點이 있다. 이 點은 改良되어야 하며 患者에게 無痛性 治療效果를 주는 治療法이 要望된다. 演者가 改良한 刺針法이 針術計劃에 參考가 되기를 바라면서 끝을 맺는다.

4. 效能效果 : 78%
5. 副作用, 禁忌 : 폐결핵, 기타 만성 소모성 질환에는 금기함
6. 處方內容 : 『黃帝內經』과 『鍼灸大成』을 參考하여 演者改良한 電針法임
7. 加減活用 : 麻黃 12g, 柴胡 4g, 疑冬花 8g, 甘草 4g, 蘇子 8g, 杏仁 8g 銀杏(炒) 10g, 半夏 8g
8. 服用方法 : 1日 2回 煎劑로 300cc 處方 1회분
9. 學術會 등 發表與否 : 4차 세계대회 Lasvegas에서 發表

[審査內容]

1. 傷病名 : 氣管支 喘息 및 心臟性 喘息
2. 診斷 : 氣管支 및 心臟性 喘息으로 呼吸困難이 隨伴된다.
   喘息, 咳嗽, 胸悶, 顔面蒼白 등이 나타나며 項, 胸, 腹部 등의 筋肉이 緊張되며 거의 慢性 症狀이다.
3. 症狀 : 呼吸困難을 수반하며 喘息이 主症이다.
4. 治療法
   天突, 膻中, 中府, 氣海, 大椎, 風門, 膏肓, 內關, 神門 등에 12.5V, 150~20㎂의 脈波電流通電을 시킨다.
5. 應用 : 電鍼 30~40分 또는 迎隨補瀉法을 應用한다.
6. 用法 : 優先 鍼單獨治療를 試圖하여 보다가 漢藥을 併用한다.
7. 藥理 : 併用藥物
   麻黃 12g, 柴胡 4g, 疑冬花 8g, 甘草 4g, 蘇子 8g, 杏仁 8g, 銀杏 10g, 半夏 8g 1日 3回 煎劑服用
8. 禁忌 및 副作用 : 消耗性 體質에는 禁忌이다.

[審査評價]

喘息에 對한 電鍼治療로서 78%라는 憂愁한 治療效果를 갖고 있으며 3500名이란 많은 實驗을 通하여 얻은 結果에 관심을 갖게 된다.
그러나 治療效果가 完全 治癒인지 或은 一時的인지 또는 發作時마다 施術

하여 鎭靜시킨 것인지 석연치 않다.

治療에 運用한 經穴들은 一般化되어 있는 治療혈이나 統計處理가 不明하다. 엄밀한 의미에서 針單獨治療法이라고는 볼 수 없고 藥併用治療로 認定된다.

4. 腰脚痛 治療法

△ 提出者 : 경희대학교 한의과대학 부속시내 한방병원 李 潤 浩

1. 傷病名 : 腰脚痛
2. 主要症狀 : 腰痛 難而屈伸과 함께 下肢로 痺引痛
3. 治療實績 : 本院 鍼灸科에서 月平均 250名 內外가 上記 질환으로 치료
4. 效能效果 : 約 2주일간의 치료로 70%정도의 환자에서 好轉있음
5. 副作用, 禁忌 : 別 副作用은 없으며 절대적인 안정이 요망됨
6. 處方內容 : 腰陽關, 大腸俞, 次髎, 環跳, 委中, 崑崙, 陽陵泉
7. 加減活用 : 腰部 督脈과 膀胱經上의 壓通點(經穴)을 主穴로 하며 下肢 患處의 經穴을 配穴로 加減한다.
8. 學術的 根據 : 『內經 靈樞經』, 『鍼灸大成』, 『東醫寶鑑』, 『精解 鍼灸學』등 臨床篇을 根據로 함
   현대의학에서 말하는 椎間板脫出症으로 因한 腰病과 坐骨神經痛에 해당하며 足太陽膀胱經이 이 部位에 流注함
9. 學術會 등 發表與否 : 1976년 7월 경희의료원 한방병원 定期臨床集談會 發表
10. 秘藏된 來歷 : 學術的 考察과 臨床 경험을 토대로 함
11. 其他事項 : 手技方法은 20分 內外의 伏臥留鍼을 원칙으로 하며 捻轉方法에 의한 得氣(氣至 二針感)를 표준으로 한다. 可能하면 針感은 患部로 向하게 하여 준다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 腰部 및 脚의 疼痛
2. 診斷 : 局所的으로나 放散 등으로 일어나는 腰部 및 脚痛 또는 腰와 脚의 牽引痛이 대상된다.
3. 症狀 : 腰痛 및 脚痛 또는 腰脚部의 併發疼痛인 때이다.

4. 治療法 : 腰陽關, 大腸俞, 次髎, 環跳, 委中, 崑崙, 陽陵泉, 腎俞, 氣海, 志室

5. 應用 : 20分 內外 臨鍼術을 應用한다.

6. 用法 : 伏臥狀態로 하여 捻轉으로 하되 得氣를 爲主로 한다.

7. 藥理(作用) : 甚한 疼痛이라 할지라도 2週日 以內 痛症이 消失된다.

8. 禁忌 및 副作用 : 全無

[審査評價]

大體로 腰脚痛에 活用되나 鍼治療를 併用함이 더욱 좋다. 有效한 治療法으로 認定은 된다.

<정 신 신 경 과>

1. 似精神分裂症 治療法

△ 提出者 : 京畿 水原 仁漢洞 東南漢醫院 金 在 鳳

1. 傷病名 : 似精神分裂症
2. 主要症狀 : 心經虛因하여 가공理致에 안 맞는 말을 하며 겁을 내며 울기도 한다.
3. 治療實績 : 約 1劑로 完治. 1日 1貼 再湯까지(2回 服用) (食後 2時間)
4. 效能效果 : 約 20일간에 效力 有
5. 副作用, 禁忌 : 副作用無, 禁忌無
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加減四物安神湯

當歸身, 白芍藥, 生地黃, 熟地黃, 白朮, 白茯神, 日黃連炒, 山梔子炒, 麥門冬, 竹茹 各 7分, 加 柏子仁 5錢, 黃芪蜜炙 4錢, 沙蔘 3錢, 石菖蒲 1錢半, 安息香 1錢 煎하여 天竺黃末 5分式 調服

7. 秘藏된 來歷 : 約 17年前 傳受
8. 其他事項 : 原因은 心腎經水火가 相克으로 因하여 耳에서 누가 말하는 것 같음

※ 腎虛因石耳聾

◎ 加味六味地黃湯

熟地黃 4錢, 山藥, 山茱萸 各 2錢, 白茯苓, 牧丹皮, 澤瀉 各 '錢半 加 枸杞子, 天麻, 元防風 各 2錢, 甘菊, 蔓荊子 各 1錢半

食後 3時間服用, 1日 2貼 再湯까지 3回服用. 約 1劑 完治

(約 17年前 經驗妙方)

◎ 眼白苔

(內服) 乾地黃 3錢, 當歸身, 白芍藥, 川芎 各 2錢半, 榛皮 2錢, 大黃 1

錢半

1日 2貼 再湯까지 3回 服用

・榛皮 = 물푸리나무皮

食後 1時間半 10貼 完治

(外用) 兼 態膽眞品少量을 溫水에 풀어서 셋방울씩 1日 2回 程度 眼入有效 (約 17年前 經驗妙方)

◎ 臍上動悸 및 치미는데

元柴胡 三錢, 白伏會, 桂枝 各 2錢半, 半夏, 黃芪 各 2錢, 黃芩 3錢, 龍骨末, 牡蠣粉 各 1錢半, 大黃 1錢, 葛根 2錢 入干 3片

1日 2貼, 食後 2時間半, 約 1劑半 程度 服用 完治

(約 17年前 經驗妙方)

◎ 內痔出血, 腸出血

白礬 1兩 細末, 石雄黃 5錢 細末 混合하여 少量式 1日 3回, 食後 2時間半 服用

(兼用) 一葉草 8錢 ~1兩式 煎服. 一葉草는 岩틈에 나는 풀

食後 3時間半 1日 2回 約 10日間 服用 完治 (約 17年前 經驗妙方)

[審査內容]

1. 傷病名 : 似精神分裂症

2. 診斷 : 傷病名에 似精神分裂症이라 했음으로 精神分裂症 單一疾患만을 指稱한 것이 아니고 精神分裂症과 症狀이 恰似한 狂症 一切를 包含한 것이 아닌가 推測된다.

그러므로 精神分裂症을 爲始하여 躁鬱病, 憂鬱症, Hystery 또는 精神的衝激에서 오는 一時的인 精神錯亂 등이 모두 이에 包含된다고 생각된다.

따라서 確診은 각기 疾患의 特徵的인 症狀과 經過 家族歷 發病動機 등을 細密히 살피며 계속적인 觀察을 한 然後에만 判定이 可能하리라고 思料된다.

그러나 上記와 같은 疾患에서 오는 妄言, 妄行, 畏恐, 善怒, 善泣 등

一連의 症狀이 血虛로 因해서 心火가 上衝되어 오는 경우에 試用해 볼 수 있겠으나 全身衰弱이 甚한 경우에는 適用이 어려울 것 같다.

3. 症狀 : 心虛로 因하여 妄言, 畏恐 或 善泣하는 경우
4. 治療法 : 處方名 加減四物安神湯

當歸身, 白芍藥, 生地黃, 熟地黃, 白朮, 白茯神, 日黃連炒, 山梔子炒, 麥門冬, 竹茹 各 7.5g, 柏子仁 18.75g, 黃芪蜜炙 15g, 沙蔘 11.25g, 石菖蒲 5.625g, 安息香 3.75g, 天竺黃末 1.875g

5. 應用 : 精神分裂症, 躁鬱病, 憂鬱症, 臟躁症(Hystery), 精神錯亂 등
6. 用法 : 1日 1貼 再湯까지 3回服用. 食後 2時間. 處方中 天竺黃末은 煎湯服用時 調服한다.
7. 藥性 : 當歸身, 白芍藥, 生地黃, 熟地黃, 柏子仁 등으로 補血, 淸血시키고 黃芪, 沙蔘, 白朮로 補氣하여 氣血을 補하면서 日黃連, 山梔子, 麥門冬, 竹茹 등으로 心火로 因한 上焦熱을 淸解시켰고 아울러 白茯神, 石菖蒲, 麥門冬으로 心臟을 補하면서 安息香으로 鎭心을 꾀했다고 볼 수 있다.
8. 禁忌, 副作用 : 藥性으로 보아 消化作用이 甚할 경우나 泄瀉가 있을 때에는 服用을 삼가는 것이 좋겠다.

[審査評價]

1. 傷病名에 있어서 似精神分裂症이란 具體的으로 어떤 病을 指稱하는 것인지 分明치 않다. 類推컨대 狂妄症狀을 나타내는 모든 疾患을 總稱하는 것이 아닌가 생각되는데 그렇다면 차라리 漢方症候名인 癲狂이라 함이 妥當하지 않을까 생각 된다.

2. 精神病의 治療는 一段 治療가 끝난 後에도 長期間에 걸친 계속 觀察이 必要한 것이므로 短時日內에 完治시켰다는 報告는 좀 愼重을 欠한 續斷이 아닌가 생각된다.

3. 處方構成上의 特徵으로 보아 補氣血하면서도 上冲하는 心火를 鎭靜시키는 目標가 뚜렷하므로 神經精神의 興奮을 鎭靜시킬 수 있다고 보여진다. 但, 藥性에서도 指摘한 바와 같이 柏子仁을 18.75g式이나 加味한다는

것은 그것이 비록 補心脾 滋肝腎之劑이기는 하나 滑腸作瀉의 能이 있음으로 減量하여 使用함이 可하다고 思料된다.

※ 耳聾 治療法

가. 提出者

京畿道 水原市 仁溪洞 東南韓醫院 金 在 鳳

나. 審査內容

1. 傷病名 : 因腎虛石耳聾
2. 診斷 : 腎虛가 原因이 되어 오는 耳聾, 難聽을 目標로 하되 반드시 耳鏡으로 鼓膜檢査하여 鼓膜의 破裂이나 欠損등의 異常이 없음을 確認하여야 합니다.
3. 症狀 : 腎氣虛弱에 따른 諸症과 耳聾, 難聽
4. 治療法 : 處方名 加味六味地黃湯

   熟地黃 4錢, 山藥, 山茱萸 各 2錢, 白茯苓, 牧丹皮, 澤瀉 各 1錢半, 拘杞子, 天麻, 元防風 各 2錢, 甘菊, 蔓荊子 各 1錢半
5. 應用 : 腎虛가 原因이 되어 오는 耳聾, 難聽, 耳鳴 등 症
6. 用法 : 1日 2貼 再湯까지 3回 服用, 食後 3時間
7. 藥理

   補腎의 要藥인 六味地黃湯에 加拘杞子 天麻 元防風 甘菊 蔓荊子한 것으로 拘杞子로 肝腎을 補하고 天麻로 治風하며 防風으로 上焦의 風邪를 散케 한다. 息風降火之劑인 甘菊과 升散而□風하여 通利九竅하여 耳病의 要藥인 蔓荊子까지 加味되었으므로 病因과 症에 合當한 處方이라 하겠다.
8. 禁忌, 副作用

   六味地黃湯이 藥性이 重濁하여 消化에 負擔을 주는 것이므로 消化機能이 弱한 者에게는 方中 特히 熟地黃의 量을 適宜減量해 볼 것이며 特히 甘菊도 藥性이 苦寒한 것이므로 用量 1錢半은 좀 過用한 듯 하며 이런 경우 消化不良의 憂慮가 있겠다.

[審査評價]

1. 病因이 腎虛에서 오는 耳聾, 耳鳴, 難聽 등에 試用해 볼 만한 處方이라고 判斷된다.

2. 但 消化에 많은 負擔을 줄 수 있는 藥性이기 때문에 消化機能이 弱한 者에게는 適宜減量하든가 加減함이 좋을 듯 하다.

2. 關節炎, 關節腫痛, 肝膿瘍, 走馬痰 治療法

△ 提出者 : 釜山市 東區 三德漢醫院 鄭 埰 鉉

1. 傷病名 : 關節炎, 關節腫痛, 肝膿瘍, 走馬痰
2. 主要症狀 : 關節腫痛(炎症性), 肝膿瘍(穿刺膿出者), 走馬痰(全身流走赤腫)
3. 治療實績 :

效果 / 區分	效		果	
	完 治	현저한 效果	호 전	미 상
患者 총 수 30	18名 60%	6名 20%	6名 20%	'6名 20%
完治 또는 증세 호전 所要 其間	10日~20日	7日~10日	7日~10日	3日~5日

4. 効能効果 : 勿論 病의 輕重과 個人에 따라 다르지만 炎症性 疾患엔 別 副作用 없이 잘 듣는 處方이라고 봅니다.
5. 副作用, 禁忌 : 全無함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 神化飮 - 金銀花 37.5g(1刃), 當歸, 玄蔘, 黃芪 各 18.75g(5錢), 骨碎補 11.25g(3錢), 連翹, 防己, 牛膝 各 7.5g(2錢)
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 本方外에 加減活用한 일은 없으나 加減活用할 수 있을 것으로 思料됨
8. 服用方法(漢藥療法에 限함) : 一般 湯藥方法과 異함이 없이 日 2貼 3回服
9. 學術的 根據(文獻名, 페이지 또는 臨床的 理論提示) :
   金銀花의 君으로한 消炎作用에 玄蔘, 當歸, 黃芪 補氣活血의 臣으로 骨碎補는 破瘀血하고 牛膝, 連翹, 防己 等은 利尿 等의 作用으로 思料됨

10. 學術會 등 發表與否(學會誌 또는 紙上發表) : 中央會誌에 發表 있음
11. 秘藏된 來歷(傳受받은 經緯) : 大邱 某醫家에 累代를 傳受하여 오던 바 醫業을 하는 後孫이 없어 傳한다면서 本人에게 알려주신 것임. 本來의 處方엔 金銀花가 아니고 忍冬草 1刃 5錢인데 本人이 金銀花로 換入하였음. 忍冬草보다는 金銀花를 入함이 越等히 效力 良好함

[審査內容]

1. 傷病名 : 關節炎, 關節腫痛, 肝膿瘍, 走馬痰
2. 診斷
   1) 關節炎이라 했으나 患處 關節部位의 腫痛, 發熱 등을 隨伴하는 化膿性 關節炎임을 理化學的인 檢査를 確認함이 좋겠다.
   2) 關節腫痛도 內因으로 오는 것도 있겠으나 打撲, 捻挫 등 外因으로 오는 경우도 있겠다.
   3) 肝膿瘍인 경우는 一般的으로 脇痛, 高熱, 寒熱往來 등 特有의 症狀이 있음으로 診斷이 어렵지는 않겠으나 可能한 限 理化學的인 檢査를 併行하여 確診함이 좋겠다.
   4) 走馬痰은 多發性 筋炎, 痛風 등의 症狀을 뜻함으로 主로 四肢筋肉에 오는 移動性 腫痛을 目標로 하면 되겠다.
3. 症狀

   關節腫痛(患部發熱, 發赤), 肝膿瘍(穿刺膿出者), 走馬痰(全身流注赤腫痛)
4. 治療法 : 處方名 : 神化飮

   金銀花 37.5g, 當歸, 玄蔘, 黃芪 各 18.75g, 骨碎補 11.25g, 連翹, 防己, 牛膝 各 7.5g
5. 應用 : 化膿性 關節炎, 多發性 筋炎, 炎症性 關節痛
6. 用法 : 1日 2貼 合再湯. 1日 3回 食間服
7. 藥理 : 消炎作用이 强한 金銀花를 爲君으로 하고 解毒, 淸熱하는 玄蔘과 補氣血하는 當歸, 黃芪를 臣으로 하였다. 特히 黃芪는 排膿, 生肌의 効가 큼으로 瘡家의 聖藥이니 適切한 配合이라 보겠다. 거기에 補

腎, 行血, 破瘀血하는 骨碎補와 消腫, 消炎, 淸火, 解毒에 能한 連翹를 또 風水之要藥이며 治癰腫惡瘡하는 防己와 散惡血하고 破癥結하며 能引諸藥下行하는 牛膝을 使하여 構成된 處方이다.

8. 禁忌, 副作用

毒劇性藥物이 아니기 때문에 安心하고 쓸 수 있겠으나 藥性이 좀 凉한 便이므로 中氣虛寒者나 泄瀉가 있을 경우에는 삼감이 좋겠다.

[審査評價]

1. 炎症性인 關節 및 筋肉痛에 써서 消炎作用이 優秀할 것으로 생각된다.

2. 慢性的인 關節炎이나 變形性 關節炎 등에는 그대로 適用하기 보다는 다른 處方을 活用함이 좋겠다.

3. 肝膿瘍에 있어서도 本方이 비록 消炎作用과 排膿作用이 있다 하더라도 漢方에서의 證治思想에 立脚해서 考察컨대 보다 適切한 處方이 따로 있으리라고 생각된다.

3. 坐骨神經痛 治療法

△ 提出者 : 서울特別市 東大門區 安 圭 錫

1. 傷病名 : 坐骨神經痛
2. 主要症狀 : 腰痛 甚則 自腰至足趾疼痛
3. 治療實績 :
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 三氣飮 加人蔘 穿山甲 各 1錢, 全蝎 5分, 續斷, 木果, 骨碎補 各 1錢, 龜板 2錢 葱白 入酒少許

   針 : 腎兪 溫灸, 氣海, 關元 溫灸
5. 服用方法(漢方療法에 限함) : 1日 3回 食後 1時間
6. 學術的 根據(文獻名, 페이지 또는 臨床的 理論提示) : 『方藥合編』 上 16
7. 其他事項 : 腎虛가 뚜렷하고 消化는 잘 되는 者에 有效

[審査內容]

1. 傷病名 : 坐骨神經痛
2. 診斷

   腰痛이 있으며 甚한 경우 直立時나 步行時에 臀部로부터 足太陽膀胱經의 走行部位에 따라 땅기는 듯한 索引痛을 느낀다. 單純한 坐骨神經痛이나 腰薦部, 脊髓, 椎骨의 椎間板脫出症, 所謂 DISC와는 外見上 症狀이 비슷하기 때문에 DISC의 診斷은 X-ray 所見으로 確診을 내려야 하겠다.
3. 治療法 : 加味三氣飮

   三氣飮本方 加人蔘, 穿山甲 各 3.75g, 全蝎 1.875g, 續斷, 木果, 骨碎補 各 3.75g, 龜板 7.5g, 葱白 少許 入酒煎湯
4. 應用

   坐骨神經痛 下肢에 오는 神經痛, 腰痛, 椎間板脫出症(DISC). 때로 下

肢의 關節炎 등으로 應用할 수 있다.

5. 用法

1日 3回 食前 1時間. 1日 2貼 合再湯 酒少許는 煎湯된 藥에 加하여 服用해도 可함

6. 藥性

三氣飮은 『方藥合編』 上統 16에 記載되어 있는 處方으로 風寒濕 三氣가 無虛하여 筋骨이 痺痛하는데 쓰이는 것이다. 여기에 人蔘으로 補氣하고 穿山甲, 全蝎으로 通經路와 止痛의 効를 노렸으며 續斷은 補肝腎하며 理筋骨하고 治腰痛, 止痛의 効가 있으며 木果는 去濕熱 消水脹하여 脚氣와 腰足無力에 쓰이는 要藥이다. 骨碎補, 龜板은 補肝腎하며 行血, 强筋骨을 圖謀한 것이다.

7. 禁忌, 副作用

特別한 禁忌나 副作用은 없으리라고 본다. 但, 消化不良이 顯著한 者에게는 消化에 더욱 負擔을 주지 않을까 염려된다.

[審査評價]

1. 本方은 三氣飮本方에 補肝腎 强筋骨하며 通經, 止痛의 効가 있는 要藥들을 配合하여 腰痛을 集中的으로 治療하려는 意圖가 뚜렷한 處方이다.

2. 特히 中年以後의 過勞에서 오는 坐骨神經痛에 잘 들을 것으로 思料된다.

3. DISC患者에게는 適當한 物理療法이 併行되어야 速效가 있으리라 생각한다.

4. 但 藥味가 너무 重濁하므로 消化器기 弱한 者에게는 消化에 負擔을 줄 憂慮가 있으며 三氣飮 本方中 細辛의 量도 2.0g 程度로 減量함이 좋겠다.

4. 複雜性 류마티스性 關節炎 治療法

△ 提出者 : 慶北 大邱市 濟韓漢方醫院 高 庸 碩

1. 傷病名 : 複雜性 류마티스性 關節炎
2. 主要症狀 : 手足厥冷, 四肢關節, 腫痛而不能屈伸而熱感, 微熱, 脈數, 血壓高
3. 治療實績 : 上記와 같은 유사한 증상이 많으나 병원검사결과 정확한 진단이 내려졌을 때 6名의 case 完治
4. 效能效果 : 病院에서 R.A.test 결과 positive 反應이 나왔을 때만 유효
5. 處方內容 또는 鍼灸療法

   加味仙方活命飮. 金銀花, 紫草根 各 5錢, 浦公英, 薏苡仁, 桑寄生, 生乾地黃 各 1錢半, 當歸, 桂枝, 黃芪, 防風, 羌活, 獨活, 木果, 穿山甲 各 1錢, 乳香, 沒藥 各 5分, 甘草, 全虫 各 3分
6. 服用方法(漢方療法에 限함) : 1日 3回 食後 2時間 溫服 再湯

[審査內容]

1. 傷病名 : 複雜性 류마티스性 關節炎
2. 診斷 : 臨床病理檢査上 R.A test 結果 陽性 反應이 確診되는 경우
3. 症狀 : 手足厥冷, 四肢關節腫痛, 不能屈伸, 患部의 熱感, 微熱, 數脈 혹 高血壓
4. 治療法 : 處方名 加味仙方活命飮

   金銀花, 紫草根 各 5錢, 浦公英, 薏苡仁, 桑寄生, 乾地黃 各 1錢半, 當歸, 桂枝, 黃芪, 防風, 羌活, 獨活, 木果, 穿山甲 各 1錢, 乳香, 沒藥 各 5分, 甘草, 全蝎 各 3分
5. 應用

   류머티스性 關節炎, 諸化膿性 疾患, 特히 皮下組織이나 筋骨에 오는 化膿性 炎症 등

6. 用法

1日 3回 食後 2時間. 2貼合 再湯

7. 藥理

金銀花, 紫草根, 浦公英 등이 모두 消炎解毒作用이 있으며 薏苡仁은 去濕利尿作用으로 消腫의 効가 있다. 桑寄生은 助筋骨하며 利關節의 効가 있으면서도 散瘡瘍하는 効가 있어 消炎作用이 認定된다. 여기에 祛風, 通經絡, 鎭痛의 効가 있는 藥이 加味되어 이루어진 處方이다.

8. 禁忌, 副作用

藥性으로 보아 別다른 副作用은 없으리라 믿어지나 中氣 虛寒者나 氣血 極虛者에게는 本方대로 使用해서 消化不良이나 泄瀉등이 오지 않을까 한다.

[審査評價]

1. 류마티스性 關節炎, 化膿性 關節炎 등에 應用해 볼만한 處方이다.

2. 特히 臨床檢査에서 R.A test 上 陽性患者에게만 써서 効果가 있다는 報告이므로 治療効果는 信憑性이 있다고 보여진다.

5. 小兒痲痺 治療法

△ 提出者 : 大邱市 東區 재단법인 제한동의학술원 고 용 석

1. 傷病名 : 小兒痲痺
2. 主要症狀 : 左 或 右半身痲痺 및 下肢無力而痲痺症者 但小兒者
3. 治療實績 : 小兒痲痺 예방접종 後에도 上記 病症이 나타날 수 있으며 이런 病症에 탁월하게 効果가 난다.
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 起頹湯 - 黃芪, 白朮, 杜冲炒 各 6g, 熟地黃, 山茱萸, 免絲子酒劑, 續斷, 木果, 五加皮, 人蔘, 牛膝, 肉桂 各 3g, 唐木香 2g
5. 加減活用(修治法 또는 技法) : 下肢痲痺而無力甚者 五加皮 8g, 薏苡仁 12g 加味
6. 服用方法(漢藥療法에 限함) : 水煎服

[審査內容]

1. 傷病名 : 小兒痲痺
2. 診斷 : 左 或 右半身痲痺 및 下肢無力而痲痺症者 但小兒者
3. 症狀 : 左, 右 半身痲痺, 下肢痲痺, 下肢無力 등
4. 治療法 : 起頹湯

   黃芪, 白朮, 杜冲炒 各 6g, 熟地黃, 山茱萸, 免絲子酒劑, 續斷, 木果, 五加皮, 人蔘, 牛膝, 肉桂 各 3g式, 唐木香 2g
5. 應用

   1) 小兒痲痺, 其他 神經系 疾患에서 오는 下肢痲痺나 下肢無力

   2) 下肢痲痺나 下肢無力이 甚한 경우에는 加五加皮 8g, 薏苡仁 12g
6. 用法

   1日 2貼 再湯. 1日 3回 水煎 食遠服
7. 藥理

黃芪, 白朮, 人蔘 등으로 補氣, 補脾하고 杜沖, 熟地黃, 山茱萸, 免絲子, 五加皮 등으로 肝腎을 補하여 筋骨을 强健케 하면서 續斷, 牛膝, 肉桂, 唐木香으로 通經絡시킨 處方이라 할 수 있겠다.

8. 禁忌, 副作用

別無하리라고 생각되나 小兒들에게는 適宜 減量하여 服用케 함이 좋을 것 같다.

[審査評價]

下肢痲痺나 無力 등은 漢醫學的으로 보아 肝腎二臟에 所屬되는 筋骨의 無力이나 氣不循에서 오는 것으로 보기 때문에 原因臟器를 돕는 藥材와 通氣循血 시키는 藥材를 適當히 配合한 理想的인 處方이라고 생각되며 上記 疾患에 長期服用시켜 効果를 期待해 볼만한 處方이라 思料된다.

6. 神經衰弱(노이로제) 治療法

△ 提出者 : 江原道 三陟　장성한의원　李　容　益

1. 傷病名 : 신경쇠약(노이로제)
2. 主要症狀 : 불안감, 공포감, 공상, 히스테리, 우울증, 기억력 감퇴
3. 治療實績 : 47名
4. 效能效果 : 81.5%
5. 副作用·禁忌 : 酒, 돈육, 음식은 체하지 않게 부드럽게 복용
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加味歸脾湯

   木果, 山査肉 15g, 白朮, 當歸身, 龍眼肉 7.5g, 黃芪, 遠志, 人蔘, 白茯神, 酸棗仁 5.625g, 唐木香, 柏子仁, 砂仁, 甘草 2.625g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 酸棗仁은 炒用
8. 服用方法(漢藥療法에 限함) : 干3, 棗2
9. 學術會 등 發表與否(學會誌 또는 紙上發表) : 없음
10. 其他事項 : 정신이상에 歸脾湯, 溫膽湯 合木果, 山査肉(唐山査) 15g 使用, 효과 본 사실 有함

[審査內容]

1. 傷病名 : 神經衰弱(Neurosis)
2. 診斷

   特別한 器質的 病變없이 오는 諸般 神經症狀으로서 心氣症, 强迫神經症, 不安神經症, 難人神經症, 抑鬱反應(憂鬱症) 등이 모두 包含된다.
3. 症狀

   不安, 恐怖, 心氣的 呼訴, 不定愁訴, 易怒, 憂鬱, 記憶力 減退, 主意集中困難, 不眠, 怔忡, 各種性 神經症
4. 治療法 : 加味歸脾湯

   木果, 山査肉 15g, 白朮, 當歸身, 龍眼肉 7.5g, 黃芪, 遠志, 人蔘, 白茯

神, 酸棗仁炒 5.625g, 唐木香, 柏子仁, 砂仁, 甘草 2.625g

5. 應用

思慮過多로 心脾虛損하여 오는 諸神經症에 活用할 수 있다.

6. 用法

上記 藥에 干3 棗2하여 1日 2貼, 合再湯하여 1日 3回 食遠服한다.

7. 藥理

1) 本方은 原來 思慮過多로 心脾 二經이 勞傷하여서 오는 諸神經症을 治療할 目的으로 立方된 歸脾湯에다 木果, 山査肉, 柏子仁, 砂仁을 加味한 것임

2) 本方에서는 木果, 山査肉이 爲君藥으로 되어 있는데 木果는 和脾理胃하나 伐肝하며 去濕熱 消水腫하여 瀉痢 脚氣癨亂轉筋 등에 效果가 있다. 山査肉은 健脾行氣하고 消息磨積의 効는 있으나 多用한 즉 反伐脾胃하여 食慾減退나 消化不良이 올 수 있다.

3) 補心脾하여 和血安神의 効를 目標로 立方된 歸脾湯에 木果, 山査肉을 多量으로 加味하는 理由를 報告者가 밝히지 않고 있어 理解에 困難하며 漢方證治의 原理로 보나 方劑學上의 理論으로도 도저히 理解가 안가는 點이다.

8. 禁忌·副作用

血虛한 사람, 平素 食慾不振, 消化不良한 사람은 더욱 消化障碍가 惡化될 것 같다.

[審査評價]

1. 本方은 歸脾湯에다 木果, 山査肉을 15g이나 加味했는데 歸脾湯의 適應症과는 相馳되는 것 같다.

2. 歸脾湯은 心脾虛損으로 血虛하여 오는 證으로서 面色痿黃, 四肢倦怠, 食少, 氣短, 健忘, 怔忡, 不眠, 盜汗 등이 있을 때 쓰이는 것인데 木果, 山査肉이 多量 加味될 경우 오히려 損脾가 되어 食慾減退, 酸痛 등이 오지 않을까 염려된다.

3. 以上과 같은 理由로 本方은 本來의 歸脾湯의 適應症을 떠나서 創藥된

報告者의 經驗方으로 보이나 木果, 山査肉이 多量 加味되어야 할 理由나 適應症을 明示해 줌이 좋을 듯 하다.

4. 或 試用해 본다면 體力의 虛損이 甚하지 않으며 消化機能도 別異狀 없으며 平素 肥甘之物의 偏食이나 過剩 攝取로 體內에 煩熱이나 痰飮이 停滯되어 있다고 診斷되는 者에게 一次 投藥해 보아야 하겠다.

7. 心腎不交(神經衰弱) 治療法

△ 提出者 : 釜山市 中區 염한의원 염 홍 무

1. 傷病名 : 心腎不交(神經衰弱)
2. 主要症狀 : 心臟神經亢進, 不眠, 頭痛, 健忘, 夢遺, 恍惚
3. 治療實績 : 受驗生 또는 社會人으로서 汨沒과 欲求不滿 等 스트레스 患者 等에 適中 大效하였음(130名 程度)
4. 效能效果 : 100%
5. 副作用·禁忌 : 陰虛(肺勞) 火熾者, 諸氣上冲者
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 :
   (初次) 建中龍蠣湯, (再次) 心腎雙補飮(裏面記載와 如함)
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 氣虛自盜汗에는 黃芪, 人蔘倍加, 不眠에는 酸棗仁 倍加, 挾滯에는 陳皮, 砂仁倍加, 熱泄에는 白芍藥 2錢
8. 服用方法(漢方療法에 限함) : 食遠服 再湯
9. 學術的 根據(文獻名, 페이지 또는 臨床的 理論 提示) : 初段階에 建中을 시켜 두고 二段階로 組織을 펴는 陰陽折衷派(補脾論)의 出方으로서 心中脾인 歸脾湯에 補陰滋養之劑나 補陽辛熱之劑를 避하면서 平凡한 藥材로서 (藥味)緻密한 計劃下에 下焦腎元을 도우는데 注力한 點에 本方의 妙味가 있다고 본다.
10. 學術會 등 發表與否(學會誌 또는 紙上發表) : 『醫門寶鑑』의 裏面和劑中에 發表하였음
11. 秘藏된 來歷(傳受 받은 經緯) : 約 80年前에 沒한 巨濟郡 長木出身人이며 當時 南道에서는 名醫였던 秋醫先生의 和劑로 作成者의 最親(進士)이 靑年時代 不救의 上記 疾病으로 呻吟中 此藥方 二劑로서 回生한 事實과 그 後 最親의 門下生 또는 知人을 中에서 實際로 經驗한 處方임
12. 其他事項 :

(初次) 建中龍蠣湯 - 白芍藥 3錢, 間桂 2錢, 炙甘草, 白茯神, 連肉, 龍骨, 牡蠣 各 1錢

(再次) 心腎雙補飮 - 當歸 酒洗, 遠志 去心炒, 白茯神, 人蔘, 黃芪 蜜炙, 白朮, 山藥炒 3錢, 酸棗仁 炒硏, 香附子 便炒, 連肉法, 肉從容, 巴戟 去骨酒炒, 杜冲 各 1錢, 唐木香, 甘草, 陳皮, 砂仁炒硏 各 5分

[審査內容]

1. 傷病名 : 心腎不交(神經衰弱)
2. 診斷 : 怔忡, 不眠, 頭重, 上氣, 神昏, 健忘, 臍服動悸, 夢遺, 下腹直筋의 拘攣, 口乾, 咽乾, 舌赤, 大便秘, 口苦 등 一連의 症狀이 있을 때
3. 症狀 : 診斷項 參照
4. 治療法 :

建中龍蠣湯(1次藥) : 白芍藥 3錢, 肉桂 2錢, 炙甘草, 白茯神, 蓮子肉, 龍骨, 牡蠣 各 1錢

心腎雙補飮(2次藥) : 當歸酒洗, 遠志去心炒, 白茯神, 人蔘, 黃芪蜜炙, 白朮, 山藥炒 各 3錢, 酸棗仁炒硏, 香附子便炒, 連子肉, 肉從容, 巴戟去骨酒炒, 杜冲 各 1錢, 唐木香, 甘草, 陳皮, 砂仁炒硏 各 5分

5. 應用

諸神經衰弱症, 特히 性神經症에 活用해 볼 만하다.

6. 用法

1日 2貼 合再湯하여 3回 食遠服한다. 但 建中龍蠣湯으로 먼저 建中시키고 다음에 心腎雙補飮의 連服으로 完治를 期한다.

加減法으로는 氣虛하여 自盜汗이 있을 때는 黃芪, 人蔘을 倍加하여 不眠에는 酸棗仁炒를 倍加하고 挾滯에는 陳皮, 砂仁 倍加하며 熱泄에는 白芍藥炒 2錢을 加하여 쓴다.

7. 藥理

1) 建中龍蠣湯은 建中의 効가 있는 建中湯에 安神, 鎭靜의 功이 있는 白茯神, 蓮子肉, 龍骨, 牡蠣를 配合한 것이니 下焦가 虛寒하여서 오는 性神經症에나 其他 神經衰弱症 患者로서 下腹直筋의 緊張과 拘攣을 緩和시

킬 수 있을 것이다.

2) 2次藥이 心腎雙補飮은 補氣血하면서도 補腎에 置重하였고 거기에 安神之劑인 白茯神, 遠志, 酸棗仁, 蓮子肉 등이 配合되어 心腎不交로 오는 心大를 鎭靜시키는데 目標를 둔 處方이다.

8. 禁忌·副作用

陰虛火動者(肺勞)나 諸氣上沖者는 忌함

[審査評價]

1. 1次, 2次로 나누어 藥을 쓰되 特히 먼저 建中시키는 藥을 쓰는 것은 性神經症을 隨伴하는 대부분의 神經衰弱症 患者들이 下腹直筋의 緊張과 拘攣이 證明됨으로 一理가 있다고 생각된다.

2. 2次藥인 心腎雙補飮은 補氣血하면서 特히 補腎에 注力하여 腎水不足을 補充하여 心火를 鎭靜시켜 意圖下에 處方을 構成했으며 여기에 補心安心之劑까지 配合하여 萬全을 期한 立方이라 하겠다.

3. 그러나 藥性이 溫한 것이 많으므로 多熱者 上氣가 甚한 者등에는 忌함이 좋겠다.

8. 神經系統疾患(因風寒濕痺) 治療法

△ 提出者 : 대구 동구 재단법인 제한동의학술원 이 웅 정

1. 傷病名 : 神經系統疾患(因風寒濕痺)
2. 主要症狀 : 肢節肩臂背痺
3. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 舒經通快丸 處方은 裏面에 記載
4. 加減活用(修治法 또는 技法) : 南星은 細末하여 牛膽 20個를 混合陰乾
5. 服用方法 : 細末하여 梧子大로 作丸하여 食後 1時間後 1回 15丸. 1日 3回 分服
6. 秘藏된 來歷 : 故 朱免祐先生 經驗方(筆寫本)

   牛膽, 南星 600g, 千黃, 白朮 各 300g, 合歡皮, 白芥子, 防己, 枳殼, 蘿蔔子, 川烏, 海東皮, 威靈仙, 桂枝, 牛膝, 羌活, 獨活 各 150g, 當歸, 川芎, 乾干 各 75g, 甘草 37.5g

[審査內容]

1. 傷病名 : 神經系統疾患(因風寒濕痺)
2. 診斷 : 傷病名에 神經系統疾患이라 했으나 이는 風寒濕으로 오는 痺痛을 뜻하는 것으로 解釋되므로 一般的으로 神經痛이라 할 수 있는 四肢肩背部, 腰部 등에 오는 痺痛이나 屈伸困難 등을 目標로 함이 좋겠다.
3. 症狀 : 肢節痛, 肩臂痛, 背痛, 腰痛, 四肢痛
4. 治療法 : 舒經通快丸

   牛膽, 南星 600g, 千黃, 白朮 各 300g, 合歡皮, 白芥子, 防己, 枳殼, 蘿蔔子, 川烏, 海東皮, 威靈仙, 桂枝, 牛膝, 羌活, 獨活 各 150g, 當歸, 川芎, 乾干 各 75g, 甘草 37.5g
5. 應用 : 四肢, 肩背部, 腰部 등에 오는 神經痛
6. 用法 : 細末하여 梧子大 作丸. 食後 1時間 1回 15丸式, 1日 3回 分服.
7. 藥理 : 祛疾, 祛濕, 祛風하는 藥材에다 通經絡하여 氣血 疏通을 도움으

로 風寒濕 등에 觸傷되어 오는 諸痺痛에 써서 止痛, 鎭痛의 效果를 노린 處分이다.

8. 禁忌·副作用 : 毒藥인 川烏가 配劑됨으로 中毒症狀이 올 수 있음으로 修治를 嚴正히 해야겠으며 牛膽, 南星도 正確한 修治가 必要하다고 본다.

[審査評價]

1. 風寒濕의 觸傷에서 오는 諸痺痛에 效果를 期待할 수 있으리라 본다.
2. 川烏는 毒性이 强하므로 嚴正한 修治를 해서 使用해야 하겠다.
3. 南星, 牛黃, 白芥子, 威靈仙, 桂枝 등 藥性이 辛熱하든가 燥한 것들이 있어 氣血이 虛弱하든가 中氣虛한 者에게는 適合치 않을 것 같다.

9. 腦振盪·胎盤殘留, 子宮炎 治療法

△ 提出者 : 忠南 洪城 대발漢醫院 李 義 弼

1. 傷病名 : 腦振盪, 胎盤殘留, 子宮炎
2. 主要症狀 : 頭痛, 眩暈, 子宮出血, 子宮內膜炎及 陰部 搔癢
3. 治療實績 : 腦振盪 7名, 胎盤殘留 20餘名, 子宮內膜炎 30餘名
4. 效能效果 : 腦振盪 7名中 6名 完治, 胎盤殘留 90%, 子宮炎 70%
5. 副作用·禁忌 : 酒, 鷄肉, 豚肉
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 腦振盪 處方-加味四物湯 生地黃 18.75g, 蘇木 11.25g, 當歸 11.25g, 川芎, 赤芍藥 各 5.625g, 羌活, 防風, 天麻, 紅花, 甘草 各 3.65g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 重者는 生地黃 倍加 37.5g, 紅花 5.625g
8. 學術的 根據 : 生地黃으로 生血及 破血하고 蘇木, 紅花로 破血하고 四物湯으로 補血活血하나 萬無一失 널리 活用
9. 秘藏된 來歷 : 1961年 腦振盪重患者가 往診을 要하기로 診察則 九死一生이므로 深思熟考 끝에 此藥을 11첩 복용으로 完治. 現在 70餘 歲로 生存하였음
10. 其他事項 : 其外 2種 處方을 記載함

※ 胎盤殘留 處方 : 桂枝茯苓湯 - 牧丹皮 9錢, 赤茯苓 3錢, 桂枝 7錢, 白芍藥 5錢, 桃仁 5錢 . 左記藥은 搔爬, 手術後 子宮出血이 不止하여 瀕死則前에도 此藥을 5貼이면 卽時 止血이 되며 此後 補血이면 良好

※ 子宮炎 處方 : 加味龍膽瀉肝湯 - 元防風, 薏苡仁 各 18.75g, 柴胡, 澤瀉, 草龍膽 各 3.75g, 赤茯苓, 當歸, 梔子, 車前子, 木通, 黃芩, 生地黃 各 18.75g. 上記 桂枝茯苓湯과 竝用하면 子宮內 痛症에 더욱 有效함

[審査內容]

1. 傷病名 : 腦振盪
2. 診斷 : 頭部打撲으로 오는 頭痛, 頭重, 眩暈 등
3. 症狀 : 打撲 등 外傷으로 오는 頭痛, 頭重, 眩暈 등
4. 治療法 : 加味四物湯

   生地黃 18.75g, 蘇木 11.25g, 當歸 11.25g, 川芎, 赤芍藥 各 5.625g, 羌活, 防風, 天麻, 紅花, 甘草 各 3.65g
5. 應用 : 頭部를 爲始하여 主로 上體의 打撲傷에 驅瘀血痢로 活用해 볼 수 있을 것이다.
6. 用法 : 1日 2貼 合再湯 3回 食後 2時間 煎服
7. 藥理
   1) 四物湯으로 生血, 淸血, 行血시키고 生地黃, 蘇木, 紅花로 驅瘀血하며 兼하여 祛風熱하는 羌活, 防風, 天麻를 配合한 處方이다.
   2) 따라서 打撲이나 外傷으로 오는 頭部의 皮下出血을 急速히 吸收, 除去시켜 止痛의 效가 있으리라 思料된다.
8. 禁忌·副作用

   別로 없으리라고 보나 生地黃의 量이 많을 경우 消化에 負擔을 주지 않을까 염려된다. 忌食은 酒, 鷄肉, 豚肉

[審査評價]

腦振盪, 打撲性 頭痛 등에 驅瘀血을 促進시켜 治療의 目的을 達成할 수 있는 處方이라 認定된다.

10. 痺痛症(一般神經痛, 坐骨神經痛, 腰痛, 四肢痺痛)治療法

△ 提出者 : 서울 동대문구 普仁漢醫院 李 鍾 馨

1. 傷病名 : 痺痛症(一般神經痛, 坐骨神經痛, 腰痛, 四肢痺痛)
2. 主要症狀 : 血液循環障碍로 일어나는 赤痺 및 神經痛
3. 治療實績 : 中風後遺症, 痲痺, 動脈硬化症, 神經痛 等 症에 長期投與하여 有效하며 本人은 10餘年來 愛用하고 있음
4. 效能效果 : 鎭痛, 補血, 祛濕, 機能亢進의 効能이 있는 것으로 思料됨
5. 副作用·禁忌 : 별로 副作用 없으며 간혹 消化不良者는 熟地黃의 減除로 調整할 수 있음
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加減獨活湯 - 獨活 8g, 當歸, 白芍藥, 杜冲去絲, 續斷 各 6g, 牛膝, 防風, 白茯苓, 川芎, 秦艽, 人蔘, 熟地黃 各 4g, 細辛, 桂皮, 甘草 各 2g, 薑 3片, 大棗 2枚. 用量은 適宜增量
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 肥濕者 去 熟地黃. 多火者 去 人蔘
8. 服用方法 : 1日 2貼 合再湯 3回服. 每食後 2時間後 服用. 早効者 10貼, 晩効者 20~60貼
9. 學術的 根據 : 『方藥合編』上統 4方 萬金湯 및 上統 88方의 獨活寄生湯을 參照, 變方 加減한 것으로 順氣鎭痛 作用이 優秀함
10. 秘藏된 來歷 : 漢方處方中에서 順氣鎭痛 作用의 處方을 拔萃調査하던中 本方이 敵方임을 着眼하여 使用하여 본 결과 累効하였음

[調査內容]

1. 傷病名 : 痺痛症 (一般神經痛, 坐骨神經痛, 腰痛, 四肢痺痛)
2. 診斷 : 四肢痛, 肩臂痛, 四肢痺痛, 腰痛, 痲痺 등
3. 症狀 : 血液循環障碍로 일어나는 痲痺 및 神經痛
4. 治療法 : 加減獨活湯

   獨活 8g, 當歸, 白芍藥, 杜冲, 續斷 各 6g, 牛膝, 防風, 白茯苓, 川芎,

秦艽, 人蔘, 熟地黃 各 4g, 細辛, 桂皮, 甘草 各 2g, 干3棗2. 加減法 肥濕者 去熟地黃, 多火者 去人蔘

5. 應用

諸般神經痛 및 四肢痲痺 등에 活用되며 中風後遺症으로 오는 痲痺, 動脈硬化症 등에 活用할 수 있으리라 본다.

6. 用法 : 1日 2貼 合再湯 3回服. 食後 2時間

7. 藥理 : 本方은 方藥合編 上統 4方 萬金湯 및 上統 88方의 獨活寄生湯을 合方 加減한 것으로 補血, 祛濕, 通經絡하여 順氣鎭痛의 効가 있는 것으로 思料됨

8. 禁忌·副作用 :

別로 副作用이 없을 것이나 消化機能이 弱한 者에게는 熟地黃의 減除로서 調整을 꾀함이 좋겠다.

[審査評價]

1. 대체로 痺痛症이 氣血의 凝滯에서 오는 것이므로 通經絡하여 順氣活血에 主眼을 둔 本處方으로 止痛은 勿論 原因治療도 可能하리라고 認定된다.

2. 四肢疼痛, 痺痛, 肩背痛, 腰痛 등 모든 神經痛에 1次 試用해 볼만한 處方이라고 思料된다.

11. 腦出血, 腦蜘蛛膜下出血時 鍼灸에 依한 應急處置法과 充血性 頭痛 治療法

△ 提出者 : 釜山 東區 扁鵲漢醫院 洪 淳 百

1. 傷病名 : 腦出血, 腦蜘蛛膜下出血時 鍼灸에 依한 應急處置法과 充血性 頭痛
2. 主要症狀 : 高血壓性 腦症 卽 頭痛, 嘔吐, 頭項部 熱感, 昏睡, 痙率, 眩暈, 眼暗
3. 治療實績

腦出血, 腦蜘蛛膜下出血時 鍼灸에 依한 應急處置					腦出血性 頭痛(上氣, 頭痛) 腦溢血前驅症				
效果 / 區分	效果				效果 / 區分	效果			
	完治	顯著한 效果	증세 호전	미상		完治	顯著한 效果	증세 호전	미상
診療患者 50名	名 (0%)	40名 (80%)	15名 (15%)	5名 (5%)	診療患者 50名	16名 (32%)	30名 (60%)	4名 (8%)	9名 (0%)
所要日數 (治療回數)	1回	1回	1回	1回	所要日數 (治療回數)	1回	1回	1回	1回

4. 效能效果 : 高血壓으로 因한 腦充血性 頭痛은 8回 施術로서 治療后 直時 또는 30분내에 顯著한 效果가 있음. 腦出血直後 또는 知時間內에 本療法으로 應急處置를 하면 死亡率은 20%未滿이며 後遺症 回復이 빠르다.
5. 副作用·禁忌 : 過去나 現在의 病歷에 出血性 疾患이 있는 者, 貧血과 極度로 神經過敏한 者는 禁忌
6. 處方內容 또는 鍼灸療法

   主治穴 - 鼻孔內의 鼻中 膈部(經穴外 特定部位로서 本人 發見)

   補助穴 - 小衝(手少陰心經의 井木穴) 少商(手太陰肺經의 井木穴) 十

宣穴

7. 加減活用(修治法 또는 技法)

1) 鼻孔內의 鼻中膈部 刺針法

左右鼻孔으로부터 鼻中膈及鼻孔內를 消毒한 后 出血을 받는 容器를 下顎 밑에 固定시키고 눈을 감고 턱을 약간 들게 하고 三陵針으로써 左右 鼻中膈의 前半部位에 各 5~10개처를 散刺하면 된다. 特히 注意할 것은 鼻中膈의 後半部刺針은 大血管을 損傷시킬 우려가 있으므로 삼가야 한다. 出血量은 個人마다 差異가 있으나 腦內腦壓 또는 充血의 量에 比例하는지 約 5~30 CC정도 出血하면 自然的으로 止血됨

2) 小衝穴 三陵鍼으로 瀉血함. 心臟의 機能調節을 하는 要穴로서 胸苦, 心痛, 心悸亢進 等에 瀉血하면 卽效

3) 少商穴 三陵鍼으로 瀉血함. 高熱, 昏睡, 肢端痲痺, 쇼크, 假死 等에 著効

8. 學術的 根據

No. 1 鼻中膈部 瀉血効果의 機轉

鼻中膈의 自律神經은 翼口蓋神經節에서 나오는 交感 및 副交感神經으로써 連結 構成되어 있으므로 鼻出血時 防禦機轉에 依하여 鼻出血을 막기爲해서 交感神經이 作用하여 鼻中膈動脈에 收縮이 오는데 또한 交感神經이 內頸動脈에도 分布되고 있으므로 內頸動脈의 收縮이 옴으로써 頭蓋內全體動脈에 流入되는 動脈血의 量이 적어지므로 頭蓋內 血管損傷部의 出血을 減少시키지 않을까 하고 思料되는 바이다.

日本의 『刺絡法』 著者 丸山昌卽, 工藤訓正 兩氏의 說에 의하면 「眼及鼻出血의 發生機轉에 關해서 설명하기를 "頭蓋內循環障害가 高度化되면 頭蓋內靜脈血은 導出靜脈을 通해서 頭蓋外로 溢出된다. 그러나 上眼靜脈及 內鼻靜脈의 일부는 逆으로 頭蓋內에 流入하고 있는 關係上 鼻部의 순환장해시는 특히 眼及 鼻部의 血液查滯가 심해서 血管破綻이 發生하여 鼻出血이 된다고 하였으며" 또 腦出血도 이러한 이유로 一時免할 수 없으니 鼻出血은 일종의 安全辨的 역할을 하고 있다고 한다.

以上과 같은 理由로 眼 또는 鼻出血을 高血壓患者의 腦出血의 前驅症狀

으로 重視할 수 있으며 頭部의 循環障害가 高度化되면 必然的으로 動脈壓의 亢進이 오기에 平素 弱한 血管의 破損을 招來하여 腦出血이 發生한다고 볼때 前驅症이 있을 時 鼻中膈部를 瀉血하여 鼻部靜脈血의 頭蓋內 流入을 減少시킴으로써 腦出血을 事前에 防止할 수 있으며 또 이미 腦出血時는 腦內에 充滿하고 있는 血液量을 조금이라도 減少시킴으로서 오는 腦壓低下와 四肢末端의 適宜한 要穴의 經絡的 機轉으로 血壓을 調整하는데서 腦病巢部의 止血과 自然治癒를 促進시킨다고 思料됨

9. 學術會 등 發表與否 :

* 1972. 11. 26 韓國 第1回 鍼灸 學術大會 發表 銀메달 受賞(東西醫學會)
* 1973. 7. 14~15 日本 鍼灸師會招請 第6回 東洋 鍼灸醫學大講演會 京都社會 福祉會館에서 講演 및 實技發表
* 1973. 8. 10 發行 釜山漢醫師會報 第 48號 26項 發表

10. 秘藏된 來歷 :

鼻中膈部를 刺針瀉血하여 上記 疾患에 應用하게 된 動機. 西紀 1953年 第 2 回 漢醫師國家考試驗의 最終課目 試驗을 치루고 室內椅子에서 起立하는 瞬間 甚한 後頭痛과 眩氣症이 發作하여 步行이 힘들었으나 정신을 차려서 化粧室에 가는 途中 심한 鼻孔出血이 發生하여 손수건으로 鼻孔을 閉塞하여도 止血을 되지 아니하고 咽喉部로 流血이 되는 程度로 甚한 出血이었는데 息間에 頭痛과 眩氣症이 사라지고 氣分이 爽快하게 되었음.

그 后로는 日常臨床에서 腦出血, 蜘蛛膜下出血, 充血性 頭痛, 高血壓으로 因한 腦溢血前驅症 等에 應用한 結果, 豫想外의 著效를 認定하게 되었음.

또 副穴役割로서 小衝穴, 少商穴, 十宣穴 等을 併用하니 더욱 效果的임을 確認하였음

[審査內容]

1. 傷病名 : 腦出血, 蜘蛛膜下出血, 充血性 頭痛
2. 診斷 : 主要症狀 參照
3. 症狀 : 高血壓性腦症 卽 頭痛, 嘔吐, 頭項部 熱感, 昏睡(意識昏迷), 痙攣, 眼昏

4. 治療法

主治穴 : 鼻孔內의 鼻中膈部

補助穴 : 小衝, 少商, 十宣穴

技　法

① 鼻孔內의 鼻中膈部 刺針法

左右鼻孔으로부터 鼻中膈及 鼻孔內를 消毒한 后 出血을 받을 容器를 下顎밑에 固定시키고 눈을 감고 턱을 약간 들게 하고 三陵鍼으로서 左右鼻中膈의 前半部位에 各 5 ~10個 處를 散刺하면 된다. 特히 注意할 것은 鼻中膈의 後半部刺針은 大血管을 損傷시킬 우려가 있으므로 삼가야 한다. 出血量은 個人마다 差異가 있으나 腦壓 또는 充血의 量에 比例하는지 約 5 ~ 30cc程度 出血하면 自然 止血된다.

② 小衝穴 : 三陵鍼으로 瀉血함

③ 少商穴 : 三陵鍼으로 瀉血함

④ 十宣穴 : 三陵鍼으로 瀉血함

5. 應用

鼻中膈部 刺針法을 除外한 補助穴들은 각기 主治症에 따라 一般的으로 널리 活用되고 있는 方法이므로 隨症活用이 可能하리라고 본다.

6. 用法 : 治療法 參照

7. 藥理 : 省略

8. 禁忌·副作用 : 過去나 現在의 病歷에 出血性 疾患이 있는 者, 貧血이 되어 있거나 極度로 神經이 銳敏한 者는 鼻中膈刺針으로 瀉血하는 것을 禁해야 한다.

[審査評價]

鼻中膈刺針法은 高血壓 患者들에 대한 應急措置法으로 이미 外誌에서도 報道되었고 國內에서도 提出者가 數次 治驗例를 發表한 바 있는 것으로 學理的으로도 그 效能이나 妥當性을 認定하고 있는 것이다. 但, 이 術技가 多量의 出血을 시킨다는 點에서 患者나 術者에게 不安感을 주며 경우에 따라서는 止血이 안돼 耳鼻咽喉科의 專門的인 後處治를 받아야 하는 등의

結果도 招來할 수 있으므로 安易하게 施術해 볼만한 方法은 못 된다고 본다.

特히 提出者도 指摘했듯이 平素 出血性 素因이 있는 者나 貧血 또는 極度로 體力이 衰弱한 患者 또는 神經이 銳敏하여 小心하고 不安한 患者에게는 絶對로 施術을 삼가야 할 것이다.

其他 補助穴로 擇한 小衝, 少商, 十宣穴 등은 각기 主治効能에 따라 標題의 疾患 뿐 아니라 神經性 心臟症, 呼吸器 疾患 또는 精神的 衝激 등에서 오는 諸神經症 등에 이미 널리 活用되고 있으며 그 効能 또한 充分히 認定되고 있는 것이므로 再言을 省略한다.

12. 急(慢性)性 腦膜炎 治療法

△ 提出者 : 大邱 南區 醫療法人 文星漢方病院 沈 玄 基

1. 傷病名 : 急(慢性)性 腦膜炎
2. 主要症狀 : 急 全身痙攣, 頭痛 甚, 角弓反張, 口噤, 痲痺 等等
3. 治療實績 :

*急性 - 90% 以上 完治되며 처음 發作한 患者를 급성의 기준으로 함

*慢性 - 70% 以上 完治되며 오래 경과된 환자를 기준함 (15日 이상)

診療患者數	完治	顯著한 效果	증세호전	치료중단
(총 25名)	15名(60%)	4(16%)		6名(24%)

*치료기간 : 전체적으로 보통 20餘日間 (但 急性은 약 몇 첩에 효과를 얻으나 재발을 없애기 위해 20餘日간 쓴다.)

4. 効能効果 : 急性은 거의 완치되며 한두첩에 효과를 알 수 있으며 慢性은 치료 기간이 소요되야 효과를 得할 수 있다.
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 黃半夏干製, 膽南星, 天麻, 白附子, 防風, 陳皮, 皂角刺, 白殭蠶, 枯白礬, 全蝎(分量), 半夏干製 22.5g, 膽南星 11.25g, 天麻, 白附子 各, 5.625g, 防風, 陳皮, 皂角刺, 白殭蠶, 枯白礬 各 3.75g, 全蝎 3分(1.125g)

*針 - 百會補, 小衝瀉, 曲泉補, 風市補

6. 加減活用(修治法 또는 技法) : 硫黃 - 解毒시킬 필요 있을 때, 선퇴 - 不眠, 언어장애 - 원지, 석창포, 백복신 등
7. 服用方法 : 식후 1시간후에 복용하고 2첩 재탕한다.
8. 學術的 根據 : 『方藥合編』 88項 下統 55, 追風祛痰丸
9. 秘藏된 來歷 : 徐文敎 先生으로부터 傳受

[審査內容]

1. 傷病名 : 急慢性 腦膜炎
2. 診斷 : 身熱, 全身痙攣, 項强, 頭痛, 角弓反張, 口噤 등 腦膜炎 特有의 一連의 症狀이 오며 特徵은 項强症이 持續的으로 있는 것이다.
3. 症狀 : 極甚한 頭痛, 全身痙攣, 角弓反張, 項强, 口噤 등
4. 治療法 : 處方名 - 追風祛痰湯

   半夏干製 22.5g, 膽南星 11.25g, 天麻, 白附子 各 5.625g, 防風, 陳皮, 皂南刺, 白殭蠶, 枯白礬 各 3.75g, 全蝎 1.125g

   *加減法 - 不眠일때 加蟬退, 言語障碍에는 加遠志, 石菖蒲, 白茯神, 解毒에는 加硫黃
5. 應用 : 急慢性 腦膜炎, 癇疾 등 全身痙攣을 隨伴하는 神經系 疾患
6. 用法 : 1日 2貼 合再湯. 食後 1時間 水煎服
7. 藥理

   1) 半夏, 南星, 枯白礬, 陳皮 등으로 祛痰하고 皂角刺, 全蝎으로 通竅시키며 防風, 天麻, 白附子, 白殭蠶으로 祛風시킴으로서 痰涎壅塞에서 오는 風症을 治療할 目的으로 立案된 處方이다.

   2) 本方은 原方인 追風去痰丸에거 去木香, 加陳皮하고 半夏, 南星, 天麻, 白附子는 原方의 丸劑用量을 그대로 使用하고 防風, 白殭蠶, 皂角刺, 枯白礬, 全蝎은 湯劑用量으로 減量한 것이 特色인데 祛痰追風의 効果에 注力한 탓인지 그 理由가 分明치는 않다.

   3) 加減法의 說明에서 解毒시킬 必要가 있을 때는 加硫黃이라 했는데 分量이나 修治法의 明示가 없어 理解하기 難하다.
8. 禁忌 및 副作用 : 半夏, 南星 등은 所定의 修治를 正確히 實施하여 쓸 경우 別다른 副作用은 없을 것으로 보인다.

[審査內容]

1. 本方은 『方藥合編』 下統 55方에 收錄되어 있는 追風祛痰丸을 湯劑로 分量을 調節 한 것임

2. 丸湯劑를 莫論하고 半夏, 南星에 대한 法制를 徹底히 實施하여야 할 것 임.

3. 本方은 痰迷心竅하여 오는 癎疾治方으로 紹介된 것이나 痰이 經絡에 壅塞되어서 오는 痙攣發作에는 病名에 拘碍됨이 없이 使用해 볼 만한 處方이다.

13. 中風, 口眼喎斜, 言語障碍 治療法

△ 提出者 : 서울 東大門 安 圭 錫

1. 傷病名 : 中風, 口眼喎斜, 言語障碍
2. 主要症狀 : 口眼喎斜, 心氣不足, 怔忡, 言語障碍
3. 治療實績 : 16名中 14名 治療
4. 副作用, 禁忌 : 돼지고기, 닭고기
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 藿香正氣散 合 補心湯(龜板 3錢, 牡蠣, 當歸, 川芎, 桂枝, 龍骨, 甘草炙 各 1錢) 加南星炮, 半夏製, 烏藥, 防風 各 1錢

   *針 : 神門穴(左, 右)
6. 服用方法 : 1일 3회 식후 1시간
7. 學術的 根據 : 『東醫方劑學』(尹吉榮) p40, p74
8. 其他事項 : 心虛가 뚜렷하고 言語장애를 主症狀으로 하여 體質的으로는 少陰人에게 가까운 사람에 特效함

[審査內容]

1. 傷病名 : 中風, 口眼喎斜, 言語障碍
2. 診斷 : 中風으로 오는 口眼喎斜나 言語障碍, 特히 發病動機로서 精神的인 過勞나 衝激이 認定되며 怔忡, 脉細數등 心虛의 症候가 있을 때
3. 症狀 : 口眼喎斜, 言語蹇澁, 怔忡, 心氣不足
4. 治療法 : 處方名 加味藿香正氣

   藿香正氣散 合 補心湯(東醫方劑學所載) 藿香正氣散 加 龜板 3錢, 牡蠣, 當歸, 川芎, 桂枝, 龍骨, 炙甘草 各 1錢, 南星炮, 半夏干製, 烏藥, 防風 各 1錢
5. 應用 : 中風, 半身不遂, 口眼喎斜, 言語蹇澁 등
6. 用法 : 1日 2貼 合再湯 3回. 食後 1時間 服用

7. 藥理 : 藿香正氣散으로 理氣和中하고 補心湯으로 補血養神했으며 南星, 半夏로 祛痰을 烏藥으로 順氣를 防風으로 祛風을 도와준 處方
8. 禁忌, 副作用 : 別副作用이 憂慮되지 않는 無難한 處方이라고 본다.

[審査評價]

1. 藿香正氣散은 理氣和中하며 散寒利隔하고 散送除痰의 効가 있어 外感寒邪에 寒熱拘急하며 頭痛, 嘔送, 胸中滿悶하는 症에 쓰니면 한편 內傷脾胃에서 오는 上記症에도 쓰일 수 있는 處方이다.
2. 補心湯은 血脈이 虛弱하여 臟腑를 榮치 못하거나 思慮過多나 勞心過度로 補氣가 衰하여 오는 諸症에 精神을 養하고 補血하여 그 均衡을 回復할 目的으로 立方된 處方으로 思料된다.
3. 上記 두 개 處方을 合方한 것에 더욱 藥效의 確實을 期하기 爲헤서 南星, 半夏로 祛痰作用을 强化하고, 烏藥으로 順氣를, 防風으로 上焦의 熱을 驅逐하였으니 理想的인 處方이라 하겠다.
4. 內外感을 不問하고 中風에 活用해 볼 수 있으리라 보며 特히 言語障碍등에 1次 試用을 권해보고 싶은 處方이다.

14. 肋間神經痛(胸脇痛) 治療法

△ 提出者 : 서울 城北區 月谷漢醫院 韓 大 熙

1. 傷病名 : 肋間 神經痛(胸脇痛)
2. 主要症狀 : 胸脇痛, 胸脇部 刺痛 및 疼痛, 胸脇部 打撲傷
3. 治療實績 : 上記 疾患에 第 1方임
4. 效能效果 : 2~5日間의 服用에서 効果 좋음
5. 副作用, 禁忌 : 虛弱者, 老人은 服用貼數를 줄이도록 하고 過用안됨
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 加味榮衛返魂湯(一名 通順散)
   當歸尾, 白芥子 各 11.25g, 赤芍藥, 木通, 白芷, 何首烏, 枳殼, 茴香, 烏藥, 甘草, 忍冬, 獨活, 南星, 半夏, 陳皮, 桔梗, 靑皮, 梔子 各 3.75g, 桃仁, 紅花, 蘇木 各 1.875g 生薑 3片
7. 加減活用(修治法 또는 技法) :
   打撲疼痛에 加金銀花 3.75~11.25g, 桃仁, 紅花, 蘇木 2.625~3.75g, 氣虛에 加人蔘, 冷에 加乾薑, 附子, 虛에 加附子炮, 腫毒堅硬에 加川芎, 麻黃, 葱白, 全蝎, 穿山甲, 實에 加大黃
8. 服用方法 : 水煎(或 濁酒水各半煎) 服食后服 大人 1日 2~3貼 服用
9. 學術的 根據 : 『東醫寶鑑』 卷八 广疽下 p.549
   一切의 痰飮疾患을 치료하고 혈액순환이 잘 안 되는 곳에 氣를 順하게 하고 血을 고르게 하여 榮衛를 調和시키는 効가 많아 毒素가 돌아 다니거나(流) 머무는(注) 腫毒에도 좋다.
   本方은 榮衛返魂湯에 氣血을 더욱 强化시키고 治痰飮瘀血하는 藥을 더한 것임.

[審査內容]

1. 傷病名 : 肋間神經痛(胸脇痛)
2. 診斷 : 胸脇痛, 但 發熱, 咳嗽, 呼吸困難 등이 甚할 경우에는 理化學的

인 檢査를 實施해 봄이 必要하리라고 생각된다.

3. 症狀 : 胸脇痛, 胸脇部 刺痛, 및 疼痛, 胸脇部의 打撲傷

4. 治療法 : 處方名 加味榮衛返魂湯(一名 通順散)

當歸尾, 白芥子 各 11.25g, 赤芍藥, 木通, 白芷, 何首烏, 枳殼, 茴香, 烏藥, 甘草, 忍冬, 獨活, 南星, 半夏, 陳皮, 桔梗, 靑皮, 梔子 各 3.75g, 桃仁, 紅花, 蘇木 各 1.875g, 生薑 3片

*加減法 : 打撲疼痛에 加金銀花 3.75~11.25g, 桃仁, 紅花, 蘇木 2.625~3.75g, 氣虛者에게는 加人蔘, 冷에는 加乾薑, 附子, 虛에는 加附子炮, 腫毒堅硬에 加川芎, 麻黃, 葱白, 全蝎, 穿山甲, 實에는 加大黃

5. 應用 : 肋間神經痛, 上胸部 打撲傷

6. 用法 : 水煎(或 濁酒水 各 半煎)

食后 1時間服. 大人 1日 2~3貼 服用

7. 藥理

1) 一切의 痰飮을 促進시키고 氣血의 循行을 促進시키는 順氣通氣之劑가 많이 包含되어 있다.

2) 거기에 氣血을 補하면서도 한편 驅瘀血하는 藥劑가 加味됨으로서 氣血이 凝滯되어오는 疼痛을 治療할 目的으로 立方된 處方이다.

8. 禁忌, 副作用 : 虛弱者나 老人은 服用량을 適宜 減量하여 쓰는 것이 좋을 것이다.

[審査評價]

1. 痰飮의 凝滯가 氣血의 循行을 沮害함으로서 오는 胸脇痛이나 瘀血에서 오는 胸脇痛에 試用해 볼 만한 處方이다.

2. 그러나 藥性이 모두 燥하고 耗氣하는 傾向이 있겠으므로 虛弱人이나 老弱者에게는 愼重을 期해야 하겠으며 平人이라도 長期服用을 권할 藥은 못 된다.

15. 神經炎 治療法

△ 提出者 : 釜山市 新生産漢醫院 孫 定 根

1. 傷病名 : 神經炎
2. 主要症狀 : 神經行路에 따라 主로 頭面部, 上肢, 下肢, 胸脇部 等
3. 治療實績 : 裏面에 記載
4. 效能效果 : 裏面에 記載
5. 副作用, 禁忌 : 脉이 遲, 弱者 : 虛冷症으로 泄瀉者는 禁忌
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 荊芥, 甘草 5.625g, 沙蔘, 白茯苓, 白殭蠶, 川芎, 防風, 藿香, 蟬退, 羌活, 甘菊, 枸杞子, 木賊, 靑葙子, 天麻, 香古本, 蔓荊子, 石菖蒲 各 3.75g, 厚朴, 陳皮, 葉茶 各 2.25g, 當歸, 白芍藥, 乾薑 3.75g
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 沙蔘은 蜜炙에 使用함
8. 服用方法 : 水煎, 食后 1時間 服用. 1日 2貼 再煎까지 3回 服用
9. 學術的 根據 : 『方藥合編』 中統 112. 消風散 重量增量과 加味
10. 學術會 등 發表與否 : 未發表
11. 秘藏된 來歷 : 1944年 本人의 大人인 醫生 故 姜載中 先生으로 傳受받음, 즉 秘藏된 것은 아니라 實地經驗을 傳受받아 今日까지 約 30年間 使用하여 自信을 얻게 된 것임
12. 其他事項 : 體質이 반드시 陽性體質, 脉有力者, 高血壓者에만 限定된 것은 아니나, 이러한 者들에 頻發하며 體質에 關係없이 症狀만 맞다면 使用하나 亦是 虛冷者, 衰弱者는 技藥注意를 要함

※ 評價 :

(가) 診療效果

知覺異常感知, 運動皮知覺性의 脫落症狀으로 侵犯된 神經支配下의 筋肉의 痲痺와 皮虛의 知覺減退皮 脫落을 隨伴하며 또는 侵犯 당한 神經의

自覺症狀으로 虛發赤, 滲出性 紅斑, 蒼白, 汗出 等을 볼 수 있고 步行困難 等을 招來한다. 神經症으로 眩暈, 頭重, 不安感을 가져오기도 하며 神經性 頭痛, 神經性 胃腸障碍를 가져오기도 한다.

發赤은 皮虛, 眼球 等에 오는데 眼球는 發赤, 눈썹, 疼痛을 招來하는 일이 흔히 있고 顔面, 頭部의 瘙痒症, 齒痛, 鼻塞感, 耳痛, 頭痛, 口唇皮 舌의 知覺味覺減退 等도 招來하여 神經痛도 異動이 많으며 或 左右 相對的으로 오는 수도 있다. 또는 耳鳴, 耳聾 等이 오기도 한다.

(나) 診斷効果

効果 / 區分	効果			
	完治	顯著한 効果	症勢好轉	未詳
治療患者 總 56 名	68 % (38 名)	7 % (5 名)	5 % (3 名)	18 % (10 名)
完治 又는 症勢好轉 期間	10 日	5 日	3 日	

* 神經炎으로 神經科에 入院하여 1個月間 治療로 効果를 얻지 못한 患者가 本法으로 5日間 治療하여 完治된 實例가 1名 있음

(다) 處方選定 根據

本證은 腦神經, 脊髓神經, 末梢神經, 特히 細菌, 化學中毒, 體內毒素, 宋春障碍, 塞冷, 過勞, 外傷 等으로 일어나는 것으로 症勢가 廣範圍하다. 例를 들자면 眼赤이 올 때도 있고 單純히 痛症만 있을 때도 있으며 皮虛나 顔面에 瘙痒症이 있을 때도 있고 單純히 知覺減退나 痛症이 있을 때도 있으며 各 症狀이 廣範하게 나타날 때도 있고 一部만 나타나기도 하며 症勢가 隨時로 變하며 神經痛도 上下 左右로 異動하기도 한다.

따라서 本處方을 傳敎한 분의 趣旨가 消風散에 耳痛이 없어도 耳痛藥을, 眼症이 없어도 眼疾藥을, 頭風症이 없어도 頭痛藥을 다 加味하라고 한 것은 本病証이 全身 神經系統이 어느 神經이든 侵犯되는 症勢가 全部 나타나든 一部만 나타나든 神經痛이니 瘙痒症, 感覺減退 等의 部位가 어제와 오늘에 變化를 가져오든 神經炎을 治療함에 있어서는 單純

한 一部 症狀만을 相對로 하지 않고 症狀 全部, 卽 全身 神經全部에 該當되는 處方을 選定하고 藥劑를 投與하라는 것이며 可量한 두 가지의 症狀만 나타난다 하더라도 다른 症狀이 潛伏하여 언제라도 나타날 수 있다는 것을 前提로 하여 該當되는 藥劑를 다 加味하여 使用한 즉 亦是 効果를 거둘 수 있으며 그렇지 않으면 滿足한 成果를 거둘 수가 없었던 것이다.

[審査內容]

1. 傷病名 : 神經炎
2. 診斷

末梢神經炎은 主로 四肢末端에 오는 일이 많으며 그 主症狀은 發病된 指趾端의 極甚한 刺痛이다. 이것이 多發性인 경우에는 두 개 以上의 指趾端에 同時에 오는 수도 있다.

3. 症狀

1) 頭面部, 上肢, 下肢, 胸腹部의 知覺異常, 筋肉의 痲痺, 皮虛發赤
2) 皮虛瘙痒症, 端出性 紅斑
3) 眼赤, 眼痒痛
4) 鼻塞感, 耳鳴, 耳痛, 頭痛, 齒痛
5) 移動性인 神經痛

4. 治療法 : 加味消風散

荊芥, 甘草 5.625g, 沙蔘, 白茯苓, 白殭蠶, 川芎, 防風, 藿香, 蟬退, 羌活, 甘菊, 枸杞子, 木賊, 靑葙子, 天麻, 香古本, 蔓荊子, 石菖蒲 各 3.75g, 厚朴, 陳皮, 葉茶 各 2.25g, 當歸, 白芍藥, 乾薑 3.75g

修治法 沙蔘은 蜜炙해서 使用함

5. 應用

諸風上攻으로 오는 頭目, 昏眩, 鼻塞, 耳鳴, 皮虛痲痒, 婦人血風頭痒 등 症에 쓰이며 眼赤腹痛生瞤에는 合四物湯한다. 風熱로 因한 耳痛, 齒痛에도 應用된다.

6. 用法 : 水煎. 食後 1時間 1日 2貼 再湯까지 3回 服用

7. 藥理

本方은 原來 風熱上攻으로 오는 諸症狀을 治療할 目的으로 立方된 것으로서 散風 淸熱之劑가 많이 配合되어 있다. 따라서 補氣보다는 發散을 補血보다는 淸血을 爲主로 하여 體表分에 있는 風熱을 驅風, 淸解시킬 수 있을 것이다.

8. 禁忌, 副作用 : 虛弱者에게는 服用을 삼가는 것이 좋겠다.

[審査評價]

1. 標題에 神經炎 治療法이라 했으나 主要症狀에 羅列한 症狀에는 神經炎 特有의 特徵的인 症狀이 明示되어 있지 않다. 따라서 本方이 果然 神經炎에 대한 治驗이 있는지를 疑心하게 된다.

2. 本方의 報告者는 氣質的 疾患인 神經炎과 機能的인 疾患인 神經痛, 神經性(心因性) 疾患 등에 대한 病態를 區分하지 않고 同一하게 取投하여 報告한 것 같다.

3. 原來 本方은『方藥合編』中統 112方에 收錄되어 있는 消風散으로 諸風上攻으로 因한 頭目昏眩, 鼻塞, 耳鳴 등 症을 目標로 立方된 것이다.

그리고 그 加減法에 明示하기를 眼赤, 腫痛에는 四物湯을 合方하고 거기에 人蔘을 沙蔘으로 代置하며 枸杞子, 甘菊, 靑葙子, 木賊 등 淸熱明目의 要藥을 加味한다고 했다.

頭風症에는 加天麻, 藁本하며 耳痛에는 加蔓荊子, 石菖蒲細하라고 明示되어 있다.

4. 그러나 이 加味消風散에서는 위에 明示한 加減法대로 隨症加減하는 것이 아니라 그 모든 藥을 加味해서 頭痛이 있든, 眼赤痛이 있든 없든 間에 상관치 않고 심지어는 神經性 胃腸障碍患者에게까지 一律的으로 投藥하여 効果를 보았다는 報告는 隨症治效의 漢方原理로 보나 體力의 虛實의 差 등을 감안할 때 잘 납득이 가지 않는다.

16. 筋縮性 坐骨神經痛 治療法

△ 提出者 : 大邱 東區 財團法人 제한동의학술원 고 용 석

1. 傷病名 : 筋縮性 坐骨神經痛
2. 主要症狀 : 兩足后面의 筋이 縮引하여 步行困難而痛
3. 治療實績 : 坐骨神經痛의 一種으로 兩足引痛이 특이하며 骨痛은 없고 특히 老弱者에 많다. 便秘者에 더욱 尤効하다.
4. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 白芍藥 20g, 甘草 10g, 細辛 6g, 大黃 2g, 附子 1~2g
5. 加減活用(修治法 또는 技法) : 間間이 젊은 者에 이런 症이 있으며 이 때는 加 木瓜, 檳榔, 吳茱萸 各 4g式

[審査內容]

1. 傷病名 : 筋縮性 坐骨神經痛
2. 診斷

   標題의 傷病名이 具體的으로 어떠한 疾患인지 釋然치 않다. 但 主要症狀에 記載된 症狀으로 보아 坐骨神經痛을 뜻한다고 생각된다.

   坐骨神經痛의 主症狀은 腰痛而屈伸難하며 直立이나 步行時에는 腰部로부터 臀部, 大腿部를 거쳐 足掌部位까지 足太陽膀胱經이 分布된 部位에 一致하여 筋肉의 牽引痛이 있는 것이다.

   이와 같은 症狀은 坐骨神經痛뿐 아니라 脊髓의 腰薦部에 있는 椎骨사이의 椎間 板脫出症 所謂 DISC에서도 같은 X-ray 檢査에 依함이 좋겠다. 그리고 筋縮이란 筋痿縮을 뜻하는지 筋攣縮을 뜻하는지 分明치 않으나 어느 것이나 細密한 神經學的 檢査所見에 依함이 必要하리라 본다.
3. 症狀

   兩足後面의 筋肉이 縮引하여 步行困難하며 痛症이 있다.

4. 治療法

白芍藥 20g, 甘草 10g, 細辛 6g, 大黃 2g, 附子 1~2g,

加減法 靑壯年에게는 加味 木果, 檳榔, 吳茱萸 各 4g式

5. 應用

坐骨神經痛, 腰痛, 疼痛, 筋肉의 攣急, 腰脚手足의 屈伸困難 등

1日 2貼 合再湯 3回 食間服

7. 藥理

1) 本方은 芍藥甘草附子湯에 加細辛, 大黃한 것이다.

2) 芍藥甘草附子湯은 疼痛, 痙攣, 腰脚手足의 屈伸困難이 있으면서 全體的으로 虛寒한 者에게 쓰이는 處方이니 方中 芍藥, 甘草가 筋肉의 痙攣을 弛緩시키는 作用이 있기 때문이다.

3) 附子는 溫補와 通經의 効가 있으며 大黃은 便秘를 풀어주고 細辛은 通經과 引經의 作用이 있으나 用量이 過하다.

8. 禁忌, 副作用

細辛의 分量을 6g式 할 경우 藥性이 너무 辛熱하여 口中粘膜의 糜爛, 舌痺, 胃痛, 泄瀉 등의 副作用이 우려된다.

[審査評價]

1. 本方은 筋攣縮이나 痙攣을 弛緩시킴으로서 그로 因한 疼痛을 緩和시키는 作用이 있음으로 四肢疼痛, 痙攣, 腰痛 등에도 活用될 수 있을 것이다.

2. 따라서 坐骨神經痛에서도 腰痛이 있으면서 下肢, 大腿部 쪽으로 牽引하는 것 같은 疼痛이 있을 때 써서 止痛의 効果가 있으리라 思料된다.

3. 或 坐骨神經痛에서 脊髓나 椎間板 등에는 別異常 없이 다만 脊髓를 支持하고있는 周邊의 筋肉이나 靭帶등의 緊縮으로 疼痛을 呼訴하는 경우가 있으므로 이런 경우에는 本方으로 効果를 볼 수 있을 것이다.

4. 方中 細辛은 通經의 効를 目的으로 加味된 것이므로 過用하지말고 約 2g 程度로 減量하더라도 藥效에 큰 영향이 없을 뿐 아니라 安全한 方法이기도 하다.

17. 坐骨神經痛(慢性인 種類) 治療法

△ 提出者 : 大邱市 尹家漢醫院 尹 敬 述

1. 傷病名 : 坐骨神經痛(慢性인 種類)
2. 主要症狀 : 腰部로부터 后 아킬레스 筋까지 견인, 동통, 작열감이 있음
3. 治療實績 : 約 500名 2~6劑 約 95% 成功
4. 效能效果 : 良好(2~5劑 得效)
5. 副作用, 禁忌 : 虛弱者는 때 따라 浮腫有 其時 煎水 2回 分服
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 理氣湯 - 黃芪, 白朮 5錢, 白茯苓, 薏苡仁 3錢, 黃仁 2錢, 獨活, 肉桂, 甘草, 牛膝 各 1錢, 附子炮 5分
7. 服用方法 : 2~6劑可 虛弱者 煎水 2回 分服
8. 秘藏된 來歷 : 約 15年前 馬山의 70歲 老人에 傳受(漢方大家임)

[審査內容]

1. 傷病名 : 慢性 坐骨神經痛
2. 診斷 : 腰痛, 下肢後面의 大腿部로부터 足趾에 이르는 牽引痛 慢性的인 經過를 밟는 것
3. 症狀 : 上 仝
4. 治療法 : 理氣湯
   黃芪, 白朮 各 5錢, 白茯苓, 薏苡仁 各 3錢, 黃仁 2錢, 獨活, 肉桂, 甘草, 牛膝 各 1錢, 附子炮 5分
5. 應用 : 慢性的인 腰痛, 下肢痛
6. 用法 : 1日 2貼 食遠服
7. 藥理
   補脾, 補腎을 爲主로 하여 慢性的인 腰痛을 治療할 主眼下에 立方된 것이다. 黃芪, 白朮로 補氣, 補脾하고 白茯苓, 薏苡仁으로 祛濕利尿하며 黃仁은 補脾固腎의 効가 있다. 獨活, 牛膝, 肉桂, 附子 등은 각기 通經

止痛과 引經의 効가 있을 것이다.

8. 禁忌, 副作用 : 藥味가 너무 重濁하겠으므로 消化에 負擔을 줄 憂慮가 있다. 虛弱者는 1日 1貼을 水煎하여 2回 分服함이 좋겠다.

[審査評價]

1. 慢性的인 坐骨神經痛에 元氣를 도와줌으로서 治療를 圖謀하려는 뜻에서 立方된 處方이라고 본다.

2. 藥性이 無難하여 長期服用도 할 수 있겠으나 薏苡仁, 黃仁등이 煎湯한 경우 藥味가 重濁하므로 消化에 負擔을 줄 것이 염려된다.

18. 顔面神經痙攣 治療法

△ 提出者 : 大邱 재단법인 제한동의학술원 고 용 석

1. 傷病名 : 顔面神經筋肉痙攣
2. 主要症狀 : 間間이 顔面神經筋肉痙攣 및 眼皮瞤動
3. 治療實績 : 痲痺症도 아닌 것이며 一種의 痰으로 因한 血液 및 神經 순환작용의 異常에서 기분 나쁠 정도로 上記症이 많은 사람이 많다.
4. 效能效果 : 10여貼 미만에 탁월한 効果를 알 수 있다.
5. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 半夏 2g, 陳皮 4g, 赤茯苓, 防風, 川芎, 柴胡, 升麻 各 4g, 甘草 2g
6. 服用方法 : 水煎服

[審査內容]

1. 傷病名 :顔面神經痙攣
2. 診斷 : 顔面筋肉의 瞤動, 眼瞼振擅
3. 症狀 : 間間히 顔面筋肉痙攣 및 眼皮 瞤動
4. 治療法 : 處方名 未詳
   半夏 2g, 陳皮 4g, 赤茯苓, 防風, 川芎, 柴胡, 升麻 各 4g, 甘草 2g
5. 應用 : 顔面神經痙攣, 顔面筋瞤動
6. 用法 : 1日 2貼 合再湯 3回水煎 食遠服
7. 藥理
   半夏, 陳皮, 赤茯苓으로 祛痰하고 防風으로 祛風, 川芎으로 活用시키고 柴胡, 升麻로는 升提시키는 効가 있다.
8. 禁忌, 副作用 : 別다른 副作用은 없을 것 같다.

[審査評價]

本方은 顔面筋痙攣의 原因을 痰塞이라 보고 그 原因을 治할 目的으로 立

方한 것이라 思料되므로 平素 過飮이나 肥甘之物의 偏食이다. 過剩攝取 등으로 體內에 痰飮이 많이 停滯되어 있는 사람이 上記와 같은 症을 나타낼 때 一次 試用해 볼만한 處方이라고 思料된다.

19. 關節炎, 四肢神經痛 治療法

△ 提出者 : 忠南 公州 連春堂漢醫院 文 義 男

1. 傷病名 : 關節炎, 四肢神經痛
2. 主要症狀 : 四肢關節腫과 肩臂痛皮 全身流走 神經痛
3. 治療實績 : 35年間 男女老少를 治療하여 數百名에 達함
4. 效能效果 : 上記 各種 病症을 治療한 바, 長服하면서 十中 7, 8은 完治되었음. 但 重病後 氣血衰弱으로 因한 것은 不可함
5. 副作用, 禁忌 : 胎中을 忌하고 服藥中 녹두, 메밀, 鷄猪肉을 禁함
6. 處方內容 또는 鍼灸療法 : 上記 疾病은 대개 風寒濕에서 基因됨으로 此方文의 內容도 風寒濕氣를 除去爲主며 特히 神經을 促進하는 赤蟻가 主劑로 된 것이 異狀赤인 것임. 鍼灸는 形便에 따라 兼施하였음
7. 加減活用(修治法 또는 技法) : 特히 川烏法制를 잘 할 것과 赤蟻는 적고 赤色인 것을 擇하며 8~9月의 것이 效力 尤効함. 細末蜜丸함
8. 服用方法 : 菉豆大로 作丸하여 大人은 1回 15丸 ~ 25丸式 食間服 1日 3回式 生薑煎水로 服用함(冷服)
9. 學術的 根據 : 文獻의 根據는 알 수 없고 一種의 經驗方이었음
10. 秘藏된 來歷 : 35年前 京畿道 開城市에서 有名한 漢醫 李元煥氏에게 受學當時 先生이 恒時 使用하시던 万靈丸方文이라고 敎受使用하던 바 10여년전부터 赤蟻에 效力이 治似射함을 생각하고 爲主試用한 結果 百倍之効가 有함
11. 其他事項 : 此方文에 主要藥材를 減量치 말 것이며 氣血虛脫로 發病한 者와 高血壓人에게는 服用不可함

方名 : 神經丸

赤蟻 10兩, 蒼朮 8兩, 米泔製, 麻黃, 羌活, 荊芥穗, 元防風, 細辛, 川芎, 當歸身, 白何首烏, 石斛, 天麻, 甘草, 川烏/草烏(甘草와 黑豆를 同入同煎함) 各 1兩半, 全蝎, 威靈仙, 牛膽, 南星, 桂枝(細用), 乳香, 沒藥, 陳皮

各 7錢 이상 22種也 (製法皮 注意事項)

* 赤蟻는 麝香과 같이 藥氣가 發散하니 恒時 密封貯藏하며 草烏, 川烏 法制는 가사 草烏川烏가 各 10斤이라면 甘草, 鼠目太 各 2斤을 入하여 水를 充分히 붓고 文武火로 數時間 煎之하되 草烏, 川烏의 속까지 물이 侵入토록 한 후, 數時間後에 甘草, 黑豆는 除去하고 細切日乾함. 異常 藥材極細末하여 끓인 蜂蜜에다 菉豆大로 作丸하여 陰乾함

* 病之輕重과 新舊에 따라 効果도 遲速되는 바, 筋肉神經痛은 易治요, 關節炎은 12年된 것은 4, 5個月 連服하여야 完治됨.

* 氣血虛弱者는 四物大補湯 等을 隨症 兼用도 尤好함

[審査內容]

1. 傷病名 : 關節炎, 四肢神經痛
2. 診斷 : 四肢關節腫痛, 肩臂痛, 全身 流走 神經痛
3. 症狀 : 上同
4. 治療法 : 處方名 神經丸

   赤蟻 10兩, 蒼朮 8兩, 米泔製, 麻黃, 羌活, 荊芥穗, 元防風, 細辛, 川芎, 當歸身, 白何首烏, 石斛, 天麻, 甘草, 川烏/草烏(甘草와 黑豆를 同入同煎함) 各 1兩半, 全蝎, 威靈仙, 牛膽, 南星, 桂枝(細用), 乳香, 沒藥, 陳皮 各 7錢

   *修治法 : 川烏와 草烏는 甘草와 黑豆를 同入同煎하여 去毒하여 씀
5. 應用 : 四肢關節炎, 四肢神經痛, 肩臂痛 등
6. 用法 : 以上의 藥材를 極細末하여 蜜丸, 綠豆大로 作丸하여 大人은 1回 15丸 ~ 25丸式 食間服 1日 3번 生薑煎水로 服用함. 氣血極虛者는 四物湯이나 十全大補湯의 兼服도 可함
7. 藥理

   本方은 風寒濕에 角傷되어서 오는 神經痛이나 關節炎을 治療할 目的으로 立方된 것이므로 祛風, 祛寒, 祛濕의 作用이 있는 藥材를 爲主로 配合하고 通經絡의 効가 强하다는 赤蟻를 主劑로 한 處方이다.
8. 禁忌, 副作用 : 胎中不可服, 重病後나 氣血衰弱者勿服, 忌食 綠豆, 메

밀, 鷄猪肉

[審査評價]

1. 本方은 原來 『外科正宗』에서 있는 保安壽靈丹에 加赤蟻 減靈仙, 牛膽, 南星, 桂枝, 乳香, 沒藥, 陳皮, 砂仁하고 去雄黃 加減方이다.

2. 保安壽靈丹의 主治效能을 記錄에서 보면 治癱疽風寒濕痺 走注疾痛 附骨陰疽 鶴膝鳳 癱瘓喎斜 不遂 血氣凝滯 偏身走通 偏墜疝氣 偏正頭痛 破傷風 本 關緊閉解 風寒 無不應効和神이라고 되어있다.

以上으로 보아 神經痛, 關節炎, 痛風, 中風, 不遂, 口眼喎斜 심지어는 諸痙攣性 疾患에 까지도 効果가 있는 것으로 되어 있다.

3. 處方內容으로 보아서도 祛風, 祛寒, 祛濕시키면서 通血脈하는 의도로 構成된 處方이므로 上記 疾患들에 應用하여 効果가 있으리라고 思料된다.

4. 그러나 藥材 중 川烏, 草烏가 毒劇藥이므로 所定의 修治法을 徹底히 施行하여 使用하여야 할 것이며 그렇지 않으면 中毒症狀이 올 수도 있을 것이다.

5. 뿐만 아니라 藥性 전체로 보아서도 補氣血 보다는 祛疾順氣, 通血脈에 置重되어 있어 虛弱者는 長服하기에 適當치 않은 藥이라 할 수 있겠다.

6. 特히 肝臟疾患, 胃, 十二指腸潰瘍, 肺結核 등의 合併症 所有者에게는 服用을 禁해야 할 것이다.

7. 原方에서 雄黃, □石을 去하고 赤蟻을 加한 것에 대한 臨床比較는 速斷하기 困難하다.